

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התש"מ"ו - 1986

התרופה הנוגעת ללא מרשם רופא

סולודנט ללא אלכוהול שטיפת פה

תמיסה לשטיפת הפה



הרכב:

כלורהקסידין גלוקונט 0.2% w/v

(Chlorhexidine Gluconate 0.2% w/v)

מרכיבים בלתי פעילים ואלרגנים בתרופה – ראה

סעיף 4 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"

ובסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש

בתרופה. עלון זה מכיל מידע מצטיין על התרופה. אם

יש לך שאלות ותוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עלך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3

"כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היועץ ברוקח אם

אתה זקוק למידע נוסף. עלך לפנות לרופא אם תסמיני

המחלה (סימפטומים) ממריים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

• לעיכוב היווצרות פלאק.

• כעזר לטיפול ומניעה של דלקת

(גיניג'יטיסיס).

• כעזר בשמירה על היגיינת הפה.

• לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים; לקידום

ריפוי החניכיים.

• לשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים ותותבות

ובפסרת ריפה.

• **קבוצה תרפויטית:** אנטיספטי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל כלורהקסידין גלוקונט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

• אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 שנים אלא

בהמלצת רופא.

• יש להשתמש בחלל הפה בלבד. אין לבלוע. במקרה

של מגע של התמיסה עם העיניים או האוזניים, יש

לשטוף אותן ביסודיות עם מים.

• במקרה של תגובה אלרגית קשה, עלך להפסיק

את השימוש ולגשת מיד לקבלת עזרה. ראה

סעיף 4 "תופעות לוואי".

• שטחון שיניים עלולות לפגום בפעילות של

שטיפת הפה. עלך לחצוץ השיניים, שטוף את

פיך ביסודיות עם מים והמתן 5 דקות לפני השימוש

בסולודנט ללא אלכוהול שטיפת פה. לחילופין, אתה יכול להשתמש בשטיפת הפה גם בזמן אחר של היום.

• אין להלבין בדים שהיו במגע עם שטיפת הפה.

• עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים והלישון. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".

• ייתכן שיחול שינוי בתחושת הטעם, או שתרגש

תחושת צריבה, קצקוץ או נימול בחלל הפה. ראה

סעיף 4 "תופעות לוואי".

ילדים ומתבגרים:

התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל לגיל 12

שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא לפני השימוש.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות

אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר

על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה:

ניתן להשתמש בתרופה אם את בהריון או מניקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה את הרכיב

"PEG 40 Hydrogenated Castor Oil"

(נקרא גם: Macrogolglycerol Hydroxystearate)

העלול לגרום לתגובות בעור.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח בנוגע

למינון ולאופן השימוש בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: פעמיים ביום.

• דלקת חניכיים: מומלץ להשתמש במשך חודש.

• כיבים בפה ופסרת פה: יש להמשיך להשתמש

במשך יומיים לאחר החלמה.

• דלקות פה בעקבות שימוש בשיניים תותבות: יש

לקנות ולהשקות את התותבות שלך בשטיפת הפה

למשך 15 דקות פעמיים ביום.

• לאחר ניתוחים דנטליים: יש לפעול בהתאם

להוראות רופא השיניים שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה:

אין לבלוע.

השתמש רק עם הסוגר על הפקק נמצא ובשלמותו

לפני הפתיחה.

הוראות השימוש:

יש למלא את כוסית המדידה עד לקו ה-10 מ"ל, לשטוף

את הפה ביסודיות עם התרופה למשך דקה אחת

ולאחר מכן לירוק את התרופה.

אם התסמינים נמשכים, פנה לרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,

פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא

אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,

היועץ ברוקח או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסולודנט ללא אלכוהול

שטיפת פה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק

מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות

הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לעזרה

רפואית אם מופיעה אצלך אחת או יותר מהתופעות

הבאות:

• פריחה

• נפיחות בשפתיים, לשון, גרון או בכפיים

• קשיי נשימה

תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה

אלרגית חמורה ונדירה מאוד.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא אם

מופיעה אצלך אחת או יותר מהתופעות הבאות:

• גירוי בפה

• כאב

• נפיחות של פנים הלחיים

תופעות אלה אמורות לחלוף עם הפסקת הטיפול.

תופעות לוואי שכיחות מאד (very common) –

תופעות שמפיעות ביותר ממשמש 1 מ-10

משמשים:

הכתמה זמנית של הלשון אשר נעלמת עם הפסקת

הטיפול.

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות

שמופיעות ב-10-1 משמשים מתוך 100:

• יובש בפה.

• שינוי בחוש הטעם, תחושת צריבה, נימול, או

קצקוץ בלשון כאשר אתה משתמש בשטיפת הפה

לראשונה. בדרך כלל חולף עם השימוש שלך.

אם התופעות ממשיכות – יש לפנות לרופא.

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות

ששכיחותן טרם נקבעה):

• הכתמה זמנית של השיניים אשר בדרך כלל

ניתנת להסרה על ידי חצוץ. ניתן למנוע הכתמה

זאת באמצעות הימנעות משתיית תה, קפה או יין

אדום – במיוחד שעה לאחר השימוש, וכן על ידי

חצוץ יומיומי במשחת שיניים (ראה סעיף 3 "כיצד

תשתמש בתרופה"). אם הכתמה נותרת, היא

ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא

השיניים או השיניית.

בתותבות – ניתן לקנות אותן באמצעות חומר לניקוי

תותבות.

• התנפחות בלוטות הרוק.

• קילוף של העור בתוך הפה. כדי להימנע מכך, יש

לדלל את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי

מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא

צוינה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

דייווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות

לחיצה על הקישור "דייווח על תופעות לוואי עקב טיפול

תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר המשרד הבריאות

(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח

על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור

במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של

ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל

תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.

Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה

מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **תנאי אחסון:**

• יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

• יש לשמור באריזה המקורית עד מנת להגן מפני אור.

• יש להשתמש בתרופה עד 6 חודשים מפתחת

הבקבוק הראשונה ולא יאוחר מתאריך התפוגה

המופיע על גבי האריזה.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את

החומרים הלא פעילים הבאים:

Purified Water, Sorbitol Solution, Glycerin

(Glycerol), PEG 40 Hydrogenated Castor Oil,

Flavor Pineapple, Peppermint Oil, Sacralose.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק בצבע חום המכיל תמיסה צלולה. מגיע עם

כוסית מדידה.

גודל האריזה: 300 מ"ל.

יצרן ובעל הרישום: פי שמעון פלוריש בע"מ, פארק

תעשייה משגב, ד.ג. 2017400, ישראל.

עלון זה נערך ב-06/2025 בהתאם להנחיות משרד

הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות:

172-5437476-99

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון

זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.