

**Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача



**Солодент безалкогольный - Ополаскиватель полости рта**

Раствор для ополаскивания полости рта

**Состав:**

Хлоргексидина глюконат 0,2% w/v (Chlorhexidine Gluconate 0.2% w/v)

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в разделе 2 «Важная информация о некоторых ингредиентах препарата», а также в разделе 6 «Дополнительная информация».

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед применением препарата.** Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Применяйте данный препарат согласно указаниям в разделе 3 данной инструкции – «Способ применения и дозы». Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) обострились или если не наблюдается улучшения.

**1. Показания к применению:**

- Для замедления образования зубного налета.
- В качестве вспомогательного средства для лечения и профилактики воспаления десен (гингивита).
- В качестве вспомогательного средства для поддержания гигиены полости рта.
- Способствует заживлению десен после операций или других стоматологических процедур.
- Применяется при язвах, воспалениях на фоне использования зубных протезов, грибковых инфекциях в полости рта.

**Терапевтическая группа:** антисептики.

**2. Перед применением препарата**

**Противопоказания к применению препарата:**

Гиперчувствительность (аллергия) к хлоргексидина глюконату или к любому другому компоненту, содержащемуся в препарате (см. пункт 6, «Дополнительная информация»).

**Особые предостережения относительно использования препарата:**

- **Препарат не предназначен для детей младше 12 лет**, за исключением применения по рекомендации врача.
- **Препарат предназначен для использования исключительно в полости рта.** Не глотать. В случае попадания раствора в глаза или в уши следует тщательно промыть водой.
- **В случае тяжелой аллергической реакции следует прекратить использование и немедленно обратиться за медицинской помощью.** См. раздел 4 «Побочные эффекты».
- **Зубные пасты могут негативно сказаться на эффективности ополаскивателя.** После чистки зубов тщательно прополощите рот водой. Подождите 5 минут, прежде чем использовать Солодент безалкогольный - Ополаскиватель полости рта. Можно также пользоваться ополаскивателем в другое время дня.
- **Не отбеливайте ткани,** контактировавшие с ополаскивателем полости рта.
- **Возможно появление переходящих пятен на зубах и на языке.** См. раздел 4 «Побочные эффекты».
- Не исключено изменение вкусового восприятия, либо жжение, покалывание или онемение в полости рта. См. раздел 4 «Побочные эффекты».

**Дети и подростки:**

Препарат предназначен для лиц от 12 лет и старше. По поводу применения у детей младше этого возраста следует обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

**Если вы принимаете другие лекарственные препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили лечение другим лекарством, сообщите об этом врачу или фармацевту.**

**Беременность и кормление грудью:**

Данное лекарство может быть использовано в период беременности и грудного вскармливания.

**Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:**

Лекарство содержит ингредиент PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (называющийся также Macrogolglycerol Hydroxysteearate), который может вызвать кожные реакции.

**3. Способ применения и дозы**

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа применения препарата

проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

**Принятая дозировка, как правило:** 2 раза в день.

- **Воспаление десен:** рекомендуется использовать на протяжении месяца.
- **Язвы во рту и грибковое поражение полости рта:** следует продолжать применение на протяжении двух дней после выздоровления.
- **Воспаление в полости рта на фоне пользования зубными протезами:** мыть и замачивать протез в ополаскивателе на 15 минут дважды в день.
- **После стоматологических операций:** использовать в соответствии с назначением лечащего стоматолога.

**Не превышать рекомендуемую дозу.**

**Применение препарата:**

Не глотать.

**Препарат пригоден к использованию при условии целостности колпачка до вскрытия.**

**Способ применения:**

Наполнить мерный стаканчик до отметки 10 мл; тщательно прополаскивать рот лекарством на протяжении одной минуты. Затем сплюнуть лекарство.

Если симптомы не прекращаются, **следует обратиться к врачу.**

**Если вы по ошибке превысили дозу препарата**

В случае передозировки или случайного приема препарата ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы; возьмите с собой упаковку препарата.

**Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом применении препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.**

**Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.**

**4. Побочные эффекты**

Как и при лечении любым лекарственным препаратом, использование Солодент безалкогольный - Ополаскиватель полости рта может привести к возникновению побочных эффектов у некоторых пациентов. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

**Следует прекратить использование лекарства и немедленно обратиться за медицинской помощью** при появлении одного или более из нижеперечисленных

явлений:

- сыпь,
- отечность губ, языка, горла или лица,
- затрудненное дыхание.

Данные явления могут быть симптомами тяжелой и очень редкой аллергической реакции.

**Следует прекратить использование лекарства и обратиться к врачу** при появлении одного или более из нижеперечисленных явлений:

- **раздражение в полости рта,**
- **боли,**
- **отечность на внутренней поверхности** щек.

Перечисленные явления должны пройти с прекращением применения препарата.

**Очень часто встречающиеся (very common)** – побочные эффекты, проявляющиеся с частотой более 1 из 10:

**появление переходящих пятен на языке,** которые исчезают по окончании применения препарата.

**Часто встречающиеся (common)** – проявляющиеся с частотой 1-10 из 100:

- **Сухость во рту;**
- **Изменение вкусового восприятия, ощущение жжения, онемения или покалывания в языке** при первом использовании ополаскивателя. Данные явления обычно проходят по мере дальнейшего использования препарата.

Если же они не проходят, необходимо обратиться к врачу.

**Побочные эффекты неизвестной частоты (эффекты, частота которых до сих пор не установлена):**

• **Появление переходящих пятен на зубах,** которые, как правило, снимаются в ходе чистки зубов. В качестве профилактики появления пятен следует воздерживаться от питья чая, кофе и красного вина - в особенности в первый час после полоскания, - а также чистить зубы дважды в день зубной пастой (см. раздел 3, «Способ применения и дозы»). Если пятна остаются, их можно удалить путем чистки и полировки у стоматолога или стоматолога-гигиениста.

Для удаления пятен с зубных протезов следует чистить их с применением специальных чистящих средств для зубных протезов.

- **Итечность слюнных желез.**
- **Шелушение кожи во рту.** В качестве профилактики следует развести ополаскиватель для полости рта водой в пропорции 1:1.

**В случае появления или обострения** какого-либо из побочных явлений, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, **проконсультируйтесь с врачом.**

**Извещение о побочных эффектах**  
Сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения можно заполнив формулу по ссылке «Уведомление о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)), либо по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

**5. Условия хранения препарата**

- **Не допустите отравления!** Во избежание отравлений данный препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.
- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. Date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

**Условия хранения:**

- Хранить при температуре ниже 25°C.
- Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света.
- После первичного вскрытия упаковки можно использовать препарат не более 6 месяцев и не позднее истечения срока годности, указанного на упаковке.

**6. Дополнительная информация:**

Помимо активных ингредиентов препарат содержит также неактивные ингредиенты: Purified Water, Sorbitol Solution, Glycerin (Glycerol), PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Flavor Pineapple, Peppermint Oil, Sucralose.

**Внешний вид препарата и содержимое упаковки:**

коричневая бутылка, содержащая прозрачный раствор. Выпускается с мерным стаканчиком.

**Размер упаковки:** 300 мл.

**Производитель и владелец регистрационного удостоверения:** Бен Шимон Флорис ЛТД. Индустриальный парк Мисгав. Почтовый ящик 2017400, Израиль. Дата пересмотра данной инструкции в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения - 06/2025.

**Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре Министерства здравоохранения:** 172-5437476-99