

## نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

**(مستحضرات) 1986**

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

# ميرتا تيفع 30 ملغ

**أقرص صلبية**

**التركيبة:**

يحتوي كل قرص من ميرتا تيفع **30 ملغ** على:

ميرتازابين 30 mg
Mirtazapine
للاطلاع على قائمة المواد غير الفعالة ومسببات الأرجية في الدواء، انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

**أقرأ النشرة باهتمام حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** يحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فاسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

لقد وُصف هذا الدواء من أجلي، لا تحمله للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأولاد والمراهقين الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا.

**تزيد الأدوية المضادة للاكتئاب (antidepressants) من خطر نشوء تصرفات وأفكار انتحارية لدى الأولاد والمراهقين والبالغين اليافعين.** عند البدء بالعلاج بالدواء، يجب على متلقي العلاج من جميع الأعمار وأقربائهم أن يتبعوا التغيرات السلوكية مثل: تفانق الاكتئاب، الأفكار الانتحارية، العدوانية وما شابه ذلك. إذا طرأت تغيرات كهذه، فيجب التوجه فورًا إلى الطبيب.

**1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟**

**ميرتا تيفع يُستعمل لعلاج الاكتئاب.**

**الفصلية العلاجية:** مستحضر من فصيلة SNRIs.

**2. قَبْلِ استعمال الدواء**

**لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) لميرتازابين أو لأي من المواد الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (تفصيلها وارد في البند 6 "معلومات إضافية")، في هذه الحالة، عليك التحذّر إلى طبيبك بأسرع وقت ممكن قبل البدء باستعمال ميرتا تيفع.
- كنت تستعمل الآن أو استعملت مؤخرًا (خلال الأسبوعين الأخيرين) أدوية تسمى مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOIs).

**لا تستعمل أو أخبر طبيبك قبل استعمال ميرتا تيفع:**

إذا نشأ لديك في الماضي طفح جلدي خطير، قشّر، حويصلات جلدية و/أو قروح في الفم بعد استعمال ميرتا تيفع أو أدوية أخرى.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**

قبل البدء بالعلاج بميرتا تيفع، كَلِّم طبيبك أو الصيدلي.

**الأولاد والمراهقون**

**ميرتا تيفع ليس مخصصًا للاستعمال لدى الأولاد والمراهقين الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا، لعدم إثبات الفعالية.** كذلك، عليك أن تعلم أن المتعالجين الذين يقلّ عمرهم عن 18 عامًا، الذين استعملوا أدوية من هذه الفصيلة، هم أكثر عرضةً لخطر نشوء أعراض جانبية مثل محاولة الانتحار، الأفكار الانتحارية والعدائية (تحديدًا العدوانية، السلوك المعارض والغضب). مع ذلك، قد يصف الطبيب **ميرتا تيفع** للمرضى الذين يقلّ عمرهم عن 18 عامًا إذا اعتقد أن ذلك يصب في مصلحتهم. إذا وصف لك الطبيب **ميرتا تيفع**، وكنت تبلغ من العمر أقل من 18 عامًا وأردت أن تناقشه في ذلك، فراجع رجاءً إلى طبيبك. عليك إعلام الطبيب إذا ظهر أيّ من الأعراض المفصلة أعلاه أو تفاقم، عندما يُستعمل **ميرتا تيفع** من قِبَل المتعالجين الذين يقلّ عمرهم عن 18 عامًا. كذلك، لم تُثبت بعد تأثيرات **ميرتا تيفع** طويلة الأمد لدى هذه الفئة العمرية، فيما يخص النمو والبلوغ الجنسي والتطور المعرفي والسلوكي. بالإضافة إلى ذلك، شوهد ارتفاع ملحوظ في الوزن لدى هذه الفئة العمرية في أحيان أكثر تقاربًا عند العلاج بميرتا تيفع مقارنةً بالبالغين.

**أفكار عن الانتحار وتفاقم الاكتئاب لديك**

إذا كنت تعاني من الاكتئاب فقد تراودك أحيانًا أفكار عن الإضرار بالنفس أو أفكار انتحارية. قد تتزايد هذه الأفكار عند البدء باستعمال مضادات الاكتئاب لأول مرة، لأن جميع هذه الأدوية تستغرق وقتًا إلى أن تبدأ بالتأثير، عادةً ما يقارب أسبوعين، ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول في بعض الأحيان. قد تكون الاحتمالية أعلى أن تفكر بهذه الطريقة:

- إذا راودتك في الماضي أفكار عن الإضرار بالنفس أو أفكار انتحارية.

إذا كنت بالغًا يافعًا. أظهرت المعلومات من الدراسات السريرية ارتقاعًا في خطر نشوء سلوك انتحاري لدى البالغين الذين يقلّ عمرهم عن 25 عامًا المصابين بحالات نفسية، الذين عولجوا بمضادات الاكتئاب.

**إذا راودتك أفكار عن الإضرار بالنفس أو أفكار انتحارية في أي وقت، فاصصل طبيبك أو توجه مباشرة إلى المستشفى.** قد تجد أنه من المجدى أن تشارك قريبًا **عائليًا** أو **صديقًا مقربًا** بكونك مصابًا بالاكئاب، اطلب منه أن يقرأ هذه النشرة. تستطيع أن تطلب منه أن يخبرك إذا ظن أن اكتئابك يتفاقم أو إذا كان قلقًا من تغيرات في سلوكك.

**كذلك، يجب توخي الكثير من الحذر عند استعمال ميرتا تيفع:**

- إذا وُجدت لديك الآن أو كانت لديك ذات مرة إحدى الحالات التالية (أخبر طبيبك عن هذه الحالات قبل استعمال ميرتا تيفع، إذا لم تفعل ذلك بعد):

- اختلاجات (صرع). إذا نشأت لديك اختلاجات أو أصبحت الاختلاجات لديك أكثر تواترًا، فتوقف عن استعمال **ميرتا تيفع** واتصل فورًا بطبيبك.

- ردود فعل جلدية خطيرة بما في ذلك متلازمة ستيفن-سجوسون (SJS)، قشعر الأنسجة المتموّنة البشرية (التسميم (TEN)). رد فعل على الدواء مصحوب بارتفاع

في خلايا الدم البيضاء (كثرة البوزينيات) وأعراض جهازية (DRESS)، التي تم الإبلاغ عنها عند استعمال ميرتازابين. إذا نشأ واحد أو أكثر من بين الأعراض التي وُصفت، فتوقف عن استعمال **ميرتا تيفع** واتصل فورًا بطبيبك. إذا نشأت لديك ذات مرة ردود فعل جلدية خطيرة،

**فلا يجوز البدء بالعلاج بميرتا تيفع.**

- مرض في الكبد، بما في ذلك اليرقان. إذا نشأ اليرقان، فتوقف عن استعمال **ميرتا تيفع** واتصل فورًا بطبيبك.

- مرض في الكليتين.
- مرض قلبي أو ضغط دم منخفض.
- القصام. إذا أصبحت الأعراض الذهانية، مثل الأفكار المتعلقة بجنون الارتياب، أكثر تواترًا أو تفاقمت، فاتصل فورًا بطبيبك.

- الهوس الاكتئابي (فترات من الشعور بالانتشاء/فرط النشاط وحالة مزاجية مكتئبة على نحو متناوب). إذا بدأت تشعر بالانتشاء أو بفرط الحماس، فتوقف عن استعمال **ميرتا تيفع** واتصل فورًا بطبيبك.

- سكري (يُحتمل أن تضطر إلى ملاءمة جرعتك من الإنسولين أو جرعة أدوية أخرى مضادة للسكري).

- مرض في العينين، مثل ارتفاع الضغط داخل العين (زرق/جلوكوما).

- صعوبة في التبول، قد تنجم عن تضخّم البروستاتا.

- أنواع معينة من الحالات القلبية التي قد تغير نظم قلبك، نوبة قلبية حدثت مؤخرًا، قصور القلب، أو أنك تستعمل أدوية معينة قد تؤثر على نظم القلب.

إذا نشأت لديك علامات التلوث مثل حمى مرتفعة لا تفسير لها، ألم في الحلق وقرح في الفم. **توقف عن استعمال ميرتا تيفع واستشر طبيبك فورًا بخصوص فحص الدم.** في حالات نادرة، قد تكون هذه الأعراض علامات لاضطرابات في إنتاج خلايا الدم في نخاع العظمي. على الرغم من أنها نادرة، تظهر هذه الأعراض غالبًا بعد 4-6 أسابيع من العلاج.

- إذا كنت شخصًا مسنًا، فقد تكون أكثر حساسيةً للأعراض الجانبية لمضادات الاكتئاب.
- التفاعلات بين الأدوية** إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب الصيدلي بذلك.
- لا يجوز استعمال ميرتا تيفع بالدمج مع:**
  - مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين (مثبطات MAO). كذلك، لا يجوز استعمال **ميرتا تيفع** خلال أول أسبوع بعد إيقاف العلاج بمثبطات MAO. إذا توقفت عن استعمال **ميرتا تيفع**، فلا يجوز استعمال مثبطات MAO أيضًا خلال الأسبوعين التاليين. من الأمثلة على مضادات MAO هي موكلوبيد، ترانيليبرومين (كلاهما مضادان للاكتئاب) وسيليجيلين (يُستعمل لمرض الباركنسون).

**يجب توخي الحذر عند استعمال ميرتا تيفع بالدمج مع:**

- مضادات الاكتئاب مثل SSRIs، فينلافكسين و-L-تريبتوفان أو تريبتانات (تستعمل لعلاج الصداع النصفي)، ترامادول (مسكن للألام)، ليفيزوليد (مضاد حيوي)، ليثيوم (لعلاج حالات نفسية معينة)، الميتيلين الأزرق (لعلاج المستويات المرتفعة ليميثيموجلوبين في الدم) و-St. John's Wort – مستحضرات العرن المثقوب (جواء نباتي للاكتئاب). في حالات نادرة جدًا، قد يؤدي **ميرتا تيفع** لوحده أو دمج **ميرتا تيفع** مع هذه الأدوية، إلى حالة تسمى متلازمة السيروتونين. بعض أعراض هذه المتلازمة هي: حمى لا تفسير لها، تعرق، ازدياد في وتيرة القلب، إسهال، تقلصات عضلية (غير خاضعة للسيطرة)، ارتجاع، منعكسات نشطة أكثر من اللازم، قلة الهذوء (تململ)، تغيرات في المزاج وغياب عن الوعي. إذا وُجد لديك مزيج من هذه الأعراض فكلّم طبيبك فورًا.
- مضاد الاكتئاب نيفازيدون. قد يرفع مستويات **ميرتا تيفع** في دمك. أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل هذا الدواء. قد تكون هناك حاجة إلى تقليل جرعة **ميرتا تيفع** أو رفع جرعة **ميرتا تيفع** مرة أخرى، بعد إيقاف العلاج بنيفازيدون.
- أدوية للقلق أو الأرق مثل البنزوديازيبينات؛ أدوية للصدام مثل أولانزابين؛ أدوية للحساسية مثل سيتريزين؛ أدوية للآلام الشديدة مثل مورفين. بالدمج مع الأدوية الواردة أعلاه، قد يزيد **ميرتا تيفع** من التأثير المنعس.

- أدوية للتلوثات؛ أدوية للتلوثات الجرثومية (مثل ايربثروميسين)، أدوية لعلاج التلوثات الفطرية (مثل كيتوكونازول)، أدوية لـ HIV/ايدز (مثل نيفيرتين HIV وبروتياز) وأدوية لقروح المعدة (مثل سيميبتيدين). عند الدمج مع **ميرتا تيفع**، قد ترفع هذه الأدوية مستويات **ميرتا تيفع** في دمك. أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل هذه الأدوية. قد تكون هناك حاجة إلى تقليل جرعة **ميرتا تيفع** أو رفع جرعة **ميرتا تيفع** مرة أخرى، بعد إيقاف العلاج بهذه الأدوية.
- أدوية للصرع مثل كاربامازيبين وفينيتوين؛ أدوية للسّل مثل ريفامبسين. عند الدمج مع **ميرتا تيفع**، قد تقلل هذه الأدوية مستويات **ميرتا تيفع** في دمك. أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل هذه الأدوية. قد تكون هناك حاجة إلى رفع جرعة **ميرتا تيفع**، أو تقليل جرعة **ميرتا تيفع** مرة أخرى بعد إيقاف العلاج بهذه الأدوية.
- أدوية لمنع تخثر الدم مثل وارفارين. قد يعزز **ميرتا تيفع** تأثيرات وارفارين على تخثر الدم. أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل هذا الدواء. في حالة الدمج، يوصى بأن يراقب الطبيب وظائف التخثر بحذر.
- أدوية قد تؤثر على نظم القلب مثل بعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية المضادة للذهان.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**

قد تشعر بالنعاس إذا شربت الكحول في فترة استعمال **ميرتا تيفع**.

يوصى بعدم شرب الكحول بتأتًا.

**استعمال الدواء والطعام**

يمكن تناول **ميرتا تيفع** مع الطعام أو بدونه.

**الحمل، الإرضاع والحصولية**

إذا كنت حاملاً أو مرضعًا، أو تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو تحططين للحمل، فاطلبي مشورة طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

الخبرة المحدودة في إعطاء **ميرتا تيفع** للنساء الحوامل لا تشير إلى ازدياد في الخطر. مع ذلك، يجب توخي الحذر عند الاستعمال في الحمل. إذا استعملت **ميرتا تيفع** حتى الولادة أو حتى ما قبل الولادة بوقت قصير، فيجب مراقبة طفلك الرضيع لغرض الكشف عن أعراض جانبية محتملة.

تأكدي من أن القابلة و/أو الطبيب يعلمان أنك تستعملين **ميرتا تيفع** عند استعمالها أثناء الحمل، قد تزيد الأدوية المشابهة (SSRIs) من خطر نشوء حالة خطيرة لدى الرضع تسمى فرط ضغط الدم الرئوي المستمر لدى المولود (PPHN)، الذي يجعل الرضيع يتنفس بشكل أسرع ويبدو مائلًا إلى الزرقة. تبدأ هذه الأعراض في الظهور عادةً خلال الساعات الـ 24 الأولى بعد ولادة الطفل. إذا حدث ذلك لطفلك، فعليك الاتصال فورًا بالقابلة و/أو بطبيبك.

**السياقة واستعمال الماكينات**

**ميرتا تيفع** يمكن أن يؤثر على التركيز أو اليقظة لديك. عليك التأكد من عدم تأثر هذه القدرات من استعمال **ميرتا تيفع** قبل أن تسوق أو تشغّل الماكينات.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

**يحتوي أقرص ميرتا تيفع على اللكتوز.** إذا أخربك طبيبك بأن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، فاتصل بطبيبك قبل استعمال هذا الدواء (انظر أيضًا البند 6 "معلومات إضافية").

- ميرتا تيفع** يحتوي على أقل من 1 ميليول من الصوديوم (23 ملغ) في كل قرص، وذلك يعتبر "خاليًا من الصوديوم".

**3. كيف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية ومدّة العلاج سيدعهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية المتّبعة عادة هي:

**الجرعة الابتدائية المتبعة عادةً هي 15 أو 30 ملغ كل يوم.** قد يقدم لك طبيبك المشورة بعد بضعة أيام عن أفضل جرعة لك (بين 15 إلى 45 ملغ في اليوم). في الغالب، الجرعة متطابقة لدى جميع الأعمار. مع ذلك، إذا كنت شخصًا مسنًا أو إذا كان لديك مرض كلوي أو مرض كبدي، فقد يقوم بطبيبك بملاءمة الجرعة.

**يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

**متى ينبغي تناول ميرتا تيفع**

يجب تناول **ميرتا تيفع** في نفس الوقت كل يوم. يُفضّل تناول **ميرتا تيفع** على شكل جرعة وحيدة قبل النوم. مع ذلك، قد يقترح عليك طبيبك أن تقسم جرعة **ميرتا تيفع** – مرة في الصباح ومرة في المساء قبل النوم. يجب أن يتم تناول الجرعة الأكبر قبل النوم.

يجب تناول الأقرص عن طريق الفم.

يجب ابتلاع القرص مع القليل من الماء أو العصير.

عند الحاجة يمكن شطر القرص في خط الشطر. لا تتوفر معلومات بخصوص هريس أو مضغ القرص.

**متى يمكنك ترقب البدء بالشعور بالتحسن:**

عادة، سيبدأ **ميرتا تيفع** بالعمل بعد أسبوع-أسبوعين وقد تبدأ بالشعور بالتحسن بعد 2-4 أسابيع. من المهم أن تكلم طبيبك خلال

الأسابيع الأولى من العلاج بخصوص تأثيرات **ميرتا تيفع**.

**بعد 4-2 أسابيع من البدء بالعلاج بميرتا تيفع، أخبر طبيبك كيف**

**أثر الدواء عليك.**

إذا لم تشعر بتحسن حتى ذلك الوقت، فقد يصف لك طبيبك جرعة أعلى. في هذه الحالة، كَلِّم طبيبك مرة أخرى بعد 4-2 أسابيع إضافية.

عادة، ستستعين عليك الاستمرار باستعمال **ميرتا تيفع** إلى أن تختفي أعراض الاكتئاب لديك لمدة 4-6 أشهر.

**إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم من ميرتا تيفع فعليك**

الاتصال بالطبيب على الفور.

العلامات الأكثر شيوعًا لفرط جرعة **ميرتا تيفع** (بدون أدوية إضافية أو كحول) هي نعاس، توهان والارتقاع في وتيرة القلب. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فيجب التوجه فورًا إلى الطبيب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك.

يمكن أن تشمل الأعراض الإضافية لفرط الجرعة المحتمل على تغيرات في نظم القلب (نظم قلبي سريع، غير متجانس) و/أو إعفاء وهي قد تكون أعراضًا لحالة تشكل خطرًا على الحياة تسمى Torsade de Pointes (تسرع القلب البطيني).

**إذا نسيت تناول الدواء**

إذا كان من المفترض أن تتناول جرعتك مرة واحدة في اليوم:

- لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.
- يجب تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي.

إذا كان من المفترض أن تتناول جرعتك مرتين في اليوم:

- إذا نسيت أن تتناول جرعتك الصباحية، فتناولها مع جرعتك المسائية.

إذا نسيت أن تتناول جرعتك المسائية، فلا يجوز أن تتناولها مع جرعة الصباح القادمة؛ بل تحطها واصل استعمال جرعتي الصباح والمساء الاعتياديتين الخاصتين بك.

إذا نسيت تناول الجرعتين، فلا تحاول أن تعوض الجرعتين المنسيتين. تخطّ الجرعتين واصل استعمال جرعتي الصباح والمساء الاعتياديتين الخاصتين بك في الغد.

**إذا توقفت عن استعمال الدواء**

يمكن التوقف عن استعمال **ميرتا تيفع** فقط بعد استشارة طبيبك. إذا توقفت عن استعماله أبكر من اللازم، فقد يعود الاكتئاب لديك.

كَلِّم طبيبك بمجرد أن تشعر بتحسن. سيقرر طبيبك متى سيكون إيقاف العلاج ممكنًا. لا توقف عن استعمال **ميرتا تيفع** بشكل فجائي، حتى لو أخفتك الاكتئاب لديك. إذا توقفت عن استعمال **ميرتا تيفع** بشكل فجائي فقد تشعر بالغثاين، بالدوار، بالاهاياج أو بالقلق وقد تصاب بالصداع. يمكن منع هذه الأعراض عن طريق إيقاف العلاج تدريجيًا. سيخبرك طبيبك بكيفية تقليل الجرعة تدريجيًا.

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

**4. الأعراض الجانبية**

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال **ميرتا تيفع** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

إذا نشأ لديك أي من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية، فتوقف عن استعمال **ميرتا تيفع** وأخبر طبيبك فورًا.

**أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 10 أشخاص):**

• مشاكل في الذاكرة تزول في معظم الحالات عند إيقاف العلاج.

**أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 100 شخص):**

• إحساس بالانتشاء أو "هاي" (مشاعر الهوس).

**أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 1,000 شخص):**

• تلوّن العينين أو الجلد باللون الأصفر. قد يرمز هذا الشيء إلى اضطراب في وظيفة الكبد (يرقان).

• ألم شديد في الجزء الخلفي من البطن يظهر في بعض الأحيان مع غثاين وتقيؤات (التهاب في البنكرياس).

**أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (لا يمكن تقدير مدى شيوعها من المعلومات المتوفرة):**

• أفكار عن الإضرار بالنفس أو أفكار انتحارية – اتصل فورًا بطبيبك أو توجه مباشرة إلى المستشفى.

• رد فعل جلدي يُعرف باسم الحمّامى متعددة الأشكال (آفات مثيرة للحكة، بتفسيجية ضاربة إلى الحمرة على الجلد، خاصةً على كُفَي اليدين أو أخصص القدمين؛ مناطق منتخخة شبيهة بالشرى ومرفوعة عن الجلد؛ وتقيؤات؛ صداع؛ حساسية على سطح العينين والأعضاء الجنسية، وقد تكون مصحوبة بالحمى والتعب).

• طفح جلدي خطير، حويصلات (التهاب الجلد الفقاعي).

• آفات حمراء على الجسم التي تشكل بقع مستديرة ذات مركز أغمق (شبيهة بلوح الهدف)، تكون عادةً مصحوبة بالحويصلات، تقشر الجلد، القروح في الفم أو الحلق أو الأنف

أو العينين أو الأعضاء الجنسية. تسبق هذا الطفح الخطير حمى وأعراض شبيهة بالإنفلونزا (أعراض رد فعل جلدي شديد يسمى متلازمة ستيفن-سجوسون أو تقشر الأنسجة المتموّنة البشرية (تسمى).

- طفح جلدي واسع الانتشار، حرارة جسم مرتفعة وتضخم الغدد الليمفاوية (متلازمة DRESS أو متلازمة فرط الحساسية).

• علامات على التلوث مثل حمى مرتفعة لا تفسير لها، ألم في الحلق أو تقرّحات في الفم (ندرة المحبيبات). في حالات نادرة، يمكن أن يسبب ميرتازابين اضطرابات في إنتاج خلايا الدم (كبت نخاع العظمي). يصبح بعض الأشخاص أقل مقاومة

للتلوث لأن ميرتازابين يمكن أن يسبب نقصًا مؤقتًا في خلايا الدم البيضاء (قلة المحبيبات). في حالات نادرة، يمكن أن يسبب ميرتازابين أيضًا نقصًا مؤقتًا في خلايا الدم الحمراء والبيضاء

وكذلك الصفائح (فقر الدم اللاتنسجي)، نقصًا في الصفائح الدموية (قلة الصفائح) أو ارتفاعًا في عدد خلايا الدم البيضاء (كثرة البوزينيات).

• نوبة صرعية (اختلاجات).

• مزيج من الأعراض مثل حمى مرتفعة لا تفسير لها، تعرق، ازدياد في وتيرة القلب، إسهال، تقلصات عضلية (غير خاضعة للسيطرة)، ارتجاع، منعكسات نشطة أكثر من اللازم، قلة الهذوء (تململ)، تغيرات في المزاج، غياب عن الوعي وتزايد الترويل (سيلان للعاب). في حالات نادرة جدًا، يمكن أن تكون هذه علامات لمتلازمة السيروتونين.

• آلام، تصلّب و/أو ضعف في العضلات وبالإضافة إلى ذلك اغشاق أو تغير لون البول (انحلال العضل).

**الأعراض الجانبية المحتملة الأخرى عند استعمال ميرتا تيفع هي:**

**شائعة جدًا (قد تؤثر على أكثر من شخص 1 من بين 10 أشخاص):**

- زيادة في الشهية وارتفاع الوزن.

• نعاس أو ميل إلى النوم.

• صداع.

• خفاف في الفم.

**شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 10 أشخاص):**

• حمول (إيثارجي).

• دوار.

• انعدام الثبات أو ارتجاع.

• غثاين.

• إسهال.

• تقيؤ.

• إسهالك.

• طفح أو طفوح جلدية (exanthema).

• ألم في المفاصل (آرثرالгия) أو الألم في العضلات (ميجاليج).

• ألم في الظهر.

• شعور بالدوار أو الإغماء عندما تنهض وافيًا بشكل فجائي (نقص ضغط الدم عند الوقوف).

• انتفاخ (عادةً في الكاحلين أو القدمين) ينجم عن احتباس السوائل (وذمة).

• تعب.

• آلام محسوسة.

• ارتباك.

• إحساس بالقلق.

• مشاكل في النوم.

**غير شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 100 شخص):**

• أحاسيس شاذة في الجلد، على سبيل المثال، لذع، وخز، دغدغة أو تمتميل (خدر).

• تململ الرجلين.

• إغماء (سينكوبي).

• خدر في الفم (نقص التحسس في الفم).

• ضغط دم منخفض.

• كوابيس.

• إحساس بالهايج.

• هوسات.

• دافع للتحرك.

**نادرة (قد تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 1,000 شخص):**

• تشنجات أو تقلصات عضلية (رمع عضلي).

• عدوانية.

**غير معلوم (لا يمكن تقدير مدى الشيوع من المعلومات المتوفرة):**

• أحاسيس شاذة في الفم (تمتميل في الفم).

• انتفاخ في الفم (وذمة في الفم).

• انتفاخ في الجسم (وذمة عامة).

• انتفاخ موضعي.

• مستويات صوديوم منخفضة في الدم (نقص الصوديوم في الدم). إفراز غير ملائم لهرمون ينظم مستويات الماء في الدم (الهرمون المضاد لإدرار البول).

• تزايد الترويل (سيلان للعاب).

• المشي أثناء النوم (somnambulism).

• اضطرابات في النوم.

• ارتفاع في مستويات كرياتين كيناز في الدم.

• صعوبة في التبول (احتباس البول).

• ارتفاع في مستويات الهرمون بروتولاكتين في الدم (فرط بروتولاكتين الدم، يشمل عرضي تضخم الثديين و/أو إفراز الحليب من الحلمتين).

• انتصاب متواصل ومؤلم (priapism).

**أعراض جانبية إضافية لدى الأولاد والمراهقين**

شوهدت الأعراض الجانبية التالية بشكل شائع في الدراسات السريرية لدى الأولاد الذين يبلغون أقل من 18 عامًا من العمر.