



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986
يُسَوَّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ليريكا 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 ملغ, كبسولات

تحتوي كل كبسولة على بريجابالين (Pregabalin) 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 أو 300 ملغ, على التوالي

مواد غير فعالة ومسببات الحساسية (مستأرجات) في الدواء – أنظر بند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 تحت "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء"

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف للعلاج من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الطبي مشابه. هذا الدواء غير مُخصَّص للاستعمال لدى الأطفال والمراهقين تحت جيل 18 سنة.

1. لأي غرض مُخصَّص الدواء؟

لعلاج الألم عصبي المنشأ (عصبي) لدى البالغين, لعلاج الألم العضلي الليفي (ألم عضلي ليفي – Fibromyalgia) ولعلاج اضطراب القلق العام لدى البالغين.

الفصيلة العلاجية:

قرين للحمض جاما أمينوبوتيريك (gamma-aminobutyric acid).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعالة (بريجابالين) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (المفصلة في بند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

توجه إلى طبيبك قبل تناول ليريكا.

- بلغ بعض المرضى الذين يتناولون ليريكا عن أعراض جانبية أرجية. هذه الأعراض تشمل انتفاخ في الوجه, في الشفتين, في اللسان وفي البلعوم وكذلك طفح جلدي منتشر. إذا قاسيت واحد أو أكثر من هذه الأعراض, عليك التوجه بشكل فوري إلى الطبيب.
- طفح جلدي وخيم, مثل متلازمة ستيفين-جونسون وتقرش الأنسجة المتموتة البشري التسممي, تم الإبلاغ عنها في سياق استعمال ليريكا. يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا قاسيت واحد أو أكثر من الأعراض المرتبطة بالأعراض الجلدية الخيمة الموصوفة في بند 4.
- قد يسبب الدواء الدوار والنعاس, لذلك المرضى البالغين الذين يتناولون الدواء يكونون في إخطار (احتمال الخطر) أكبر للسقوط والإصابات. يجب توخي الحذر حتى تعتاد على تأثير الدواء عليك.
- قد يسبب الدواء لضبابية أو فقدان الرؤية أو تغيرات أخرى في الرؤية, التي يزول معظمها – يجب إبلاغ الطبيب بشكل فوري عن كل تغير يطرأ في الرؤية.
- لدى مرضى سكري معينين, الذين يزداد وزنهم نتيجة العلاج بالدواء, قد تكون هناك حاجة لملاءمة جرعات الأدوية لخفض مستوى السكر في الدم.
- أعراض جانبية معينة, مثل النعاس, قد تكون أكثر شيوعاً, لأن المرضى الذين يعانون من إصابة في العمود الفقري قد يتناولون أدوية إضافية لعلاج الألم والتشنجات, التي لها أعراض جانبية مشابهة لتلك التي لليريكا وقد تزداد خطورتها عند تناولها سوياً.
- لدى بعض المرضى الذين تناولوا ليريكا تم التبليغ عن فشل قلبي, خصوصاً لدى البالغين ذوي أمراض قلب وأوعية دموية. قبل البدء باستعمال الدواء, يجب اعلام الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في السابق من أمراض قلب.
- هناك عدة بلاغات عن فشل كلوي على خلفية العلاج بليريكا. إذا لاحظت خلال العلاج بالدواء بقلة التبول, يجب إبلاغ الطبيب بذلك, حيث أن إيقاف العلاج بالدواء من شأنه أن يؤدي لتحسن.

- لدى مرضى معينين، الذين تم علاجهم بأدوية مضادة للصرع مثل **ليريكا**، تم التبليغ عن أفكار لإلحاق الأذى بالذات أو أفكار انتحارية أو أظهروا تصرفات انتحارية. في حال ظهور أفكار أو تصرفات من هذا القبيل في أي مرحلة، يجب التوجه الى الطبيب فورًا.
- دمج **ليريكا** مع أدوية أخرى (مثل أنواع معينة من مسكنات الألم) التي قد تسبب الإمساك، قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل إمساك، انسداد أو شلل الأمعاء). يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني من إمساك، خصوصًا إذا كان هناك ميل لحدوث إمساك.
- قبل البدء بعلاج الدواء، يجب إعلام الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في السابق من تعلق أو إدمان على المشروبات الروحية، على المخدرات أو على أدوية أياً كانت. في هذه الحالة قد يكون لديك احتمال أكبر لتطوير تعلق ب**ليريكا**.
- خلال استعمال الدواء أو فور إيقافه قد تظهر تشنجات – يجب اعلام الطبيب بشكل فوري إذا كنت تعاني من تشنجات. لدى بعض المرضى مع أمراض أساسية إضافية تم التبليغ عن انخفاض في الأداء الوظيفي للمخ (اعتلال دماغي).
- يجب اعلام الطبيب إذا كنت تعلم بوجود وضع طبي ذو أبعاد ملحوظة، بما في ذلك أمراض كبد وكلية.
- تم التبليغ عن صعوبات تنفس. إذا كان لديك اضطرابات في جهاز الأعصاب، اضطرابات تنفس، خلل كلوي أو أنك فوق جيل 65 سنة، قد يصف لك الطبيب نظام جرعات آخر. استشر الطبيب إذا كان لديك صعوبة في التنفس أو تنفس سطحي.

التعلق

سوف بطور أشخاص معينين تعلقًا ب**ليريكا** (حاجة لمواصلة تناول الدواء). قد بطورون أعراض انسحابية عند إيقاف استعمال **ليريكا** (أنظر بند 3 "كيفية استعمال الدواء؟" و"إذا توقفت عن تناول الدواء"). إذا كان هنالك خوف من تطور تعلق ب**ليريكا**، من المهم أن تستشير الطبيب.

إذا لاحظت إحدى العلامات التالية عند تناولك **ليريكا**، قد يكون ذلك علامة على تطور تعلق لديك:

- إذا كنت بحاجة لتناول الدواء لفترة زمنية أطول من التي وُصفت لك
- كنت تشعر بحاجة لتناول جرعة أكبر من التي وُصفت لك
- كنت تستعمل الدواء لأسباب مختلفة عن تلك التي وُصف الدواء لك من أجلها
- كانت لديك محاولات متكررة وغير ناجحة لإيقاف الادواء أو التحكم باستعمال الدواء
- عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر أنك لست على ما يرام، وتشعر بتحسن بعد تناول الدواء مرة أخرى

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، يجب التوجه الى الطبيب واستشارته بخصوص العلاج الأمثل من أجلك، بما في ذلك متى يجب التوقف عن تناول الدواء وكيفية القيام بذلك بأمان.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ أو أخذت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خصوصًا إذا كنت تأخذ:

قد يكون ل**ليريكا** ولأدوية معينة تأثير متبادل على الفاعلية.

إذا تم أخذ **ليريكا** بالتزامن مع أدوية معينة ذات تأثير مهدئ (بما في ذلك الأفيونيات)، قد يزيد **ليريكا** من هذه التأثيرات وقد يؤدي لفشل تنفسي، لغيوبة والى الوفاة. قد تزداد حدة الدوار، النعاس وانخفاض التركيز إذا تم أخذ **ليريكا** بالتزامن مع:

أوكسيكودون – دواء لتسكين الألم
لورازيبام – دواء لعلاج القلق
الكحول

يمكن تناول **ليريكا** مع أقراص منع الحمل.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو بدون الطعام.

استعمال الدواء والكحول

لا يجوز استهلاك الكحول أثناء العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يجوز استعمال **ليريكا** خلال الحمل أو فترة الإرضاع. إلا إذا كان بتعليمات من الطبيب بعد الاستشارة معه. استعمال **ليريكا** خلال 3 أشهر الحمل الأولى قد يسبب تشوهات خلقية لدى الجنين التي تتطلب علاج طبي. في بحث الذي فحص معطيات لدى نساء من الدول الإسكندنافية اللواتي تناولن **ليريكا** خلال 3 أشهر الحمل الأولى، 6 رضع من بين 100 عانوا من تشوهات خلقية كذلك. هذا بالمقارنة مع 4 رضع من بين 100 الذين ولدوا لنساء اللواتي لم تتعالجن

ببريچا بالين في البحث. تم التبليغ عن شذوذ في الوجه (شقوق في الوجه وفي الفم), في العينين, في الجهاز العصبي (بما في ذلك الدماغ), في الكلى وفي الأعضاء الجنسية.

يتوجب على النساء اللواتي يمكن ان يحملن خلال العلاج بالدواء استعمال وسائل منع حمل فعالة. إذا كنت حامل أو ترضعين, تظنين أنك حامل أو تخططين للدخول في حمل, استشيرى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات الخطرة حتى تعرف كيفية تأثير الدواء عليك, لان استعمال هذا الدواء قد يسبب الدوار, نعاس او انخفاض التركيز.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي ليريكا على لاكتوز مونوهيدرات. إذا قيل لك في السابق من قبل الطبيب أنه يوجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة, يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

يحتوي هذه الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) للكبسولة, أي أنه عملياً "خالي من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائما استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة وطريقة العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول

يجب بلع الكبسولة بأكملها. يمنع فتح وبعثرة محتوى الكبسولة, لأن طرق الإعطاء هذه لم يتم فحصها. يجب بلع الدواء مع الماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ, عليك التوجه فوراً لغرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك. قد تشعر بالنعاس, الارتباك, قلق أو قلة الراحة نتيجة تناول جرعة مفرطة من ليريكا. كذلك تم التبليغ عن نوبات تشنج (اختلاجات) وفقدان الوعي (سبات).

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد

من المهم تناول الدواء كل يوم في ساعة ثابتة. إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد, لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على وضعك الصحي, لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إذا تقرر إيقاف العلاج, سيقوم الطبيب بشرح كيفية القيام بذلك. إيقاف العلاج بالدواء يجب أن يتم بشكل تدريجي, على مدة أسبوع على الأقل.

بعد إيقاف العلاج بالدواء (سواء كان علاج طويل أو قصير الأمد) من الممكن أن تقاسي أعراض معينة التي تسمى أعراض انسحابية. هذه الأعراض تشمل أرق, صداع, غثيان, قلق, اسهال, أعراض شبيهة بالإنفلونزا, اختلاجات, عصبية, اكتئاب, أفكار عن إيذاء الذات أو انتحارية, آلام, تعرق ودوار. كلما تم تناول الدواء لفترة زمنية أطول, هذه الأعراض قد تكون أكثر شيوعاً أو خطورة. إذا كنت تعاني من أعراض انسحابية, يجب التوجه الى الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

ككل أيّ دواء, قد يسبب استعمال ليريكا أعراضاً جانبيةً لدى جزء من المستخدمين. لا تفرع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجه فوراً الى الطبيب إذا كنت تعاني من انتفاخ في الوجه أو في اللسان أو من رد فعل جلدي وخيم (احمرار الجلد واكتسائه بالحوصلات أو تقشره).

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):
دوار, شعور بالنعاس, صداع.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100):

- شهية مرتفعة.
- شعور بارتفاع المعنويات, ارتباك, توهان, انخفاض الرغبة الجنسية, عصبية.
- اضطرابات في التركيز والذاكرة, فقدان الذاكرة, بلاهة, رعاش, اضطراب في النطق, شعور بوخز, خدر/قلة الإحساس, تهديئة, نؤام, أرق, تعب, شعور شاذ.
- ضبابية الرؤية, ازدواجية الرؤية.
- دوار, اضطرابات في التوازن, سقوط.
- جفاف في الفم, إمساك, تقيؤ, غازات, إسهال, غثيان, بطن منتفخة.
- مشاكل في الانتصاب.
- انتفاخ الجسم, بما في ذلك الأطراف.
- شعور بالثمل, طريقة مشي شاذة.
- ارتفاع في الوزن.
- تشنج العضلات, ألم مفاصل, ألم ظهر وأطراف.
- ألم حلق.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- فقدان الشهية, انخفاض الوزن, انخفاض مستوى السكر في الدم, ارتفاع مستوى السكر في الدم.
- تغير النظرة إلى الذات, قلة هدوء, اكتئاب, قلق, تغيرات في المزاج, صعوبة في إيجاد الكلمات, هذيان, أحلام غريبة, نوبات هلع, لا مبالاة, عدوانية, مزاج مرهف, اضطرابات نفسية, صعوبة في التفكير, زيادة الرغبة الجنسية, مشاكل في الأداء الجنسي, يشمل عدم القدرة للوصول للنشوة الجنسية, تأخير القذف.
- تغيرات في الرؤية يشمل فقدان الرؤية المحيطية, تراقص العينين, ومضات ضوء, حركات قفزية, تناقص الاستجابة للمنعكسات, نشاط, دوار أثناء الوقوف, حساسية جلدية, فقدان المذاق, شعور بالحرقه, رعاش خلال الحركة, انخفاض مستوى الوعي, فقدان الوعي, إغماء, حساسية مفرطة للموضوعاء, شعور بالمرض.
- عيون جافة, انتفاخ أو ألم في العين, ضعف العينين, عيون دامعة, تهيج في العين.
- اضطرابات في نظم القلب, نظم قلب متسارع, ضغط دم منخفض أو مرتفع, تغيرات في النبض, فشل قلبي.
- تورد, هبات من الحر.
- صعوبات في التنفس, جفاف في الأنف, انسداد الأنف.
- إنتاج لعاب متزايد, حرقه, خدر حول الفم.
- تعرق, طفح, قشعريرة, سخونة.
- تشنجات عضلية, انتفاخ المفاصل, تصلب العضلات, ألم يشمل ألم العضلات, ألم رقبة.
- ألم في الثديين.
- صعوبة أو ألم عند التبول, سلس بولي.
- ضعف, عطش, ضغط في الصدر.
- تغيرات في فحوصات الدم ووظائف الكبد (ارتفاع في الكيراتين فوسفوكيناز في الدم, ارتفاع في انزيمات الكبد, انخفاض في صفائح الدم, قلة العدلات, ارتفاع الكيراتينين في الدم, انخفاض البوتاسيوم في الدم).
- حساسية مفرطة, انتفاخ في الوجه, حكة, شرى, رشح, نزيف من الأنف, سعال, شخير.
- آلام في الدورة الشهرية.
- أيدي وأرجل باردة.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- شذوذ في حاسة الشم, تقلب في الرؤية, تغيرات في ادراك العمق, سطوح بصري, فقدان البصر.
- توسع الحدقتين, حول.
- تعرق بارد, تهيج في الحلق, لسان منتفخ.
- التهاب في البنكرياس.
- صعوبة في البلع.
- تباطؤ أو تناقص حركات الجسم.
- صعوبات في الكتابة.

- وذمات في منطقة البطن.
- سوانل في الرنتين.
- تشنجات.
- تغيرات في التخطيط الكهربائي للقلب والتي توافق اضطراب نظم القلب.
- تضرر العضلات.
- افرزات من الثديين, تضخم شاذ للثديين, تضخم الثديين لدى الرجال.
- اضطرابات في الدورة الشهرية.
- فشل كلوي, انخفاض في حجم البول, حصر بول.
- انخفاض في عد خلايا الدم البيضاء في فحوصات الدم.
- سلوك شاذ, سلوك انتحاري, أفكار انتحارية.
- ردود فعل أرجية التي قد تتجلى بصعوبة في التنفس, التهاب العينين (التهاب القرنية), وردود فعل جلدية وخيمة التي تتجسد ببقع دائرية, حمراء, غير نائنة في منطقة جذع الجسم, التي في أحيان متقاربة تكون مصحوبة بحويصلات في مركزها, تقشر الجلد, تقرحات في الفم, في الحلق, في الأنف, في الأعضاء الجنسية وفي العينين. يمكن أن تكون لهذه الاعراض الجلدية الوخيمة أعراض مسبقة, مثل سخونة وأعراض شبيهة بالانفلونزا (متلازمة ستيفين-جونسون, تقشر الانسجة المتموتة البشرية التسممي).
- يرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين).
- الباركنسونية, أي اعراض تشبه لمرض الباركنسون مثل الرعشة, بطء الحركة (تناقص القدرة على الحركة) وتيبس (تصلب العضلات).

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

- فشل كبدى.
- التهاب الكبد (هيباتيتيس).

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- تطوير تعلق بليريكيا
- بعد إيقاف العلاج بليريكيا (سواء كان علاج طويل أو قصير الأمد) من الممكن أن تقاسي أعراض معينة التي تسمى أعراض انسحابية. (أنظر بند 3 "إذا توقفت عن تناول الدواء").

أعراض جانبية معينة, مثل النعاس, قد تكون أكثر شيوعاً, لأن المرضى الذين يعانون من إصابة في العمود الفقري قد يتناولون أدوية إضافية لعلاج الألم والتشنجات, التي لها أعراض جانبية مشابهة لتلك التي لليريكيا وقد تزداد خطورتها عند تناولها سوياً.

الأعراض الجانبية التالية تم التبليغ عنها بعد تسويق الدواء: صعوبات في التنفس وتنفس سطحي.

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية, أو عن طريق دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

إضافة للمركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على:

Lactose monohydrate, maize starch, talc, gelatin, water, titanium dioxide, sodium lauryl sulphate, silica colloidal anhydrous.

كبسولات ليريكاً 75 ملغ, 100 ملغ, 200 ملغ, 225 ملغ و 300 ملغ تحتوي أيضاً على:

Red iron oxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

- ليريكاً 25 ملغ: كبسولة بلون أبيض مع الكلمة "VTRS" مختومة في جهة واحدة و- "PGN 25" في الجهة الثانية.
ليريكاً 50 ملغ: كبسولة بلون أبيض مع خط أسود مع الكلمة "VTRS" مختومة في جهة واحدة و- "PGN 50" في الجهة الثانية.
ليريكاً 75 ملغ: كبسولة بلون أبيض مع خط برتقالي مع الكلمة "VTRS" مختومة في جهة واحدة و- "PGN 75" في الجهة الثانية.
ليريكاً 100 ملغ: كبسولة بلون أبيض مع خط بني مع الكلمة "VTRS" مختومة في جهة واحدة و- "PGN 100" في الجهة الثانية.
ليريكاً 150 ملغ: كبسولة بلون أبيض مع الكلمة "VTRS" مختومة في جهة واحدة و- "PGN 150" في الجهة الثانية.
ليريكاً 200 ملغ: كبسولة بلون أبيض مع خط برتقالي فاتح مع الكلمة "VTRS" مختومة في جهة واحدة و- "PGN 200" في الجهة الثانية.
ليريكاً 225 ملغ: كبسولة بلون أبيض-برتقالي فاتح مع الكلمة "VTRS" مختومة في جهة واحدة و- "PGN 225" في الجهة الثانية.
ليريكاً 300 ملغ: كبسولة بلون أبيض-برتقالي مع الكلمة "VTRS" مختومة في جهة واحدة و- "PGN 300" في الجهة الثانية.

أحجام العبوات المصادق عليها: 14, 21, 28, 56, 84, 100, 112 كبسولة.

قد لا تسوق كافة أحجام العبوات.

تم التنقيح في كانون الأول 2024 حسب تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ليريكاً 25 ملغ:	132.97.31185.00
ليريكاً 50 ملغ:	132.98.31186.00
ليريكاً 75 ملغ:	132.99.31187.00
ليريكاً 100 ملغ:	133.01.31188.00
ليريكاً 150 ملغ:	133.02.31189.00
ليريكاً 200 ملغ:	133.03.31190.00
ليريكاً 225 ملغ:	148.19.33471.00
ليريكاً 300 ملغ:	133.04.31191.00

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض, شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل.