

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

הידרוקורטיזון 10 מ"ג, טבליות

כל טבלייה מכילה: 10 מ"ג הידרוקורטיזון (Hydrocortisone 10 mg).
מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.

התרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

אם אתה חווה תופעות לוואי כלשהן, דבר עם הרופא שלך או הרוקח. זה כולל כל תופעות לוואי אפשריות אשר אינן מופיעות בעלון זה - ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".

- **הידרוקורטיזון היא תרופה סטרואידית הנרשמת עבור מגוון מצבים שונים, כולל מחלות חמורות.**
- **יש ליטול את התרופה באופן קבוע** כדי לקבל את התועלת המרבית.
- **אל תפסיק ליטול את התרופה ללא היוועצות עם הרופא שלך** - ייתכן שתצטרך להפחית את המינון בהדרגתיות.
- **הידרוקורטיזון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהאנשים** (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). בעיות מסוימות כמו שינויי מצב רוח (תחושת דיכאון או רוממות רוח) או בעיות קיבה יכולות להתרחש מייד. אם אתה מרגיש לא טוב בכל דרך שהיא, המשך ליטול את הטבליות שלך **ופנה לרופא שלך באופן מיידי**.
- **חלק מתופעות הלוואי מתרחשות רק לאחר שבועות או חודשים.** תופעות הלוואי כוללות חולשה של הזרועות והרגליים או התעגלות של הפנים (למידע נוסף, ראה בסעיף 4 "תופעות לוואי").
- **שמור מרחק מאנשים שיש להם אבעבועות רוח או שלבקת חוגרת,** אם מעולם לא חלית בהם, כיוון שאלו יכולים להשפיע עליך באופן חמור. אם בכל זאת אתה בא במגע עם אבעבועות רוח או שלבקת חוגרת, **פנה לרופא שלך באופן מיידי**.

1. למה מיועדת התרופה?

הידרוקורטיזון 10 מ"ג היא תרופה גלוקוקורטיקוסטרואידית המיועדת לטיפול והקלה במקרים של דלקות, נפיחות, גרד, אלרגיות חמורות, בעיות עור, אסתמה ומחלות שיגרניות (מחלות ראוטיות).
קבוצה תרפויטית: קורטיקוסטרואידים לטיפול מערכתי, גלוקוקורטיקואידים.

התרופה הידרוקורטיזון 10 מ"ג מכילה הידרוקורטיזון. הידרוקורטיזון שייך לקבוצת תרופות הנקראות סטרואידים, שמם המלא הוא קורטיקוסטרואידים. קורטיקוסטרואידים אלה נוצרים באופן טבעי בגוף ועוזרים לשמור על בריאות ורווחה. חיזוק הגוף עם תוספת קורטיקוסטרואידים (כמו הידרוקורטיזון) היא דרך יעילה לטפל במגוון מחלות המערבות דלקת בגוף. הידרוקורטיזון מפחית דלקת זו, שאחרת עלולה להחמיר את מצבך. עליך ליטול את התרופה באופן קבוע על מנת לקבל את התועלת המקסימלית מהתרופה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (הידרוקורטיזון) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- אתה חולה בשחפת או כל זיהום חיידקי חריף או כרוני, פטרייתי, ויראלי או טפילי ללא טיפול תרופתי אנטי-מיקרוביאלי מתאים.
- קיבלת חיסון לאחרונה או אתה מתכנן לקבל חיסון כלשהו.
- מינון גבוה של קורטיקוסטרואידים עלול להחליש את מערכת החיסון שלך. אם זה המקרה, עליך להימנע מקבלת חיסונים המכילים וירוסים או חיידקים חיים, מחלשים, מכיוון שזה עלול לגרום לזיהום.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בהידרוקורטיזון 10 מ"ג, ספר לרופא אם:

- **סבלת בעבר מדיכאון חמור** או מאניה דיפרסיה (הפרעה די-קוטבית), כולל אם היה לך דיכאון לפני או במהלך נטילת תרופות סטרואידיות כמו הידרוקורטיזון.
- **אחד מבני משפחתך הקרובים סבל בעבר ממחלות אלו.**
- דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת הידרוקורטיזון 10 מ"ג אם יש לך, או אם היה לך בעבר:
 - כיבים בקיבה או במעי, או בעיות עיכול אחרות.
 - בעיות לבביות (אי ספיקת לב, התקף לב שהתרחש לאחרונה).
 - אפילפסיה.
- דלקת וריד פקקתית (נפיחות ואדמומיות לאורך וריד, שרגיש מאוד למגע).
- אקסנטמה (מחלה המשפיעה על העור, פריחה).
- קרצינומה גרורתית (סרטן שהתפשט מאזור אחד של הגוף לאזור אחר).
- מחלות מעי דלקתיות.
- לאחרונה עברת ניתוח בו נוצר פתח מלאכותי בין שני חללים נפרדים (אנסטומוזיס).
- הפרעות במצב הרוח.
- בעיות בתירויד (בלוטת התריס).
- אבעבועות רוח, חצבת או שלבקת חוגרת. הימנע ממגע עם אנשים נגועים או שיש להם אבעבועות רוח, חצבת או שלבקת חוגרת. אם אתה חשוף למחלות אלה, **פנה לרופא שלך באופן מיידי**.
- מערכת חיסון מוחלשת.
- דיזנטריה אמבית זיהום במעי הנגרם על-ידי תולעי מעיים (כגון אמביאזיס או סטרונג'ילידיאזיס). הידרוקורטיזון עלול לעורר או להחמיר זיהומים כאלה.
- הרעלת דם (ספטיצמיה), שחפת.
- זיהום הרפס בעין הנקרא הרפס סימפלקס עיני. הידרוקורטיזון עלול לעורר או להחמיר זיהומים פטרייתיים וויראליים בעין.
- חולשת שרירים לאחר לקיחת סטרואידים בעבר.
- לאחרונה ביקרת במדינה טרופית.

בנוסף, בדוק עם הרופא שלך אם אחת מהבעיות הבאות קיימת במשפחתך, או אם אתה סובל מאחת מהן:

- סוכרת.
 - בעיות לבביות.
 - לחץ דם גבוה.
 - גלאוקומה- לחץ עיני מוגבר.
 - בעיות כליה או כבד.
 - מיאסטניה גרביס (סוג של בעיית חולשת שרירים) ואתה לוקח תרופות מסוג מעכבי אצטילכולין אסטראז.
 - אוסטאופורוזיס (דלדול עצמות).
 - רמות תירואיד נמוכות (היפותרואידיזם).
- אם אתה לא בטוח אם אחת מהבעיות מעלה קיימת במשפחתך או אם אתה סובל ממנה, דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת הטבלייה.

פנה לרופא שלך אם במהלך נטילת **הידרוקורטיזון 10 מ"ג** אתה מפתח זיהום חדש. נטילת הידרוקורטיזון במשך זמן רב במינון גבוה עלולה להגביר את הסיכוי ללקות בזיהומים, שכן טיפול בהידרוקורטיזון עלול להסוות את הסימפטומים השכיחים בזיהום.

פנה לרופא שלך אם אתה חווה ראייה מטושטשת או הפרעות ראייה אחרות.

אם הידרוקורטיזון ניתן לתינוק פג, ייתכן שיהיה צורך בניטור תפקוד ומבנה של הלב.

בעיות נפשיות במהלך נטילת הידרוקורטיזון

בעיות נפשיות יכולות להתרחש במהלך נטילת סטרואידים כמו הידרוקורטיזון (ראה גם סעיף 4 "תופעות לוואי").

- מחלות אלה עלולות להיות חמורות.
- בדרך כלל הן מתחילות בתוך מספר ימים או שבועות מתחילת נטילת התרופה.
- סביר יותר שיתרחשו במינונים גבוהים.
- רוב הבעיות הללו נעלמות עם הורדת המינון או הפסקת נטילת התרופה. למרות זאת, אם בעיות אלה אכן מתרחשות, ייתכן כי הן ידרשו טיפול.

דבר עם רופא **מייד** אם אתה (או מי שנוטל תרופה זו), מראה סימנים כלשהם המעידים על בעיות נפשיות. זה חשוב במיוחד אם אתה מדוכא או אולי חושב על התאבדות, וכשמפחיתים את המינון או מפסיקים את השימוש. במקרים אחרים, בעיות נפשיות התרחשו במהלך הזמן הזה.

לחץ, פציעות, ניתוח

אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה **הידרוקורטיזון 10 מ"ג** ואתה חולה, סובל מלחץ, נפצעת או עומד לעבור ניתוח, ספר על כך לרופא. ייתכן שיהיה צורך להעלות את המינון של התרופה (או ייתכן שתצטרך להתחיל לטיפול את התרופה שוב למשך זמן קצר), על מנת למנוע נפילה חדה בלחץ הדם.

חיסונים

אם אתה צריך לקבל חיסונים במהלך הטיפול בקורטיקוסטרואידים, עליך להיות מודע שיייתכן שההגנה החיסונית לא תהיה יעילה כמו בדרך כלל. יש להימנע מחלק מהחיסונים במהלך הטיפול בקורטיקוסטרואידים (ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם:").

קרישת דם

טיפול בקורטיקוסטרואידים עלול להשפיע על קרישת הדם, כך שמומלץ להיזהר אם אתה משתמש במקביל בתרופות כלשהן אשר משפיעות על קרישת הדם (ראה גם בסעיף 2 "תגובות בין תרופתיות:").

ילדים ומתבגרים:

טיפול בקורטיקוסטרואידים עלול לגרום לפיגור גדילה ולהגביר את הסיכונים לתופעות לוואי בילדים ומתבגרים.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- פניטואין, קארבאמאזפין וברביטורטים (תרופות אנטי-אפילפטיות)
- תרופות לשיעול והתקררות המכילות מפחית גודש הנקרא אפדרין
- ריפאמיציין וריפאבטיין (תרופות נוגדות שחפת)
- תרופות צמחיות המכילות סנט ג'ון וורט (St. John's Wort) (היפריקום פרפרטום)
- ריטונאביר, אפאבירנז ונביראפין (תרופות לטיפול ב-HIV)
- תרופות נגד פטריות (קטוקונאזול, איטראקונאזול, פוסאקונאזול, ווריקונאזול, אמפוטריציין B)
- תרופה לסרטן הנקראת אמינוגלותרטימיד (Aminoglutethimide)
- אריתרומיצין, טליתרומיצין, קלריתרומיצין, פלואורוקווינולונים (אנטיביוטיקה)
- תכשירי אסטרון
- גלולות למניעת הריון וטיפול הורמונלי חלופי (HRT)
- תרופות נוגדות יתר לחץ דם (מינוקסידיל והידראלאזין)
- תרופות מדללות דם (נוגדי קרישה) כגון וארפרין
- חומצה אצטיל סליצילית (אספירין)
- תרופות לטיפול בסוכרת
- מעכבי אצטילכולין אסטראז (כגון פירידוסטיגמין)
- תרופות משתנות
- גליקוזידים של הלב (טיפול באי ספיקת לב), כגון דיגוקסין, פורוסמיד או בומטניד
- תרופות המשמשות לעיתים לטיפול באסתמה, בלחץ דם נמוך או בתרופות לשיעול ולהצטננות הנקראות סימפטומימטיות (כגון במבוטרול, פנטורול, פורמוטרול, ריטודרין, סאלבטאמול, סאלמטרול, טרבוטאלין)
- תוספי סידן
- משככי כאבים אנטי דלקתיים (כלומר תרופות ממשפחת ה-NSAIDs), כגון איבופרופן, דיקלופנאק, או נאפרוקסן
- סומאטרפין (הורמון גדילה)
- מיפפריסטון (להפסקת היריון)
- תרופות מסימות למחלת לב כמו גואנטידין, איזוסורביד מונוניטראט, איזוסורביד דיניטראט ותיאופילין
- תרופה למחלת מעגל האוריא (שתנן) הנקראת סודיום פנילבוטיראט (בדרך כלל התחלת השימוש בה היא בהנחיית רופא מומחה או יועץ)
- מתורקסאט (תרופה לטיפול בדלקת מפרקים שגרנית)
- ציקלוספורין (תרופה לטיפול בפסוריאזיס או במטופלים שעברו השתלת איברים)
- חיסונים. קורטיקוסטרואידים עלולים להפחית את יעילות החיסונים ולהגביר את הסיכון לסיבוכים נויורולוגיים. יש להימנע לחלוטין מחיסונים המכילים וירוסים וחיידקים חיים, מוחלשים (ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם:").
- תרופות מסימות עלולות להגביר את ההשפעות של הידרוקורטיזון וייתכן שהרופא שלך ירצה לפקח עליך בקפידה, אם אתה נוטל תרופות אלה (כולל תרופות מסימות לטיפול ב-HIV: ריטונאביר, קוביסיסטאט).

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול הידרוקורטיזון 10 מ"ג עם או ללא מזון.

יש להימנע משתיית מיץ אשכוליות במהלך השימוש בתרופה, מכיוון שזה עלול להעלות את רמות הידרוקורטיזון בדם.

היריון, הנקה ופוריות:

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכוונת להיכנס להיריון, היועצי ברופא שלך או ברוקח לפני נטילת התרופה.

היריון

הידרוקורטיזון חוצה שלייה. טיפול בקורטיקוסטרואידים המשפיע על הגוף כולו, צריך להילקח בזהירות במהלך ההיריון. אם קיבלת טיפול בהידרוקורטיזון במהלך ההיריון, התינוק שזה נולד צריך להיות במעקב אחר ייצור הורמונים לקוי על-ידי בלוטת יותרת הכליה.

הנקה

הידרוקורטיזון מופרש בחלב אם. שימוש ממושך במינונים גבוהים של הידרוקורטיזון במהלך ההנקה, עלול להחליש את יכולת התינוק לייצר כמות מספקת של הורמונים סטרואידים.

פוריות

קורטיקוסטרואידים עלולים להשפיע על הפוריות, מכיוון שהם עלולים לפגוע באיכות הזרע ולגרום להיעדר המחזור החודשי (אמנוריה).

נהיגה ושימוש במכונית:

הידרוקורטיזון בדרך כלל לא פוגע ביכולת לנהוג או להשתמש במכונית. עם זאת, בחלק מהמטופלים סטרואידים עלולים לגרום לתחושה של תנועה, גם כשאתה דומם, וזה עלול לגרום לך לתחושת סחרחורת (ורטיגו). דווחו מקרים של עייפות קיצונית ופרקים של סחרחורת קצרת טווח (ורטיגו). שינויים בראייה או חולשת שרירים עלולים גם להתרחש. אין לנהוג או להפעיל מכונית אם אתה מושפע מהתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- **הידרוקורטיזון 10 מ"ג** מכיל לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול.
- תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון ומשך הטיפול יהיו תלויים במחלה שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה:

יש ליטול את התרופה עם מעט מים, עם או ללא מזון.

יש ליטול תכשירים סותרים חומצה בין הארוחות.

במידת הצורך, ניתן לחצות, לחלק לרבעים אחידים, או לכתוש את הטבלייה.

שימוש בקבוצות מטופלים מיוחדות או במקרים מיוחדים

ייתכן שהרופא שלך ירצה לשנות את המינון או לפקח על הטיפול שלך בקפידה אם אתה קשיש, סובל מבעיות בכבד, בעיות בבלוטת יותרת הכליה, לחץ, פציעות, זיהומים או אם מתוכנן עבודה נרחבת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם נטלת מנת יתר משמעותית, ניתן לתת פחם פעיל כעזרה ראשונה. עם זאת, יש ליצור קשר עם רופא בהקדם האפשרי לצורך קבלת טיפול אחר.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, דלג על המנה שנשכחה וקח את המנה הבאה כרגיל. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה. אם אתה לא בטוח אם לדלג על מנה, היועצי ברופא או ברוקח.

אם הפסקת ליטול את התרופה

ניתן להפסיק את הטיפול רק לאחר התייעצות עם הרופא שלך. הפחתה מהירה מדי של מינון הידרוקורטיזון 10 מ"ג מסוכנת. הרופא שלך יפחית את המינון שלך בהדרגה.

הפסקת השימוש בהידרוקורטיזון 10 מ"ג עלולה להותיר אותך ללא כמות מספקת של הורמוני סטרואיד בגוף שלך. אם תפסיק לקחת הידרוקורטיזון בפתאומיות, אתה עלול לחוות תסמיני גמילה כמו כאבים בשרירים או במפרקים, חום, חולשה, תחושת חולי, אי נוחות כללית, לחץ מתגבר בגולגולת ולחץ דם נמוך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות לגבי השימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהידרוקורטיזון 10 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי עלולות להיות חזקות יותר במטופלים קשישים וילדים.

הרופא שלך ירצה לראות אותך מדי פעם על מנת לבדוק אם תופעות אלה מופיעות.

טיפול בתרופה זו עלול לגרום לעיתים לתופעות לוואי חמורות. יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים בהופעת אחת או יותר מתופעות הלוואי החמורות הבאות, או אם אתה חושב שאתה בסיכון מוגבר לזיהום (כגון, אם היית במגע עם מישהו הסובל מזיהום):

תופעות לוואי ששיחותן אינה ידועה (תופעות ששיחותן טרם נקבעה):

- תגובה אלרגית מסכנת חיים אשר גורמת למשל ל: פריחה בעור; התנפחות של הפנים, שפתיים או גרון; או קשיי נשימה או צפזופים.
- בילדים, כאבי ראש עם הקאות, אדישות ונמנום. אלה הם תסמינים של פסאודוטומר צרברי (גידול מדומה במוח), שיכולים להגביר לחץ תוך גולגולתי ובדרך כלל מתרחשים לאחר הפסקת טיפול.
- כיבי מעיים מתפרצים או מדממים (ניתנים לזיהוי על-ידי כאב בטן, במיוחד אם מתפשט לגב שלך, דימום מפי הטבעת, צואה שחורה, או הקאה דמית).
- דלקת חריפה של הלב (כאבי בטן, ייתכן שיהיו מלווים בהלם, כלומר לחץ דם נמוך עם ירידה בהפרשת שתן ולעיתים קרובות איבוד הכרה).
- קריש דם בוריד (תרומבוזיס) ברגל. התסמינים לכך הם: שריר נפוח, אדום, חם ורגיש.
- תסחיף פקיקי (תרומבואמבוליזם) - קריש דם העלול להגיע אל הריאות. התסמינים לכך הם: קוצר נשימה פתאומי, כאב חזה ושיעול דמי.
- אי ספיקת לב- בעיות בשאיבה של הלב. מאופיין על-ידי: קרסוליים נפוחים, כאבים בחזה, קשיי נשימה ודפיקות לב (פלפיטציות) או פעימות לב לא סדירות, דופק לא סדיר, או מהיר מאוד, או איטי; יתר לחץ דם (לחץ דם גבוה מאופיין על-ידי כאבי ראש או תחושה כללית לא טובה).
- נמק של העצם - עצמות שבורות או שברים; הרס של העצמות עקב זרימת דם לקויה (כאב בירך); דלקת מפרקים בברך ובמפשעה; סיכון לקרעים בידים (כאב ו/ או נפיחות).
- תסמונת קושינג- סימני מתיחה אדומים; פנים מעוגלות ואדומות; עצמות שרירים חלשות; בטן נפוחה ו"דבשת בופלו" ממצברי שומן סביב הבטן והצוואר; שינויים במצב הרוח; כאב ראש.

תופעות לוואי חמורות: ספר לרופא מייד

סטרואידים, כולל הידרוקורטיזון, יכולים לגרום לבעיות נפשיות חמורות. בעיות אלה שיחות אצל מבוגרים וילדים כאחד ויכולות להופיע אצל כ-5 מתוך 100 אנשים הנטלים תרופות כמו הידרוקורטיזון:

- תחושת דיכאון, כולל חשיבה על התאבדות.
- תחושה של רוממות רוח (מאניה) או מצבי רוח עולים ויורדים.
- תחושת חרדה, קשיי הירדמות, קשיי חשיבה או בלבול ואיבוד הזיכרון.
- הרגשה, ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים, מחשבות מזרות ומפחידות, שינוי התנהגות או תחושת בדידות.

אם אתה מבחין באחת מהבעיות הללו, **דבר עם רופא מיידי**.

תופעות לוואי נוספות

ספר לרופא שלך אם אתה חווה אחת מהתופעות הבאות:

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- אם אתה לוקה בזיהומים בתדירות גבוהה יותר
- עלייה במספר תאי הדם הלבנים
- פטרת הפה
- דלקת כיבית של הושט, נפחות, הפרעות עיכול, פטרייה בושט
- תחושת חולי, תחושת אי נוחות גופנית ועייפות
- לחץ דם גבוה
- תחושת התרגשות או שמחה מוגזמת
- מצב רוח ירוד (דיכאון)
- נדודי שינה (אינסומניה)
- החמרה של אפילפסיה
- חולשה או התשה של השרירים
- אוסטאופורוזיס (עצמות שבירות)
- התכווצויות ועוויתות עקב אובדן מלחי אשלגן מגופך. במקרים נדירים אובדן של מלחי אשלגן מגופך עלול להוביל לפלפטציות (דפיקות לב לא אחידות שאתה נהיה מודע אליהן)
- מחזור לא סדיר או היעדר מחזור בנשים
- שיעור מוגבר בגוף ובפנים אצל נשים
- תיאבון מוגבר ועלייה במשקל
- עלייה ברמות הסוכר בדם, פירוק מאגרי החלבון בגוף (אובדן משקל ואובדן שרירים בזרועות או ברגליים), אובדן סידן וחנקן
- עור דק או עדין, חבורות, כתמים אדומים או סגולים
- ריפוי איטי של חתכים או פצעים
- אקנה, אדמומיות
- סימני מתיחה
- החמרה בראייה או שינויים בראייה כתוצאה מקטרקט או גלאוקומה (לחץ תוך עיני מוגבר); הידקקות של משטח העין; ראייה מטושטשת
- החמרת דלקת עיניים

תופעות לוואי נוספות בילדים

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- דיכוי גדילה תקינה בילדים
- עיבוי שרירי הלב (קרדיומיופתיה היפרטרופית) בתינוקות פגים

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא. דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone K-30, Talc, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבלייה עגולה בצבע לבן, עם קווי חלוקה לרבעים בצד אחד ו-"HN" מוטבע על הצד השני.
גודל אריזה מאושר: הטבליות ארוזות במגשיות אלומיניום באריזת קרטון, המכילה 30 טבליות.

יצרן ובעל הרישום:

רקח תעשייה פרמצבטית בע"מ, רח' המלאכה 30 חולון, 5881904, ישראל.
 נערך בינואר 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
 135-35-22570-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.