

הנדון: עדכון העלון לצרכן לתכשיר:

Hydrocortisone 10 mg, Tablets הידרוקורטיזון 10 מ"ג, טבליות

רופאים וצוות רפואי נכבד,

חברת רקח תעשייה פרמצבטית בע"מ, מבקשת להודיעכם על עדכון העלון לצרכן לתכשיר הרפואי:
הידרוקורטיזון 10 מ"ג, טבליות.

מרכיבים פעילים:

Hydrocortisone 10 mg.

התוויה מאושרת:

Anti-inflammatory.

הודעה זו מפרטת את העדכונים המהווים החמרה במידע בטיחותי בלבד. למידע מלא, יש לעיין בעלון לצרכן.

העלון המעודכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/135%2035%2022570%2000>

כמו כן, ניתן לקבלו מודפס ע"י פנייה לבעל הרישום:
רקח תעשייה פרמצבטית בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון, 5881904, ישראל.

העלון לצרכן עודכן בינואר 2025.

להלן העדכונים המהווים החמרה במידע הבטיחותי (מסומנים בצהוב):

[...]

- **הידרוקורטיזון היא תרופה סטרואידית הנרשמת עבור מגוון מצבים שונים, כולל מחלות חמורות. יש ליטול את התרופה באופן קבוע כדי לקבל את התועלת המרבית.**
- **אל תפסיק ליטול את התרופה ללא היוועצות עם הרופא שלך- ייתכן שתצטרך להפחית את המינון בהדרגתיות.**
- **הידרוקורטיזון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהאנשים (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). בעיות מסוימות כמו שינויי מצב רוח (תחושת דיכאון או רוממות רוח) או בעיות קיבה יכולות להתרחש מייד. אם אתה מרגיש לא טוב בכל דרך שהיא, המשך ליטול את הטבליות שלך ופנה לרופא שלך באופן מיידי.**
- **חלק מתופעות הלוואי מתרחשות רק לאחר שבועות או חודשים. תופעות הלוואי כוללות חולשה של הזרועות והרגליים או התעגלות של הפנים (למידע נוסף, ראה בסעיף 4 "תופעות לוואי").**
- **שמור מרחק מאנשים שיש להם אבעבועות רוח או שלבקת חוגרת, אם מעולם לא חלית בהם, כיוון שאלו יכולים להשפיע עליך באופן חמור. אם בכל זאת אתה בא במגע עם אבעבועות רוח או שלבקת**

חוגרת, פנה לרופא שלך באופן מיידי.

1. למה מיועדת התרופה?

הידרוקורטיזון 10 מ"ג היא תרופה גלוקוקורטיקוסטרואידית המיועדת לטיפול והקלה במקרים של דלקות, נפיחות, גרד, אלרגיות חמורות, בעיות עור, אסתמה ומחלות שיגרניות (מחלות ראומטיות). **קבוצה תרפויטית:** קורטיקוסטרואידים לטיפול מערכת, גלוקוקורטיקואידים.

התרופה **הידרוקורטיזון 10 מ"ג** מכילה הידרוקורטיזון. הידרוקורטיזון שייך לקבוצת תרופות הנקראת סטרואידים, שמם המלא הוא קורטיקוסטרואידים. קורטיקוסטרואידים אלה נוצרים באופן טבעי בגוף ועוזרים לשמור על בריאות ורווחה. חיזוק הגוף עם תוספת קורטיקוסטרואידים (כמו הידרוקורטיזון) היא דרך יעילה לטפל במגוון מחלות המערבות דלקת בגוף. הידרוקורטיזון מפחית דלקת זו, שאחרת עלולה להחמיר את מצבך. עליך ליטול את התרופה באופן קבוע על מנת לקבל את התועלת המקסימלית מהתרופה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (הידרוקורטיזון) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- אתה חולה בשחפת או כל זיהום חיידקי חריף או כרוני, פטרייתי, ויראלי או טפילי ללא טיפול תרופתי אנטי-מיקרוביאלי מתאים.
- קיבלת חיסון לאחרונה או אתה מתכנן לקבל חיסון כלשהו.
- מינון גבוה של קורטיקוסטרואידים עלול להחליש את מערכת החיסון שלך. אם זה המקרה, עליך להימנע מקבלת חיסונים המכילים וירוסים או חיידקים חיים, מוחלשים, מכיוון שזה עלול לגרום לך לזיהום.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בהידרוקורטיזון 10 מ"ג, ספר לרופא אם:

- **סבלת בעבר מדיכאון חמור או מאניה דיפרסיה (הפרעה דו-קוטבית),** כולל אם היה לך דיכאון לפני או במהלך נטילת תרופות סטרואידיות כמו הידרוקורטיזון.
- **אחד מבני משפחתך הקרובים סבל בעבר ממחלות אלו.**
- דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת **הידרוקורטיזון 10 מ"ג** אם יש לך, או אם היה לך בעבר:
 - **כיבים בקיבה או במעיים, או בעיות עיכול אחרות.**
 - **בעיות לבביות (אי ספיקת לב, התקף לב שהתרחש לאחרונה).**
 - **אפילפסיה.**
 - **דלקת וריד פקתית (נפיחות ואדמומיות לאורך וריד, שרגיש מאוד למגע).**
 - **אקסנטמה (מחלה המשפיעה על העור, פריחה).**
 - **קרצינומה גרורתית (סרטן שהתפשט מאזור אחד של הגוף לאזור אחר).**
 - **מחלות מעי דלקתיות.**
 - **לאחרונה עברת ניתוח בו נוצר פתח מלאכותי בין שני חללים נפרדים (אנסטומוזיס).**
 - **הפרעות במצב הרוח.**
 - **בעיות בתירואיד (בלוטת התריס).**
 - **אבעבועות רוח, חצבת או שלבכת חוגרת.** הימנע ממגע עם אנשים נגועים או שיש להם אבעבועות רוח, חצבת או שלבכת חוגרת. אם אתה חשוף למחלות אלה, **פנה לרופא שלך באופן מיידי.**
 - **מערכת חיסון מוחלשת.**
 - **דיזנטריה אמבית וזיהום במעי הנגרם על-ידי תולעי מעיים (כגון אמביאזיס או סטרונג'ילידיאזיס).**
- **הידרוקורטיזון עלול לעורר או להחמיר זיהומים כאלה.**
- **הרעלת דם (ספטיצמיה), שחפת.**
- **זיהום הרפס בעין הנקרא הרפס סימפלקס עיני. הידרוקורטיזון עלול לעורר או להחמיר זיהומים פטרייתיים וויראליים בעין.**

- חולשת שרירים לאחר לקיחת סטרואידים בעבר.
- לאחרונה ביקרת במדינה טרופית.
- בנוסף, בדוק עם הרופא שלך אם אחת מהבעיות הבאות קיימת במשפחתך, או אם אתה סובל מאחת מהן:
 - סוכרת.
 - בעיות לבביות.
 - לחץ דם גבוה.
 - גלאוקומה - לחץ עיני מוגבר.
 - בעיות כליה או כבד.
 - מיאסטניה גרביס (סוג של בעיית חולשת שרירים) ואתה לוקח תרופות מסוג מעכבי אצטילכולין אסטראז.
 - אוסטאופורוזיס (דלדול עצמות).
 - רמות תירואיד נמוכות (היפותירואידיזם).
- אם אתה לא בטוח אם אחת מהבעיות מעלה קיימת במשפחתך או אם אתה סובל ממנה, דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת הטבלייה.
- פנה לרופא שלך אם במהלך נטילת הידרוקורטיזון 10 מ"ג אתה מפתח זיהום חדש. נטילת הידרוקורטיזון במשך זמן רב במינון גבוה עלולה להגביר את הסיכוי ללקות בזיהומים, שכן טיפול בהידרוקורטיזון עלול להסוות את הסימפטומים השכיחים בזיהום.
- פנה לרופא שלך אם אתה חווה ראייה מטושטשת או הפרעות ראייה אחרות.
- אם הידרוקורטיזון ניתן לתינוק פג, ייתכן שיהיה צורך בניטור תפקוד ומבנה של הלב.
- **בעיות נפשיות במהלך נטילת הידרוקורטיזון**
- בעיות נפשיות יכולות להתרחש במהלך נטילת סטרואידים כמו הידרוקורטיזון (ראה גם סעיף 4 "תופעות לוואי").
 - מחלות אלה עלולות להיות חמורות.
 - בדרך כלל הן מתחילות בתוך מספר ימים או שבועות מתחילת נטילת התרופה.
 - סביר יותר שיתרחשו במינונים גבוהים.
 - רוב הבעיות הללו נעלמות עם הורדת המינון או הפסקת נטילת התרופה. למרות זאת, אם בעיות אלה אכן מתרחשות, ייתכן כי הן ידרשו טיפול.
 - דבר עם רופא מיידי אם אתה (או מי שנוטל תרופה זו), מראה סימנים כלשהם המעידים על בעיות נפשיות. זה חשוב במיוחד אם אתה מדוכא או אולי חושב על התאבדות, וכשמפחיתים את המינון או מפסיקים את השימוש. במקרים אחרים, בעיות נפשיות התרחשו במהלך הזמן הזה.
 - **לחץ, פציעות, ניתוח**
 - אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה הידרוקורטיזון 10 מ"ג ואתה חולה, סובל מלחץ, נפצעת או עומד לעבור ניתוח, ספר על כך לרופא. ייתכן שיהיה צורך להעלות את המינון של התרופה (או ייתכן שתצטרך להתחיל ליטול את התרופה שוב למשך זמן קצר), על מנת למנוע נפילה חדה בלחץ הדם.
 - **חיסונים**
 - אם אתה צריך לקבל חיסונים במהלך הטיפול בקורטיקוסטרואידים, עליך להיות מודע שיתכן שההגנה החיסונית לא תהיה יעילה כמו בדרך כלל. יש להימנע מחלק מהחיסונים במהלך הטיפול בקורטיקוסטרואידים (ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם:").
 - **קרישת דם**
 - טיפול בקורטיקוסטרואידים עלול להשפיע על קרישת הדם, כך שמומלץ להיזהר אם אתה משתמש במקביל בתרופות כלשהן אשר משפיעות על קרישת הדם (ראה גם בסעיף 2 "תגובות בין תרופתיות:").
 - **ילדים ומתבגרים:**
 - טיפול בקורטיקוסטרואידים עלול לגרום לפיגור גדילה ולהגביר את הסיכונים לתופעות לוואי בילדים ומתבגרים.
 - **תגובות בין תרופתיות:**
 - אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- פניטואין, קארבאמאזפין וברביטורטים (תרופות אנטי-אפילפטיות)
 - תרופות לשיעול והתקררות המכילות מפחית גודש הנקרא אפדרין
 - ריפאמפיצין וריפאבוטין (תרופות נוגדות שחפת)
 - תרופות צמחיות המכילות סנט ג'ון וורט (St. John's Wort) (היפריקום פרפורטום)
 - ריטונאביר, אפאבירז ונביראפין (תרופות לטיפול ב-HIV)
 - תרופות נגד פטריות (קטוקונאזול, איטראקונאזול, פוסאקונאזול, ווריקונאזול, אמפוטריצין B)
 - תרופה לסרטן הנקראת אמינוגלותרטימיד (Aminoglutethimide)
 - אריתרומיצין, טליתרומיצין, קלריתרומיצין, פלואורוקווינולונים (אנטיביוטיקה)
 - תכשירי אסטרוגן
 - גלולות למניעת הריון וטיפול הורמונלי חלופי (HRT)
 - תרופות נוגדות יתר לחץ דם (מינוקסידיל והידראלאזין)
 - תרופות מדללות דם (נוגדי קרישה) כגון וארפרין
 - חומצה אצטיל סליצילית (אספירין)
 - תרופות לטיפול בסוכרת
 - מעכבי אצטילכולין אסטראז (כגון פירידוסטיגמין)
 - תרופות משתנות
 - גליקוזידים של הלב (טיפול באי ספיקת לב), כגון דיגוקסין, פרוסמיד או בומטניד
 - תרופות המשמשות לעיתים לטיפול באסתמה, בלחץ דם נמוך או בתרופות לשיעול ולהצטננות
 - הנקראות סימפטומימטיות (כגון במבוטרול, פנוטרול, פורמוטרול, ריטודרין, סאלבוטאמול, סאלמטרול, טרבוטאלין)
 - תוספי סידן
 - משככי כאבים אנטי דלקתיים (כלומר תרופות ממשפחת ה-NSAIDs), כגון איבופרופן, דיקלופנאק, או נאפרוקסן
 - סומאטרופין (הורמון גדילה)
 - מיפפריסטון (להפסקת הריון)
 - תרופות מסוימות למחלת לב כמו גואנטידין, איזוסורביד מונוניטראט, איזוסורביד דיניטראט ותיאופילין
 - תרופה למחלת מעגל האוריה (שתנן) הנקראת סודיום פנילבוטיראט (בדרך כלל התחלת השימוש בה היא בהנחיית רופא מומחה או יועץ)
 - מתוטרקסאט (תרופה לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית)
 - ציקלוספורין (תרופה לטיפול בפסוריאזיס או במטופלים שעברו השתלת איברים)
 - חיסונים. קורטיקוסטרואידים עלולים להפחית את יעילות החיסונים ולהגביר את הסיכון לסיבוכים ניירולוגיים. יש להימנע לחלוטין מחיסונים המכילים יורוסים וחיידקים חיים, מוחלשים (ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם:").
 - תרופות מסוימות עלולות להגביר את ההשפעות של הידרוקורטיזון וייתכן שהרופא שלך ירצה לפקח עליך בקפידה, אם אתה נוטל תרופות אלה (כולל תרופות מסוימות לטיפול ב-HIV: ריטונאביר, קוביסיסטאט).
- שימוש בתרופה ומזון**
- ניתן ליטול הידרוקורטיזון 10 מ"ג עם או ללא מזון.
- יש להימנע משתיית מיץ אשכוליות במהלך השימוש בתרופה, מכיוון שזה עלול להעלות את רמות ההידרוקורטיזון בדם.
- היריון, הנקה ופוריות:**
- אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכוונת להיכנס להיריון, היועצי ברופא שלך או ברוקח לפני נטילת התרופה.
- היריון**
- הידרוקורטיזון חוצה שלייה. טיפול בקורטיקוסטרואידים המשפיע על הגוף כולו, צריך להילקח בהירות במהלך ההיריון. אם קיבלת טיפול בהידרוקורטיזון במהלך ההיריון, התינוק שזה עתה נולד צריך להיות במעקב אחר ייצור הורמונים לקוי על-ידי בלוטת יותרת הכליה.
- הנקה**

הידרוקורטיזון מופרש בחלב אם. שימוש ממושך במינונים גבוהים של הידרוקורטיזון במהלך ההנקה, עלול להחליש את יכולת התינוק לייצר כמות מספקת של הורמונים סטרואידים.

פוריות

קורטיקוסטרואידים עלולים להשפיע על הפוריות, מכיוון שהם עלולים לפגוע באיכות הזרע ולגרום להיעדר המחזור החודשי (אמנוריה).

נהיגה ושימוש במכונות:

הידרוקורטיזון בדרך כלל לא פוגע ביכולת לנהוג או להשתמש במכונות. עם זאת, בחלק מהמטופלים סטרואידים עלולים לגרום לתחושה של תנועה, גם כשאתה דומם, וזה עלול לגרום לך לתחושת סחרחורת (ורטיגו). דווחו מקרים של עייפות קיצונית ופרקים של סחרחורת קצרת טווח (ורטיגו). שינויים בראייה או חולשת שרירים עלולים גם להתרחש. אין לנהוג או להפעיל מכונות אם אתה מושפע מהתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- **הידרוקורטיזון 10 מ"ג** מכיל לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול.
- תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון ומשך הטיפול יהיו תלויים במחלה שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה:

יש ליטול את התרופה עם מעט מים, עם או ללא מזון.

יש ליטול תכשירים סותרים חומצה בין הארוחות.

במידת הצורך, ניתן לחצות, לחלק לרבעים אחידים, או לכתוש את הטבלייה.

שימוש בקבוצות מטופלים מיוחדות או במקרים מיוחדים

ייתכן שהרופא שלך ירצה לשנות את המינון או לפקח על הטיפול שלך בקפידה אם אתה קשיש, סובל מבעיות בכבד, בעיות בבלוטת יותרת הכליה, לחץ, פציעות, זיהומים או אם מתוכנן עבורך ניתוח.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם נטלת מנת יתר משמעותית, ניתן לתת פחם פעיל כעזרה ראשונה. עם זאת, יש ליצור קשר עם רופא **בהקדם האפשרי** לצורך קבלת טיפול אחר.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, דלג על המנה שנשכחה וקח את המנה הבאה כרגיל. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה. אם אתה לא בטוח אם לדלג על מנה, היוועץ ברופא או ברוקח.

אם הפסקת ליטול את התרופה

ניתן להפסיק את הטיפול רק לאחר התייעצות עם הרופא שלך. הפחתה מהירה מדי של מינון

הידרוקורטיזון 10 מ"ג מסוכנת. הרופא שלך יפחית את המינון שלך בהדרגה.

הפסקת השימוש בהידרוקורטיזון 10 מ"ג עלולה להותיר אותך ללא כמות מספקת של הורמוני סטרואיד בגוף שלך. אם תפסיק לקחת הידרוקורטיזון בפתאומיות, אתה עלול לחוות תסמיני גמילה כמו כאבים בשרירים או במפרקים, חום, חולשה, תחושת חולי, אי נוחות כללית, לחץ מתגבר בגולגולת ולחץ דם נמוך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות לגבי השימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהידרוקורטיזון 10 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי עלולות להיות חזקות יותר במטופלים קשישים וילדים.
הרופא שלך ירצה לראות אותך מדי פעם על מנת לבדוק אם תופעות אלה מופיעות.
טיפול בתרופה זו עלול לגרום לעיתים לתופעות לוואי חמורות. יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים בהופעת אחת או יותר מתופעות הלוואי החמורות הבאות, או אם אתה חושב שאתה בסיכון מוגבר לזיהום (כגון, אם היית במגע עם מישהו הסובל מזיהום):

- תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):**
- תגובה אלרגית מסכנת חיים אשר גורמת למשל ל: פריחה בעור; התנפחות של הפנים, שפתיים או גרון; או קשיי נשימה או צפצופים.
 - בילדים, כאבי ראש עם הקאות, אדישות ונמנום. אלה הם תסמינים של פסאודוטומר צרברי (גידול מדומה במוח), שיכולים להגביר לחץ תוך גולגולתי ובדרך כלל מתרחשים לאחר הפסקת טיפול.
 - כיבי מעיים מתפרצים או מדממים (ניתנים לזיהוי על-ידי כאב בטן, במיוחד אם מתפשט לגב שלך, דימום מפי הטבעת, צואה שחורה, או הקאה דמית).
 - דלקת חריפה של הלב (כאבי בטן, ייתכן שיהיו מלווים בהלם, כלומר לחץ דם נמוך עם ירידה בהפרשת שתן ולעיתים קרובות איבוד הכרה).
 - קריש דם בוריד (תרומבוזיס) ברגל. התסמינים לכך הם: שריר נפוח, אדום, חם ורגיש.
 - תסחיף פקיקי (תרומבואמבולזיס) - קריש דם העלול להגיע אל הריאות. התסמינים לכך הם: קוצר נשימה פתאומי, כאב חזה ושיעול דמי.
 - אי ספיקת לב - בעיות בשאיבה של הלב. מאופיין על-ידי: קרסוליים נפוחים, כאבים בחזה, קשיי נשימה ודפיקות לב (פלפיטציות) או פעימות לב לא סדירות, דופק לא סדיר, או מהיר מאוד, או איטי; יתר לחץ דם (לחץ דם גבוה מאופיין על-ידי כאבי ראש או תחושה כללית לא טובה).
 - נמק של העצם - עצמות שבורות או שברים; הרס של העצמות עקב זרימת דם לקויה (כאב בירך); דלקת מפרקים בברך ובמפשעה; סיכון לקרעים בגידים (כאב ו/ או נפיחות).
 - תסמונת קושינג' - סימני מתיחה אדומים; פנים מעוגלות ואדומות; עצמות שרירים חלשות; בטן נפוחה ו"דבשת בופלו" ממצבורי שומן סביב הבטן והצוואר; שינויים במצב הרוח; כאב ראש.

תופעות לוואי חמורות: ספר לרופא מייד

סטרואידים, כולל הידרוקורטיזון, יכולים לגרום לבעיות נפשיות חמורות. בעיות אלה שכיחות אצל מבוגרים וילדים כאחד ויכולות להופיע אצל כ-5 מתוך 100 אנשים הנוטלים תרופות כמו הידרוקורטיזון: תחושת דיכאון, כולל חשיבה על התאבדות.
תחושה של רוממות רוח (מאניה) או מצבי רוח עולים ויורדים.
תחושת חרדה, קשיי הירדמות, קשיי חשיבה או בלבול ואיבוד הזיכרון.
הרגשה, ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים, מחשבות מוזרות ומפחידות, שינויי התנהגות או תחושת בדידות.

אם אתה מבחין באחת מהבעיות הללו, **דבר עם רופא מייד.**

תופעות לוואי נוספות

- ספר לרופא שלך אם אתה חווה אחת מהתופעות הבאות:
- תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):**
- אם אתה לוקה בזיהומים בתדירות גבוהה יותר
 - עלייה במספר תאי הדם הלבנים
 - פטרת הפה
 - דלקת כיבית של הושט, נפיחות, הפרעות עיכול, פטרייה בושט
 - תחושת חולי, תחושת אי נוחות גופנית ועייפות
 - לחץ דם גבוה
 - תחושת התרגשות או שמחה מוגזמת
 - מצב רוח ירוד (דיכאון)
 - נדודי שינה (אינסומניה)

- החמרה של אפילפסיה
- חולשה או התשה של השרירים
- אוסטאופורוזיס (עצמות שבירות)
- התכווצויות ועוויתות עקב אובדן מלחי אשלגן מגופך. במקרים נדירים אובדן של מלחי אשלגן מגופך עלול להוביל לפלפיטציות (דפיקות לב לא אחדות שאתה נהיה מודע אליהן)
- מחזור לא סדיר או היעדר מחזור בנשים
- שיעור מוגבר בגוף ובפנים אצל נשים
- תיאבון מוגבר ועלייה במשקל
- עלייה ברמות הסוכר בדם, פירוק מאגרי החלבון בגוף (אובדן משקל ואובדן שרירים בזרועות או ברגליים), אובדן סידן וחנקן
- עור דק או עדין, חבורות, כתמים אדומים או סגולים
- ריפוי איטי של חתכים או פצעים
- אקנה, אדמומיות
- סימני מתיחה
- החמרה בראייה או שינויים בראייה כתוצאה מקטרקט או גלאוקומה (לחץ תוך עיני מוגבר); הידקקות של משטח העין; ראייה מטושטשת
- החמרת דלקת עיניים
- **תופעות לוואי נוספות בילדים**
- **תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):**
- דיכוי גדילה תקינה בילדים
- עיבוי שרירי הלב (קרדיומיופטיה היפרטרופית) בתינוקות פגים

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

[...]

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone K-30, Talc, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבלייה עגולה בצבע לבן, עם קווי חלוקה לרבעים בצד אחד ו-"HN" מוטבע על הצד השני.
גודל אריזה מאושר: הטבליות ארוזות במגשיות אלומיניום באריזת קרטון, המכילה 30 טבליות.

[...]

בברכה,

חברת רקח תעשייה פרמצבטית בע"מ