

## أميتريبتيلين تيقع 10 ملغ أقراص مطيئة

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

أميتريبتيلين هيدروكلوريد 10 ملغ (Amitriptyline Hydrochloride 10 mg)  
المعلومات عن مركبات غير فعالة ومثيرة للحساسية انظر البند 2 - "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" - والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

ماذا يجب علي معرفته بالنسبة للدواء؟

تزيد الأدوية المضادة للاكتئاب (Antidepressants) من خطر حدوث سلوك وأفكار انتحارية لدى الأطفال، والمراهقين والبالغين الصغار.  
عند بدء العلاج بالدواء، على المتعالجين من كل الأعمار وأقربهم، متابعة التغييرات السلوكية مثل: تفاقم الاكتئاب، أفكار انتحارية، عدوانية وما شابه.  
إذا طرأت تغييرات كهذه، يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

### 1. لم أعد هذا الدواء؟

النشاط الطبي: علاج أعراض الاكتئاب ولعلاج سلس البول الليلي (Enuresis nocturna).

المجموعة العلاجية: مثبطات امتصاص مونامين غير انتقائية (N06AA).

### 2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- اجترت مرضاً نوياً قلبية (احتشاء عضلة القلب)
- كنت تعاني من مرض قلبي، مثل: اضطرابات في نظم القلب التي تظهر في تخطيط كهربائية القلب (ECG)، إحصار القلب، أو مرض قلبي تاجي
- كنت تتناول أدوية من مجموعة مثبطات مونامين أو أكسيداز (MAOIs)
- تناولت MAOIs خلال آخر 14 يوماً
- تناولت موكلوباميد في اليوم السابق
- كنت تعاني من مرض كبدي خطير
- كنت تتعالج بأميتريبتيلين تيقع، عليك التوقف عن الدواء والانتظار 14 يوماً قبل بدء العلاج ب MAOIs
- كنت دون سن 12 سنة

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء:

أخبر الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بأميتريبتيلين تيقع:

أثناء العلاج بأميتريبتيلين تيقع، يجب اتخاذ وسائل حذر خاصة:

بلغ عن حدوث ردود فعل جلدية خطيرة بما في ذلك رد الفعل الدوائي مع فرط الحمضات وأعراض جهازية (DRESS) أثناء العلاج بأميتريبتيلين. توقف عن استعمال أميتريبتيلين تيقع وتوجه لتلقي علاج طبي عاجل فوراً إذا لاحظت أيًا من الأعراض المرتبطة بردود فعل جلدية خطيرة الموصوفة في البند 4 - "الأعراض الجانبية".  
من الجائز أن تكون هناك اضطرابات في نظم القلب وانخفاض ضغط الدم إذا تلتقت جرعة مرتفعة من الدواء. قد تحدث هذه الأعراض أيضاً بجرعات عادة إذا كان هناك مرض قلبي.

إطالة مقطع QT:

بلغ أثناء العلاج بأميتريبتيلين عن مشكلة في القلب تسمى "إطالة مقطع QT" (تظهر في تخطيط كهربائية القلب (ECG) وعن اضطرابات في نظم القلب (ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة).

أخبر طبيبك إذا:

- كان لديك نظم قلب بطيء
- يوجد لديك أو كان لديك مشكلة التي لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم في الجسم بشكل سليم (حالة تسمى قصور القلب)
- كنت تتناول أي دواء آخر قد يسبب مشاكل في القلب، أو يوجد لديك مشكلة تؤدي إلى انخفاض مستوى البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم، أو ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم.
- كنت متقدماً على إجراء عملية جراحية، قد يكون من الضروري التوقف عن العلاج بأميتريبتيلين تيقع قبل إعطاء مادة مخدرة. في حال عملية جراحية طارئة، يجب إبلاغ طبيب التخدير المعالج عن تناول هذا الدواء.
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (thyroid) أو تتناول أدوية لعلاج اضطراب وظيفة الغدة الدرقية.

أفكار انتحارية، تفاقم الاكتئاب أو القلق

إذا كنت تعاني من الاكتئاب، قد تقاسم أحياناً من أفكار حول الانتحار أو إيذاء نفسك. قد تتزايد هذه الأفكار في بداية العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب، حيث يستغرق الأمر وقتاً حتى تبدأ الأدوية بالتأثير، عادة حوالي أسبوعين، ولكن أحياناً أكثر.

هذالك احتمال أكبر أن تفكر مثل هذه الأفكار إذا:

- رودت أفكار حول الانتحار أو إيذاء نفسك في الماضي
- كنت بالغاً يافعاً. أظهرت المعلومات من التجارب السريرية ارتفاعاً في خطر السلوك الانتحاري لدى البالغين (دون عمر 25 سنة) الذين لديهم حالات نفسية، حيث تم علاجهم بمضادات الاكتئاب.

إذا راودتك أفكار حول إيذاء النفس أو الانتحار فتوجه فوراً إلى الطبيب أو المستشفى.  
قد يكون من المجدي أن تخبر قريباً للامانة أو صديقاً مقرباً أنك مكتئب وأطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم إخبارك إذا كانوا يعتقدون أن الاكتئاب أو القلق لديك يتفاقمان، أو إذا كانوا قلقين بشأن التغييرات في سلوكك.

أحداث الهوس (mania)

من الجائز أن يدخل بعض المتعالجين الذين لديهم اضطراب الهوس الاكتئابي في مرحلة الهوس، وهي مرحلة تتميز بأفكار تتغير كثيراً وبسرعة، الهجة المفرطة والنشاط البدني المفرط. في هذه الحالات، من المهم التوجه إلى الطبيب الذي على ما يبدو سيقوم بتبديل الدواء لك.

أخبر الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من أي مشكلة طبية، وخاصة إذا كان لديك:

- جلوكوما ضيقة الزاوية (فقدان الرؤية جراء ارتفاع ضغط داخل العين بشكل شاذ)
- صرع، سابقة من التصلبات أو النوبات
- صعوبة في التبول
- تضخم في البروستات
- مرض في الغدة الدرقية
- اضطراب ثنائي القطب
- مرض الفصام
- مرض كبدي خطير
- مرض قلبي خطير
- تضيق في اليؤاب (تضيق فتحة الخروج من المعدة - pylorus stenosis) وانسداد

الأعضاء الشللية (paralytic ileus)

• سكري (قد يتطلب الأمر ملامعة جرعة أدوية السكري الخاصة بك)

إذا كنت تستعمل مضادات الاكتئاب مثل SSRIs، من الجائز أن يفكر الطبيب بتغيير جرعة الدواء (انظر البند 2 - "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية").

قد يؤدي استعمال بوبروبرين سوية مع أميتريبتيلين إلى حدوث متلازمة السيروتونين (حالة التي قد تشكل خطراً على الحياة)، انظر البند 2 - "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية".

للمسنين ميل متزايد للمعاناة من بعض الأعراض الجانبية مثل دوار عند الانتقال إلى الوقوف جراء انخفاض ضغط الدم (انظر البند 4 - "الأعراض الجانبية").

الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين:

اكتئاب  
يُنصح إعطاء هذا الدواء للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة لعلاج الاكتئاب لأنه لم يتم إثبات السلامة والنجاعة على المدى الطويل في هذه الفئة العمرية.

سلس البول الليلي  
يجب إجراء تخطيط لكهربائية القلب ECG قبل بدء العلاج بهذا الدواء لنفي وجود اضطراب إطالة مقطع QT.

• يمنع استعمال هذا الدواء سوية مع دواء مضاد للفعل الكولينري (انظر البند 2 - "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية").

يمكن أن تظهر الأفكار والسلوكيات الانتحارية في المراحل الأولى من العلاج بمضادات الاكتئاب أيضاً بالنسبة لاضطرابات أخرى غير الاكتئاب؛ لذلك لدى المتعالجين الذين يعانون من سلس البول، يجب اتخاذ نص ووسائل الحذر التي ذُكرت بالنسبة للمتعالجين الذين لديهم اكتئاب.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:

- مضادات MAOIs (مثل فينيلزين، إيريونازيد، إيزوكاربوكسازيد، نيالاميد أو ترانليسيبرومين (لعلاج الاكتئاب)) أو سيليجيلين (لعلاج مرض باركنسون) يُمنع تناول هذه الأدوية بالتزامن مع أميتريبتيلين تيقع (انظر البند 2 - "يمنع استعمال الدواء إذا")
- أدريالين، إيفيدرين، إيزوبرينالين، نورادرينالين، فينيل إيفرين وفينيل بروبوتولامين (هذه يمكن أن تكون في أدوية السعال أو الرشح وفي بعض أدوية التخدير)
- دواء لخفض ضغط الدم المرتفع. مثلاً، حاصرات قنوات الكالسيوم (مثل، ديلتيازيم وفينرايامل)، جوانيثيدين، بينتانيدين، كلونيدين، ريسبرين ومثيل دوبا
- أدوية مضادة للفعل الكولينري مثل بعض الأدوية لعلاج مرض الباركنسون أو مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل تراپروبين، هيسكامين)
- ثيوريدازين (لعلاج الفصام)
- ترامادول (مسكن للآلام)
- أدوية لعلاج حالات العدوى الفطرية (مثل، فلوكونازول، تريبنافين، كيتوكونازول وإيتراكونازول)
- أدوية مهدئة (مثل، باربيتورات)
- أدوية مضادة للاكتئاب (مثل SSRIs (فلوكستين، پاروكستين، فلوفاكسامين)، دولوكستين وبوبروبيون)
- أدوية لعلاج أمراض معينة للقلب (مثل، حاصرات بيتا، أدوية لعلاج اضطرابات نظم القلب)
- سيميثيدين (لعلاج قرحة المعدة)
- ميثيلفينيدات (لعلاج اضطراب الإصغاء والتركيز مع فرط النشاط - ADHD)
- ريونتايفر (لعلاج HIV)

أقراص منع الحمل

• فينميفامين (لعلاج حالات العدوى)

• فينيتوين وكاربامازيب (لعلاج الصرع)

• St. John's wort (هيبريكوم - نبتة طبية تستعمل لعلاج الاكتئاب)

• أدوية لعلاج الغدة الدرقية

• حمض الفوليك

بوبروبرين والفينونات - هذه الأدوية قد تتفاعل مع أميتريبتيلين وقد تسبب أعراضاً مثل تقلصات عضلية لا عادية، بما في ذلك العضلات المسيطرة على حركة العينين، عدم هذه، هلوسات، غيبوبة، تعرّق، ارتفاع، منعكسات مفرطة، زيادة توتر العضل، درجة حرارة الجسم فوق 38°C. توجه إلى الطبيب إذا شعرت بمثل هذه الأعراض.

يجب أن تخبر الطبيب إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية تؤثر على نظم القلب مثل:

- أدوية لعلاج البويض غير المنتظم (مثل كينيدين، سوتالول)
- استيميزول وتيرفينادين (لعلاج حالات التحسس وحصى الكلى)
- أدوية لعلاج أمراض نفسية معينة (مثل، بيموزيد وسرنتيدول)
- سيترالويد (لعلاج أنواع مختلفة من حالات عسر الهضم)
- هالوفانترين (لعلاج الملاريا)
- ميثادون (لعلاج الألم والفتام)
- مدرات بولية (مثل فوروسيميد)

إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية جراحية وتلقي مادة للتخدير العام أو الموضعي يجب إخبار الطبيب عن تناول أميتريبتيلين تيقع.

كذلك، يجب إعلام طبيب الأسنان عن تناول أميتريبتيلين تيقع إذا كان الطبيب ينطوي على إعطاء مادة للتخدير الموضعي.

استعمال الدواء والغذاء:

يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول:

لا يوصى بشرب الكحول أثناء تناول هذا الدواء لأنه قد يزيد من التأثير المخدر.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدن أنك حامل أو تخططين لأن تحملي، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

لا يوصى بتناول الدواء أثناء الحمل إلا إذا كان يعتقد الطبيب أن هناك حاجة لذلك فقط بعد التفكير بحدوث الفائدة مقابل الخطر.

إذا تناولت الدواء خلال الجزء الأخير من الحمل، فقد يعاني الطفل من أعراض الانسحاب مثل، عصبية، زيادة توتر العضلات، ارتجاف، تنفس غير منتظم، سوء التغذية، بقاء شديد، احتباس البول وبمسك.

سوف يوصيك الطبيب سواء بالبدء بالإرضاع/مواصلته/التوقف عن الإرضاع أو التوقف عن استعمال هذا الدواء بناءً على اعتبارات تتعلق بفائدة الرضاعة بالنسبة لطفلك وفائدة العلاج الدوائي بالنسبة لك.

السيافة واستعمال الماكينات:

قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى نعاس ودوار، خاصة في بداية العلاج. لا تقم بالسياسة أو تشغيل الماكينات إذا شعرت أن الدواء يؤثر عليك بهذه الطريقة.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء:

تحتوي أقراص أميتريبتيلين تيقع 10 ملغ على لكتوز. إذا قِبل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، يرجى إبلاغ الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الحفظ مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج:

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب ما حدده الطبيب المعالج.

الاكتئاب:

كما هو الحال مع الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تشعر بالتحسن.  
في علاج الاكتئاب تكون مدة العلاج شخصية وتستمر عادة 6 أشهر على الأقل. يتم تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب.  
يجب الاستمرار بالعلاج طالما يوصيك الطبيب بذلك. قد يستمر المرض الأساسي لفترة طويلة. إذا قمت بوقف العلاج مبكراً جداً، قد تعود الأعراض لديك.  
**سلس البول الليلي:**  
في علاج سلس البول الليلي، سينظر الطبيب فيما إذا كانت هناك حاجة لمواصلة العلاج بما يتجاوز 3 أشهر.

**طريقة تناول:**  
يجب بلع الدواء مع قليل من الماء.  
يُمنع شطر القرص في حالة عدم وجود خط للشرط.  
لا توجد معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

**إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى:** إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بإبتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، واحضر علبة الدواء. تشمل أعراض الجرعة المفرطة:  
• انتعاش حدقتي العينين • نبض سريع أو غير منظم • صعوبة التبول • جفاف في الفم • اللسان • انتفاخ الأمعاء • نوبات • سخونة • عصبية • ارتباك • هلوسات • حركات لا إرادية • انخفاض ضغط الدم • نبض ضعيف • شحوب • صعوبة تنفس • تغير في لون الجلد إلى الأزرق • انخفاض في نظم القلب • نعاس • فقدان الوعي • غيبوبة • أعراض قليلة مختلفة مثل: احمرار اللسان، قصور القلب، انخفاض ضغط الدم، صدمة قلبية، حمض استقلابي (acidosis)، انخفاض اليوتاسيوم في الدم (hypokalemia)  
قد تكون للجرعة المفرطة لدى الأطفال عواقب جدية. الأطفال معرضون بشكل خاص لحادث غيبوبة، أعراض قلبية، صعبة في التنفس، نوبات، انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، إرقاق، نعاس، حركات عيوان، تقويزات وارتفاع مستوى السكر في الدم.

**إذا نسيت تناول الدواء:** إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، تناول جرعة بمجرد أن تتذكر، ولكن يُمنع تناول جرعتين معاً في حال من الأحوال.  
يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

**إذا توقفت عن تناول الدواء:** حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بشكل جازي دون استشارة الطبيب، سيقدر الطبيب متى وكيفية التوقف عن العلاج لتجنب الأعراض غير المرغوب فيها التي قد تحدث إذا تم إيقاف العلاج فجأة (مثل صداع، شعور سيئ، إرق، عصبية).

**يُمنع تناول الأدوية في الظلام تحقق من المصلى على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.**  
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال أميتريبتيلين تبعاً أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتحدث عن قرعة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

**يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا كان لديك أي من الأعراض الجانبية التالية:**

- أعراض رد فعل تحسسي وخيم (تاق)، مثل انتفاخ اللسان أو الوجه، أو صعوبة في التنفس. غير معروف: لا يمكن تحديد التنوع اعتماداً على المعطيات الموجودة.
- نوبات من تشوش الرؤية المتقطع، رؤية هالة ملونة حول نقاط الضوء أو ألم في العينين.
- يجب التوجه فوراً لإجراء فحص للعينين قبل استمرارك بإعلاج، هذه الحالة قد تشير إلى حدوث جلوكوما حادة. وهو عرض جانبي نادر قد يحدث لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.
- مشكلة في القلب تسمى إبالة مقطع QT (يمكن كشفها من خلال تخطيط كهربائية القلب، ECG). وهو عرض جانبي شائع قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10 مستعملين.

• إمساك شديد، انتفاخ في البطن، سخونة وتقيؤ. قد تظهر هذه الأعراض نتيجة انسداد الأمعاء الغليظة. هذا عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

- اصفرار الجلد وبياض العينين (يرقان). قد تكون هناك مشكلة في الكبد. هذا عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.
- كدمات، نزف، شحوب أو ألم مستمر في الحجره وسخونة. قد تكون لدى بعض الأعراض هي أول علامة على وجود مشكلة في الدم أو في نخاع العظام. مشكلة في الدم يمكن أن تتلصق في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (التي تحمل الأكسجين إلى الجسم)، خلايا الدم البيضاء (التي تساعد في محاربة العدوى) والصفائح الدموية (التي تساعد في التئام). عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.
- أفكار أو سلوكيات انتحارية. عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

#### أعراض جانبية إضافية:

**أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين عشرة:**

- نعاس/النعاس اللوم • ارتجاج في اليبدين أو أجزاء أخرى من الجسم • دوام • صداع • نبض غير منتظم، قوي أو سريع • تورم أو الوقوق بسبب انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم الانقباضي) • جفاف في الفم • إمساك • غثيان • زيادة الترقق • زيادة في الوزن • صعوبة

أو ببطء في التطق • عنوانية • احتقان الأنف  
**أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:**  
• ارتباك • اضطراب في الأداء الوظيفي الجنسي (انخفاض الرغبة الجنسية، مشاكل الانتصاب) • اضطرابات الإمعاء • تغيرات في التئوق • خدر أو الشعور بالوخز في الذراعين أو الرجلين • اضطرابات في التئوق • انتعاش الحدقتين • احمرار القلب • إرقاق • انخفاض مستويات الصوديوم في الدم • عصبية • اضطراب في التبول • الشعور بالطنش  
**أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000:**  
• إثارة، قلق، صعوبات في النوم، كوابيس • اختلاجات • رنين في الأذنين (طنين) (tinnitus) • ارتفاع ضغط الدم • إمساك، تقيؤ • تساقط الشعر • حشرى (urticaria)، انتفاخ في الوجه واللسان • صعوبات في التبول • زيادة إفراز حليب الأم أو تدفق حليب الأم دون إرضاع • ارتفاع الضغط داخل العين • انهييار • تقادم قصور القلب • خلل في وظائف الكبد (مثل، ركود صفراوي)

**أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000:**  
• قلة الشهية للبعض • ارتباك حاد (خاصة لدى متعاطين مسنين)، هلوسات • اضطراب في نظم القلب أو التئوق • انتفاخ في البغد العنابية • تساقط الشعر • زيادة الحساسية لضوء الشمس • تضخم الثدي عند الرجال • سخونة • تناقص في الوزن • نتائج شاذة في فحوص وظائف الكبد

**أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:**  
• مرض عضلة القلب • الشعور بعدم راحة داخلي والحاجة الماسمة أن تكون في حركة دائمة • اضطراب في الأعصاب المحيطة • ارتفاع شديد في الضغط داخل العين • اضطرابيات معينة في نظم القلب (من النوع المسمى "torsade de pointes") • التهاب تحسسي للحويصلات الهوائية في الرئتين ونسج الرئة

**أعراض جانبية نسبة شيوعها غير معروفة (أعراض لم يتم تحديدها تواترها بعد):**  
• قلة الشهية للطعام • ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم • ذهان كيرياتي (paranoia) • اضطرابيات الحركة (حركات لاإرادية أو تناقص في الحركة) • التهاب عضلة القلب التحسسي • التهاب الكبد • هبات من الحر • جفاف في العينين

يجب التوقف عن استعمال أميتريبتيلين تبعاً والتوجه لتلقي علاج طبي على الفور إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية:  
• طفق جلدي منتشر  
• ارتفاع درجة حرارة الجسم وتضخم الغدد الليمفاوية (DRESS) أو متلازمة فرط الحساسية (الدواء)

لوحظت زيادة خطر الإصابة بفسور في العظام لدى المتعاطين الذين تناولوا هذا النوع من الأدوية.  
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير متوقع في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التبليغ عن أعراض جانبية:

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوِّلك إلى استشارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يخزّن الدواء؟

تجنب التسمم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد وأوال الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.  
يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يسبب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### شروط التخزين:

يجب التخزين بدرجة حرارة تحت الـ 25°C.

#### 6. معلومات إضافية

**بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً:**  
Calcium hydrogen phosphate dihydrate, lactose monohydrate, maize starch, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol, talc, brilliant blue (E133).

**كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:**  
قرص مطلي بلون أزرق سماوي، محدب من كلا الجانبين. على أحد جانبي القرص منقوش "D" والجانب الأخر أملس.  
تحتوي كل عبوة على 28 قرصاً.

**اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:**  
تيفع إسرائيل م.رض، شارع دفورا هنيغيا 124، تل أبيب 6944020.  
تم تحريرها في أيار 2025.

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:** 172.41.36523  
لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المتكدر. مع هذا فالدواء مع ل كلا الجنسين.  
DOR-AMI-PIL-0525-09