

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

גזים איקס
טבליות 125 מ"ג

כל טבליה מכילה: 125 מ"ג סימתיקון - Simethicone 125 mg
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

גזים איקס אינו מיועד בדרך כלל לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 12 שנים. מתחת לגיל זה מומלץ להשתמש בטיפטיפות סימיקול.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה בנפיחות ובגזים במערכת העיכול.
קבוצה תרפויטית: נוגדי גזים

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
במיוחד אם אתה לוקח:

- לבותירוקסין לטיפול בהפרעות בבלוטת התריס. גזים איקס עלול להוריד את כמות הלבותירוקסין הנספגת ולהחליש את השפעתה.

שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול את התרופה אחרי ארוחה.

הריון, הנקה ופוריות

יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון, עשויה להיות בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה.
אין להשתמש בתכשיר בהריון אלא אם הרופא הורה לך זאת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל תערובת סוכרים. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך, כי יש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.
התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ועל כן נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים וילדים מעל גיל 12: 1-2 טבליות לאחר הארוחה או לפני השינה בהתאם לצורך.
אין ליטול יותר מ-4 טבליות ביממה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 12 שנים בשל צורת המתן/המינון הזמין בצורת מתן זו. מתחת לגיל זה מומלץ להשתמש בטיפטיפות סימיקול.
אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מים.
מותר לחצות את הטבליה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בגזים איקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. תופעות לוואי אפשריות הן בחילה, עצירות או תגובה אלרגית כגון פריחה עורית, גרד בעור, התנפחות של הפנים או הלשון או קשיי נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C. יש לאחסן באריזה המקורית. לשימוש עד חודשיים מיום הפתיחה.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Tribasic calcium phosphate, Dextrates, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, FD&C blue no.1 lake

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק זכוכית בנפח 60 מ"ל המכיל 30 טבליות. כל טבליה היא בצורה אובאלית, בצבע כחול בהיר ועם פס חציה. **שם היצרן/בעל הרישום וכתובתו:** כצט תעשיות כימיות בע"מ, הקדמה 3, קרית מלאכי.

עלון זה נערך בתאריך 07/2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 131-13-30853-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.