

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) 1986

يُستوق هذا الدواء بدون وصفة طبية

جازيم إيكس أقراص 125 ملغ

يحتوي كل قرص على: 125 ملغ من سيميثيكون - Simethicone 125 mg
المواد غير الفعالة ومثبتات الأرجية في المستحضر - انظر البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6.

اقرأ النشرة بإبهان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقم أعراض المرض أو لم تتحسن. جازيم إيكس غير مخصص عادة للأطفال الرضع والأولاد الذين عمرهم أقل من 12 عاماً. دون هذا العمر، يوصى باستعمال تينيتيوت سيميكون.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص للتخفيف من الانتفاخ والغازات في الجهاز الهضمي. الفعالية العلاجية: مضادات الغازات

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).

التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً دوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:
- ليفوثيروكسين لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية. قد يقلل جازيم إيكس كمية ليفوثيروكسين التي يتم امتصاصها ويضعف من تأثيره.

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء بعد وجبة الطعام.
الحمل، الإرضاع والخصوبة
يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاملاً، قد تكونين حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعاً.
لا يجوز استعمال المستحضر في فترة الحمل إلا إذا أمرك الطبيب بذلك.
معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على خليط من السكرتات. إذا أخبرك طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكرتات معينة، فاستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.
يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في القرص ولذلك يعتبر خالياً من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.
الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:

للبالغين والأولاد الذين سنهم فوق الـ 12: 1-2 أقراص بعد وجبة الطعام أو قبل النوم بحسب الحاجة.

لا يجوز تناول أكثر من 4 أقراص خلال 24 ساعة.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال الرضع والأولاد الذين عمرهم أقل من 12 عاماً بسبب طريقة الإعطاء للجرعة الدوائية المتوفرة بطريقة الإعطاء هذه. دون هذا العمر، يوصى باستعمال تينيتيوت سيميكون.
لا يجوز المضغ! يجب ابتلاع الدواء مع الماء.

يسمح بشطر القرص.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.
إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.
لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال جازيم إيكس إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

الأعراض الجانبية المحتملة هي الغثيان، الإمساك أو رد الفعل التحسسي مثل الطفح الجلدي، الحكة في الجلد، انتفاخ الوجه أو اللسان أو الصعوبات في التنفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المصنّعة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمّم. لا تتسبب التفتّح بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
يجب التخزين في العبوة الأصلية.

صالح للاستعمال لمدة شهرين كحدّ أقصى منذ يوم فتحه.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على:

Tribasic calcium phosphate, Dextrates, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, FD&C blue no.1 lake

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنينة زجاجية بحجم 60 ملل تحتوي على 30 قرصاً. كل قرص بيضوي الشكل، لونه أزرق فاتح مع خط للشر.

اسم المصنّع/صاحب الامتياز وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيميائية م.ض.، هاكيدما 3، كريات ملاحي.

تمّ تحرير هذه النشرة في 07/2025 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

131-13-30853-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

دواء
DTS
— Since 1921 —

LFL 010 07/25