

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
الدواء مُسَوَّق بموجب وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال لدى الحيوانات فقط

1. إسم الدواء, شكله وقوته
فيتامار 100 ملغ/ممل بيطري, 100 ملغ/ممل محلول للحقن

2. التركيب

المادة الفعالة:

كل ملل من المحلول يحتوي على: مريفولوكساسين 100 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة, أنظر البند 13.

3. لأي غرض مخصص الدواء؟

للبقر - لعلاج الالتهابات في جهاز التنفس الناجمة عن كائنات حية حساسة تجاه مريفولوكساسين. العلاج يُعطى فقط بعد إثبات حساسية البكتيريا للمادة الطبية وعند عدم وجود علاج بديل (عقب مقاومة مثبتة لمواد طبية أخرى).
للخنازير - لعلاج متلازمة - Metritis Mastitis Agalactia - الناتجة عن كائنات حية حساسة لمريفولوكساسين. العلاج يُعطى فقط بعد إثبات حساسية البكتيريا للمادة الطبية وعند عدم وجود علاج بديل (عقب مقاومة مثبتة لمواد طبية أخرى).

الفصيلة العلاجية: مريفولوكساسين هو مضاد حيوي من فصيلة الفلوروكوينولونات.

4. موانع الاستعمال

لا يوجد.

5. الأعراض الجانبية

لا يتوقع حدوث أعراض جانبية وخيمة بجرعات من حتى 3 أو 5 مرات من الجرعة الموصى بها في البقر وفي الخنازير, على التوالي.

على وجه الخصوص, لم يتم مشاهدة كدمات في المفاصل الرابطة.
الحقن لداخل العضل أو تحت الجلد يُحتمل جيدًا بالرغم من أنه قد ينتج جرح التهابي عابر في منطقة الحقن, دون تأثير سريري.

من الممكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج بالأدوية", الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية. أو عبر دخول الرابط التالي:

<https://sideeffects.health.gov.il>

6. حيوانات الهدف

للاستعمال في البقر: I.M. / S.C. / I.V.

للاستعمال في الخنازير: I.M.

7. طريقة الإعطاء والجرعة

الجرعة الموصى بها هي 2 ملغ/كغم وزن جسم/اليوم (1 ملل ل- 50 كغم وزن جسم) بحقنة يومية واحدة.
للبقر: حقنة لداخل العضل, تحت الجلد أو داخل الوريد مرة في اليوم لمدة 3-5 أيام.

للخنازير: حقنة لداخل العضل مرة في اليوم لمدة 3 أيام.

8. وقت الإنتظار

بقر:

وقت الإنتظار للحم: 6 أيام

وقت الإنتظار للحليب: 36 ساعة

خنازير:

وقت الإنتظار للحم: 4 أيام

9. تحذيرات

استعمال المستحضر الغير متوافق مع التعليمات في هذه النشرة قد يزيد من انتشار البكتيريا المقاومة للفلوروكوينولونات وأيضًا تقليل نجاعة العلاج بكوينولونات أخرى بسبب الإمكانية لمقاومة متصالبة.

تحذيرات للمعالج: يجب على الأشخاص ذوي حساسية مفرطة معروفة للفلوروكوينولونات الإمتناع عن استعمال هذا المستحضر. يجب غسل اليدين بعد الاستعمال.

الحمل والإرضاع: فيتامار 100 ملغ/ملل بيطري يمكن إعطائه لإناث البقر والخنازير في الحمل والرضاعة.

تفاعلات مع أدوية أخرى، وأنواع أخرى من التداخلات: لا يوجد.

جرعة مفرطة: قد تؤدي جرعة مفرطة لعلامات وخيمة التي تتمثل باضطرابات عصبية التي يتم علاجها بموجب الأعراض.

نقص توافق: لا يوجد.

10. تعليمات التخزين

- تجنب التسمم! إن هذا الدواء وأي دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال رؤيتهم وهكذا تتجنب التسمم.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة.
- تاريخ انتهاء الصلاحية يعود إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. إحتفظ القنينة في العبوة الخارجية من أجل الحماية من الضوء.
- يجب استعمال القنينة خلال 28 يوم بعد الفتح الأولي، بعد ذلك يجب إتلاف المادة التي لم تغد مستعملة.

11. تعليمات حول إتلاف المستحضر/بقايا المستحضر في نهاية الاستعمال

لا يجوز رش سمد الذي يحتوي على بقايا مريفلوكساسين بنفس سطح الأرض بشكل متواصل لمدة سنوات. أي مستحضر بيطري لم يتم استعماله أو أي فضلات تم الحصول عليها من استعمال مستحضر بيطري يجب أن تُتلف كفضلات سامة، لا يجوز الرمي في مياه المجاري.

12. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على: Gluconolactone, metacresol, thioglycerol, disodium edetate, water for injections.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: فيتامار 100 ملغ/ملل بيطري هو محلول شفاف بلون أصفر أو مخضّر-أصفر حتى بني، مغلف في قنينة. كل عبوة تحتوي على 1 أو 10 قناني من 100 ملل لكل واحدة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوّقة.
- صاحب التسجيل: فيتاماركيت م.ض.، طريق هوريش 23، المتنزه الصناعي إقليم موديعين.
- المنتج: فيت-أچرو مولتي- تريبيد كومباني م.ض.، لوبلين، بولندا.

تمّ الإعداد في تموز 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 161-47-35195