

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משוקקת על פי מרשם רופא בלבד

למוג'ין 25 מ"ג, 50 מ"ג, 100 מ"ג, 200 מ"ג
טבליות למג'ין טבליה מכליה: 100 מ"ג, 50 מ"ג, 25 מ"ג, 100 מ"ג, 200 מ"ג
מ"ג mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg
חומרים בלתי פעילים ומולרטיים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"

רקא בעיון אל העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע ומצטיין על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

למוג'ין מיועדת לטיפול באפילפסיה **במבוגרים ומתבגרים מגיל 14 שנים ומעלה:**

למוג'ין ניתנת לטיפול יחיד או משולב עם תרופות אחרות, לטיפול בפרוסיום חד צדדיים ופרוסיום כליניים, כולל פרוסיום טונים-פרוסיום. למוג'ין מיועדת לטיפול בנוקס-גסטאטו (Lennox-Gastaut syndrome), למוג'ין ניתנת כטיפול משולב יחד עם תרופות אחרות, אבל יכולה לשמש גם כתרופה אנטי-אפילפטית ראשונה, איתה יתחיל הטיפול בסידרום לנוקס-גסטאטו.

ילידים ומתבגרים בין הגילים 12 עד 17 שנים:
למוג'ין ניתנת כטיפול משולב עם תרופות אחרות לטיפול בפרוסיום חד צדדיים ופרוסיום כליניים, כולל פרוסיום טונים-קלוניים ופרוסיום המופיעים במצב של סידרום לנוקס-גסטאטו.

למוג'ין ניתנת לטיפול יחיד בהתקפי ניתוק טיפוסיים (Typical absence seizures).

למוג'ין מיועדת לטיפול בהפרעה דו-קוטבית (Bipolar disorder) **במבוגרים מגיל 18 שנים ומעלה:**

למוג'ין ניתנת למניעת התקפות הדיכאון במטופלים הסובלים מהפרעה דו-קוטבית אשר חווים בעיקר תקופות דיכאון.

למוג'ין אינה מיועדת לטיפול מייד (אקוטי) בתקופות דיכאון או מאניה.

קבוצה תרופית:

למוג'ין שייכת לקבוצת תרופות הנקראת תרופות נוגדות פרוסיום. למוג'ין חוסמת אותות במוח אשר מעוררים התקפים אפילפטיים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש** (אלרגי) לחומר הפעיל לאמטריג'ין או לכל אחד מהמרכיבים הנספיים עליו. מכלי התרופה (מפורט בסעיף 6).
- אם זה חל עליך **ספר לרופא** או **ליקח** את התרופה.

אהררות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בלמוג'ין, ספר לרופא אם:

- יש לך בעיות כליה לנשה**
- אי פעם התפתחה אצלך פריחה אחרי** נטילת לאמטריג'ין או תרופות אחרות הפרעה דו-קוטבית או לאפילפסיה
- אם אתה חווה פריחה או כוויית-שמש לאחר** נטילת לאמטריג'ין ו**חשיפה לשמש או לאור מלאכותי (כגון חדר שמש [סלוריום]).** הרופא יבדוק את הטיפול שלך ועשוי לייעץ לך להימנע מקרינה אולטרה וולת להגן על עצמך מהשמש (כגון שימוש בקרם הגנה ו/או ללבוש ביהוד מגן)
- אי פעם התפתחה אצלך דלקת בקרם המוח אחרי** נטילת לאמטריג'ין (קרא את ה**תיאור של תסמינים אלה בסעיף 4 של עלון זה: "תופעות לוואי נדירות")**
- אתה סבל לוקח תרופה המכילה לאמטריג'ין**
- אתה סובל ממצב המכונה תסמונת ברוגדה (Brugada syndrome) או מעניות לב אחרות.** תסמונת ברוגדה הינה מחלה גנטית הגורמת לפעילות חשמלית לא תקינה בלב. למוג'ין עלולה לגרום להריגות באק"ג אשר עלולות להוביל לאריתמיה (קצב לב לא תקין).

אם אחד מאלה חל עליך: **ספר לרופא**, שייכתן שחילטי כי יש להפחית את המינון או שלמלאי אינה מתאימה לך.

מידע חשוב על תגובות שעלולות לסכן חיים
מספר קטן של אנשים הנוטלים לאמטריג'ין מפתחים תגובה אלרגית או תגובה עורית העלולה לסכן חיים, שיכולות להתפתח לבעיות חמורות יותר אם הן לא מטופלות. אלו יכולות לכלול תסמונת טובגס-ג'ונסון (SJS), נמק אפידרמי ערלני (טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס TEN) ותגובה לתרופה הכוללת אוטונופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS). עלִיך להכיר את התסמינים שעל לשים לב אליהם בזמן שאתה לוקח למוג'ין. סיכון זה עשוי להיות משמך לורישט בגנים של אנשים ממוצא אסיאתי (בעיקר בין האז (Han Chinese) ומוצא תאילנדי (Thai)). אם אתה ממוצא אסיאתי ומועדך עבר לנשואות לוריאנט הגנטי (HLA-B* 1502), שוחח על כך עם הרופא טרם נטילת למוג'ין.

רקא את התיאור של תסמינים אלה בסעיף 4 של עלון זה תחת "תגובות שעלולות לסכן חיים" פנה מיד לקבלת ייעוץ רפואי.

המופאגוציטיק לימפופהיסטיציטוסי (HLA-Haemophagocytic lymphohistiocytosis)

ישנם דיווחים על תגובה נדירה אבל מאוד חמורה של מערכת החיסון במטופלים הנוטלים לאמטריג'ין.

צור קשר עם הרופא או עם הרוקח באופן מיידי אם אתה חווה את אחד מהתסמינים הבאים בזמן נטילת למוג'ין: חום, פריחה, תסמינים במערכת העצבים

(כגון ידיות, גלגול, הפרעות בתפקוד המוח').

מחשבות על פגיעה בעצמך או על התאבדות

תרופת נוגדות אפילפסיה משמשות לטיפול במספר מצבים, הכוללים אפילפסיה והפרעה דו-קוטבית. לאנשים עם הפרעה דו-קוטבית יכולות להיות לעיתים מחשבות אובדניות או על פגיעה בעצמם. אם יש לך הפרעה דו-קוטבית, יותר סביר שתחשוב כך:

- כשתחילי טיפול לראשונה, פנה לרופאך על פגיעה בעצמך או על התאבדות
- אם אתה מתחיל לרגל 25 שנים
- אם יש לך מחשבות או חוויות מטורדות או אם אתה מבחין שאתה מרגיש ער יותר

אם מפתח תסמינים חדשים בזמן שאתה לוקח למוג'ין:

פנה לרופא בהקדם האפשרי או פנה לבית החולים הקרוב לקבלת עזרה.

ייתכן שיועיל לך לספר לבן משפחה, מטפל או חבר קרוב שאתה יכול להפוך לדמואי או שיהיו לך שיניים משמעותיים במצב הרוח, ולבקש מהם לקרוא עלון זה. אתה יכול לבקש מהם להגיד לך אם הם למוזגים ולגבי דיכאון שלך או לגבי שינויים אחרים בהתנהגות שלך.

למספר קטן של אנשים המטופלים בתרופות נוגדות אפילפסיה כמו למוג'ין היו גם מחשבות על פגיעה בעצמם או התאבדות. אם יש לך מחשבות כאלה בכל שלב שהוא, **פנה מיד לרופא.**

אם אתה לוקח למוג'ין לאפילפסיה
בסוגים מסוימים של אפילפסיה ההתקפים עלולים להתחמיר או להתחמיר לעיתים קרובות יותר בזמן שאתה לוקח למוג'ין. חלק מהמטופלים עלולים לחוות התקפים חמורים, שעלולים לגרום לבעיות בריאותיות חמורות. אם ההתקפים שלך מתרחשים לעיתים קרובות יותר או אם אתה חווה התקף חמור בזמן שאתה לוקח למוג'ין:

פנה לרופא בהקדם האפשרי.

ילידים ומתבגרים

למוג'ין אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים.

למוג'ין אינה מיועדת לאנשים במנות לגיל 18 שנים לטיפול בהפרעה דו-קוטבית. תרופות לטיפול בדיכאון באנשים נפשיות אחרות מעלות את הסיכון להתנהגות ולמחשבות אובדניות בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

תגובות תרופתיות

אם אתה לוקח או את לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. הרופא צריך לדעת אם אתה לוקח תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה או בבעיות נפשיות וזאת כדי לוודא שאתה לוקח את המינון הנכון של למוג'ין. תרופות אלו כוללות:

- פריגאבראדפינ,** פוליאטמט, גאבאפנטין, לבטיראגטנס, פריגאבאלין, **טופיראמטא** או **זוניסאמיד,** המשמשות לטיפול באפילפסיה
- ליתיום, אולאנזאפינ** או **אריפירדול** המשמשות לטיפול בבעיות נפשיות
- בופרופין,** המשמשות לטיפול בבניית נפשיות או להפסקת נפשיות
- פרצטמול,** המשמשות לטיפול בכאבים ובחום
- ספר לרופא** אם אתה לוקח אחת מאלה.

לתרופות מסוימות יש תגובות בין תרופתיות עם למוג'ין או ייתכן שהן תעלנה את הסבירות לכך שיהיו לאנשים תופעות לוואי. אלה כוללות:

- ואלפרואט,** המשמשות לטיפול באפילפסיה ובעניות נפשיות
- קארבאמאזפינ,** המשמשות לטיפול באפילפסיה ובעניות נפשיות
- פינטופין,** פרמידיון או פנוברביטל, המשמשות לטיפול באפילפסיה
- ריספרידיון,** המשמשות לטיפול בבעיות נפשיות
- ריסאמפיצין,** שהיא אנטיביוטיקה
- תרופות המשמשות לטיפול בדיכאון** **זיהויה של וירוס הכשל החיסוני האנושי (HIV)** (שילוב של לופינאביר עם ריטונאביר או לטאזאנאביר וריטונאביר)
- אמצעי מניעה הורמונליים,** כגון **גלולות למניעת הריון (ראה בהמשך)**

ספר לרופא אם אתה לוקח אחת מאלה או אם אתה מתחיל או מפסיק לקחת אחת מהן.

אמצעי מניעה הורמונליים (כגון גלולות למניעת הריון) יכולים להשפיע על אופן פועלת של למוג'ין. ייתכן שהרופא ימליץ שתשתמשי בסוג מסוים של אמצעי מניעה הורמונלי או בשיטה אחרת למניעת הריון כגון קונדומים, דיאפרגמה או התקן תוך רחמי. אם את משתמשת באמצעי מניעה הורמונלי כמו גלולות למניעת הריון, ייתכן שהרופא ייקח ממך דגימות דם כדי לבדוק את רמת הלאמטריג'ין. אם את משתמשת באמצעי מניעה הורמונלי או מהכנתת להמתיל להשתמש באחד: **שוחחי עם הרופא** אשר ידון איתך בשיטות מתאימות למניעת הריון.

למוג'ין גם עשויה להשפיע על אופן פעילותם של אמצעי מניעה הורמונליים, אם כי אצל סביר שההשפיע איתם תפוח עלימים. אם את משתמשת באמצעי מניעה הורמונלי ומבחינה בשינויים כלשהם בדפוס המחזור החודשי שלך, כגון דימום או התכמה בין וסת ולוסת **ספרי לרופא.** אלה עשויים להיות סימנים לכך שלמוג'ין משפיעה על האופן שבו אמצעי המניעה שלך עובדים.

הריון והנקה

אם את בהריון, חושבת שיייתכן שאת בהריון או אם את מתכננת להרות, פני לרופא או לרוקח לקבלת יעוץ לפני נטילת תרופה זו.

אל תפסיקי את הטיפול מבלי לשוחח על כך עם הרופא. זה חשוב במיוחד אם יש לך אפילפסיה.

- הריון עשוי לשנות את יעילותה של למוג'ין, כך שיייתכן שתדקקי לבדיקות דם ומינון הלמוג'ין שלך עשוי להשתנות בהתאמה.
- עלול להיות סיכון מטט מוגבר למומים מולדים, כולל שפה שסועה או חך שסוע, אם למוג'ין נלקחת במהלך 3 החודשים הראשונים של ההריון.
- ייתכן שהרופא ימליץ לך לקחת יותר חומצה פולית אם את מתכננת להרות ובזמן שאת בהריון.

אם את מניקה או מתכננת להניק פני לרופא או לרוקח לקבלת יעוץ לפני נטילת תרופה זו. המרכיב הפעיל של למוג'ין עובר לחלב האם ועלול להשפיע על התינוק. הרופא ידון איתך בסוכנים ויתרונות שבנקבה בזמן שאת נוטלת למוג'ין ויבדוק את התינוק מטעם לפעם, אם מופיעים אצלו נמנום, פריחה או עלייה מועטת במשקל, אם תחלטי להניק. ידעי את הרופא אם את מבחינה באחד מהתסמינים הללו אצל התינוק.

נהיגה ושימוש במכוונת

למוג'ין עלולה לגרום לסחרחורת ולראייה כפולה.

אל תנהג או תשתמש במכוונת אלא אם אתה בטוח שאינך מושפע. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אם יש לך אפילפסיה דבר עם הרופא על נהיגה ושימוש במכוונת.

מידע חשוב על חלק האדמויטים של התרופה
למוג'ין טבליות מכילות טקוז. אם נאמר לך על ידי הרופא כי אתה סובל מרגישות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
למוג'ין טבליות מכילות פחות מ-1mmol נתרן (23 מ"ג) לטבליה, לכן ניתן לומר כי הן למעשה נטולות נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למוג'ין ואופן הטיפול בהתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו באופן אינדיבידואלי על ידי הרופא המטפל בלבד בהתאם לחומרת המחלה.

כמה לקחת

ייתכן שייקח קצת זמן למצוא את מינון הלמוג'ין המתאים ביותר עבורך. המינון שתיקח יהיה תלוי ב:

- גילך
- אם אתה אלה לוקח למוג'ין עם תרופות אחרות
- אם יש לך בעיות כלשהן כגליה או בכבד
- הרופא ירשום לך מינון נמוך להתחלה ויעלה את המינון בהדרגה במשך כמה שבועות עד שתגיע לפיננים שמתאים לך (המכונה המינון היעיל). **עלולם אל תיקח יותר למוג'ין ממה שהרופא הורה לך.**

אין לעבור על ההמנה המומלצת.

אין לקחת את מנת הלמוג'ין
קח את מנת הלמוג'ין פעם או פעמיים ביום, כפי שהורה לך הרופא. ניתן לקחת אותה עם או בלי מזון.

קח תמיד את כל ההמנה שהרופא רשם לך.

ייתכן שהרופא ייעץ לך גם להתחיל או להפסיק לקחת תרופות אחרות, תלוי במצב הרפואי. ביגיו אתה מטפל והאופן שבו אתה מגיב לטיפול.

טבליות למוג'ין ניתנות לבליעה בשלמותן עם מעט מים.

ילידים ובמתקשים בבליעת טבליות: ניתן לשים את הטבליה בכף מים ולבלוע לאחר מספר דקות, עם השלמת התפוררותה.

למוג'ין 25 מ"ג – בהיעדר קו חציה, אסור לחצות. אין מידע בנוגע לכתישה/לעיסה. למוג'ין 50 מ"ג, 100 מ"ג, 200 מ"ג – מותר לחצות. אין מידע בנוגע לכתישה/לעיסה.

אם נטלת טבליות למוג'ין יחד עם תרופות בלע עליון
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים, והבא איתך הילוף מן הרוקח.

אם נטלת יותר מדי למוג'ין, **קיימת סבירות גבוהה יותר שתפתח תופעות לוואי חמורות שעלולות להיות קטלניות.**

מי נטסל יותר מדי למוג'ין עלול לפתח כל אחד מהתסמינים האלה:

- תנועות עיניים מהירות, בלתי נשלטות (ריצוד עיניים)
- גמלוניות וחוסר קואורדינציה, הנשפיעים על שיווי המשקל (אטקסיה)
- שינויים בקצב הלב (המזוהים בדרך כלל באק"ג)
- פריחה נכרה, התקפים (פרוסיום) או תרדמת

אם סבלת **לקחת מנת בודדת של למוג'ין**
אין לקחת טבליות נוספות כדי לפצות על מצב שנשכחה. קח את המנה הבאה שלך בזמן הרגיל.

במקרה שאתה שוכח לקחת מספר מנות של למוג'ין
פנה לרופא לקבלת יעוץ על איך להתחיל לקחת אותה שוב. חשוב שתעשה זאת. יש להממיד בטיפול על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין להפסיק לקחת למוג'ין ללא יעוץ
אתה חייב לקחת למוג'ין כל עוד הרופא ממליץ על כך. אל תפסיק אלא אם כן הרופא מיעץ לך.

אם אתה לוקח למוג'ין לטיפול באפילפסיה

כדי להפסיק לקחת למוג'ין, **חשוב שהמינון יופחת בהדרגה** במשך כשבועיים. אם תפסיק לקחת למוג'ין באופן פתאומי, האפילפסיה שלך עלולה לחזור או להחמיר.

אם אתה אלה לוקח למוג'ין לטיפול בהפרעה דו-קוטבית
ייתכן שיידרש זמן עד שלמוג'ין תפעל, כך שלא סביר שתרגיש טוב יותר מיד. אם אתה מפסיק לקחת למוג'ין, אין צורך שמהינון שלך יופחת בהדרגה, אך עדיין עלִיך לשוחח תחילה עם הרופא אם אתה רוצה להפסיק לקחת למוג'ין.

אין לקחת תרופות בחושרן בידך הנוחית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או רוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בלמוג'ין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אלא תיבהל לעקוב אחר שימת תופעות לוואי. ייתכן שלא תסבול לזמן מאף אחת מהן.

הגובות שלולות לסכן חיים: פנה מיד לקבלת ייעוץ רפואי

מספר קטן של אנשים הנוטלים לאמטריג'ין מפתחים תגובה אלרגית או תגובה עורית העלולה לסכן חיים, שיכולות להתפתח לבעיות חמורות יותר אם הן לא מטופלות.
כביר יותר שותסמינים אלה יתרחשו במהלך החודשים הראשונים לטיפול עם למוג'ין. במיוחד אם המינון התחלתי גבוה מדי או עלייה במינון מהירה מדי או אם למוג'ין נלקחת עם תרופה אחרת בשל *ואלפרואט*. חלק מהתסמינים שכיחים יותר בילדים, כך שהורים צריכים להיות ערניים אליהם במיוחד.

תסמינים של תגובות אלה כוללים:

- פריחת בעור או אדמויטים** שעלולות להתפתח לתגובות ערויות חמורות או לעיתים מסכנות חיים, כולל פריחה עם נגעים בצורת מטרה (אדמנת רב-צורתית), פריחת עור נרחבת עם שלפוחיות וקילוח בעור המתרחשת בעיקר סביב הפה, האף, העיניים ואיברי המין (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון), קילוף נרחב של העור (יותר מ-30% משטח פני הגוף - טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס) או פריחות נרחבות עם מעורבות של הכבד, הדם ואיברים אחרים (תגובה לתרופה הכוללת אוטונופיליה ותסמינים מערכתיים שזדועה גם בשם תסמונת רגישות יתר (DRESS))
- כיבים כפה, בגרון, באף או באיברי המין**
- כאבים כפה או עיניים אדומות או נפוחות** (דלקת לחמית העין)
- חום גבוה,** תסמינים דמויי שפעת או תחושת נמנם
- נפיחות סביב הפנים או בלוטות נפוחות** בכוואר, בבית השחי או במפשעה

- ברורות או דימומים ללא צפויים** אם שאתאבעות מכחילות
- כאב גרון** או יותר זיהומים (כגון הצטננות) מהרגיל
- עלייה ברמות אדמי הכבד הנצופת בבדיקות דם
- עלייה בסוג מסוים של תא דם לבן (אוזונופילים)
- בלוטות לימפה מוגדלות
- מעורבות של איברי גוף כולל כבד וכליות

במקרים רבים תסמינים אלה יהיו סימנים לתופעות לוואי פחות חמורות, אך עלִיך להיות מודע ל**כך שהם עלולים להיות מסכני חיים ויכולים להתפתח לבעיות חמורות יותר,** כמו כשל אברים, אם הם לא מטופלים. אם הם אתה מבחין אחד מהתסמינים אלה:

פנה לרופא מיד. ייתכן שהרופא יחלים ללבצע בדיקות לכבד ולכליות או בבדיקות דם והוא עשוי להנחות אותך להפסיק לקחת למוג'ין. במקרה שפיתחת תסמונת סטיבנס-ג'ונסון או טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס, הרופא יאמר לך לא לייטול למוג'ין שוב לעולם.

המופאגוציטיק לימפופהיסטיציטוסי (HLH-Haemophagocytic lymphohistiocytosis) ((ראה בסעיף 2: "אהררות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

תופעות לוואי שיכוחת מאוד

- תופעות שעלולות להופיע **ביותר מ-10 מכל** 10 משתמשים:
- כאב ראש • פריחה בעור

תופעות לוואי שיכוחת

תופעות שעלולות להופיע **ב- עד 1 מכל 10** משתמשים:

- קטנופנת או רגזנות • תחושת שינונית או נמנום • תחושת חסרות • רעידות "נדוד" שינה • תחושת אי שקט • שלשול • יובש בפה • בחילות או הקאות
- תחושת עייפות • כאבים ברג או במפרקים או במקום אחר

תופעות לוואי שיכוחת

תופעות שעלולות להופיע **ב- עד 1 מכל 100** משתמשים:

- גמלוניות וחוסר קואורדינציה (אטקסיה)
- ראייה כפולה או ראייה מטושטשת
- שיטת ישעיר יוצאת דופן או הידלדלת הישער (אופלציה (alopecia))
- פריחה עורית או כוויית-שמש לאחר חשיפה לשמש או לאור מלאכותי (רגישות לאור)

תופעות לוואי נדירות

- תופעות שעלולות להופיע **ב- עד 1 מכל 1,000** משתמשים:
- תגובה עורית הגורמת לכתמים אדומים או נגעים אדומים על העור, שעשויים להראות כמטרה או "bull's-eye" עם מרכז אדום כה מוקף בטבעות אדומות בהירות יותר (אדמנת רב-צורתית).
- תגובה עורית מסכנת חיים (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון) (ראה גם את המידע בתחילת סעיף 4)
- קבוצה של תסמינים המופיעים ביחד הכוללת: חום, בחילה, הקאה, כאב ראש, צוואר נושה וקוצר נשימה קוצינית לאור בלתי. זה עלול להיגרם עקב דלקת בקרומים התספטים את המוח או חוסן השדרה (הירוק קרום המוח). בדרך כלל תסמינים אלה נעלמים עם הפסקת הטיפול אולם אם התסמינים ממשיכים או מחמירים **פנה לרופא**
- תנועות עיניים מהירות ובלתי נשלטות (ריצוד עיניים)
- עיניים מגרדות, עם הפרשה והתקשותה על העפעפיים (דלקת לחמית העין)

תופעות לוואי נדירות מאוד

תופעות שעלולות להופיע **ב- עד 1 מכל 10,000** משתמשים:

תגובה עורית מסכנת חיים (טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס) (ראה גם את המידע בתחילת סעיף 4)

תגובה עורית מסכנת חיים (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון) (ראה גם את המידע בתחילת סעיף 4)

קבוצה של תרופה הכוללת אוטונופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS) (ראה גם את המידע בתחילת סעיף 4)

נפיחות סביב הפנים (בצקת) או בלוטות נפוחות בכוואר, בבית השחי או במפשעה (הגדלת בלוטות לימפה) (ראה גם את המידע בתחילת סעיף 4)

- שינויים בתפקודי הכבד, שיראו בבדיקות דם או אי ספיקת כבד והצהבת העור (ראה גם את המידע בתחילת סעיף 4)
- הפרעה חמורה בקרישת הדם, שעלולה לגרום לדימומים או לשטפי דם לא צפויים (קרישה תוך-גולית מופשטת) (ראה גם את המידע בתחילת סעיף 4)
- המופאגוציטיק לימפופהיסטיציטוסי (Haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)) (ראה בסעיף 2: "אהררות מיוחדות הנוגעות לשימוש