

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה:
Alamycin LA Veterinary, Solution for Injection, 200 mg/ml
אלאמיצין אל.איי וטרינרי, תמיסה להזרקה, 200 מ"ג/מ"ל

2. חומר פעיל:

כל 1 מ"ל תרופה מכיל:

Oxytetracycline (as Dihydrate) 200 mg

התרופה מכילה גם חומר בלתי פעיל:

Sodium Formaldehyde Sulphoxylate 2 mg

לרשימה המלאה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה:

טיפול אנטיביוטי במיקרואורגניזמים הרגישים לאוקסיטטריציקלין בבקר, חזירים וכבשים.
קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה.

4. התוויות נגד:

לא לשימוש בחיות עם נזק כבדי או כלייתי.
לא לשימוש בחיות בעלות רגישות ידועה לאוקסיטטריציקלין.

5. תופעות לוואי:

לעיתים ניתן להבחין בתגובה קלה וחולפת במקום ההזרקה.
במקרים נדירים מאוד דווחו תגובות רגישות יתר, כולל אנפילקסיס (לעיתים קטלני).

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות
לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה
לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה:

בקר, חזירים וכבשים.

7. צורת המתן והמינון:

המינון המומלץ הוא 20 מ"ג/ק"ג משקל גוף (1 מ"ל ל-10 ק"ג משקל גוף) בזריקה תוך-שרירית עמוקה.

8. אופן השימוש בתכשיר:
מינון מקסימלי בכל אתר ההזרקה:

בקר:	20 מ"ל
חזירים:	5.5 מ"ל
כבשים:	5 מ"ל
חזרזירים:	1 יום 0.2 מ"ל
7 ימים	0.3 מ"ל
14 ימים	0.4 מ"ל
21 ימים	0.5 מ"ל
מעל 21 ימים	1.0 מ"ל / 10 ק"ג

9. זמן המתנה:

בקר:
בשר: 35 ימים
חלב: 8 ימים

חזירים:
בשר: 20 ימים

כבשים:
בשר: 20 ימים
חלב: 8 ימים

10. אזהרות:

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיית המטרה:
אין.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים:
אין למהול את התכשיר.
אם ניתן טיפול בחומרים נוספים במקביל, יש להשתמש באתר הזרקה שונה.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:
במקרה של מגע עם העיניים או העור שטוף מיד במים למנוע גירוי.
שטוף ידיים לאחר השימוש.
היזהר ממקרה של הזרקה עצמית.
- אזהרות נוספות:
אין.
- היריון והנקה של בעל החיים המטופל:
שימוש בטטראציקלין בתקופת התפתחות העצמות והשיניים, כולל בהיריון מתקדם, עלול להביא לשינוי צבעם.
ניתן להשתמש בתכשיר בזמן הנקה.
- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות:
לא ידועות.
- מינון יתר:
לא רלוונטי.

- חוסר תאימות (Incompatibility):
אין לערבב את התכשיר עם תכשירים רפואיים אחרים.

11. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון – יש לאחסן בטמפ' מתחת ל-25°C. יש להגן מאור.
- לאחר פתיחה ראשונה של התכשיר ניתן להשתמש עד 28 ימים. יש להשמיד שאריות של התכשיר לאחר 28 ימים מרגע הפתיחה הראשונה.
- לאחר שימוש בבקבוקון וחשיפה של תכולתו לאוויר, צבע התמיסה עלול להתכהות אך יעילות התכשיר אינה משתנה.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/ שאריות התכשיר בתום השימוש:

- כל תכשיר וטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש בתכשיר וטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף:

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
2-Pyrrolidone, Povidone K12, Light Magnesium Oxide, Sodium Formaldehyde Sulphoxylate, Monoethanolamine, Hydrochloric Acid, Water for Injection.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
תמיסה צלולה בצבע ענבר.
- גודלי האריזות:
בקבוקוני זכוכית סוג II המכילים 50 מ"ל ו-100 מ"ל, סגורים במכסה גומי עם טבעת אלומיניום. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

• בעל הרישום וכתובתו:

אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, 7019900

• שם היצרן וכתובתו:

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, Northern Ireland, UK

נערך ביוני 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:

080-95-92179-00