

KEVZARA[®]
(sarilumab) injection
200 mg | 150 mg



כרטיס מידע למטופל

- כרטיס למטופל זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעליך לדעת לפני, במהלך ובסיום הטיפול בסרילומאב (Sarilumab). הטיפול בסרילומאב ניתן בזריקה תת עורית.
- הצג כרטיס זה לכל רופא המעורב בטיפול שלך.
- עליך לקרוא בעיון את העלון לצרכן של סרילומאב לפני תחילת הטיפול.

פנה מיד לטיפול רפואי אם מתפתחים תסמינים כגון, חום, הזעות, צמרמורות, שיעול מתמשך, ירידה במשקל ותשישות או אם פיתחת כאבים באזור הבטן שאינם חולפים. הטיפול בסרילומאב עלול להחליש את יכולת מערכת החיסון שלך להילחם בזיהומים ובכך להגביר את הסיכון ללקות בזיהומים או להחמיר זיהום קיים.

- פנה לרופא אם יש לך זיהום כלשהו או נטייה להדבק בזיהומים רבים או אם אתה חווה זיהומים חוזרים ונשנים.
- פנה לרופא אם קיבלת חיסון לאחרונה או לפני קבלת חיסון.
- יש לבצע בדיקות לשחפת לפני התחלת הטיפול בסרילומאב.
- יש ליידע את הרופא המטפל אם חווית בעבר diverticulitis (דלקת סעיף במעי הגס) או כיבים בקיבה או במעיים.
- ספירת תאי דם לבנים ושינויים ברמות הכולסטרול שלך יבדקו בבדיקות דם לפני הטיפול בסרילומאב ובמהלכו.

פרטי הטיפול

מינון סרילומאב להזרקה:

תאריך תחילת הטיפול:

שם
החולה:



שם
הרופא:



טלפון
של הרופא:



בבקשה הקפד להביא לכל ביקור אצל איש צוות רפואי רשימה של כל התרופות הנוספות שהינך מקבל.

שמור כרטיס זה אצלך למשך 2 חודשים לאחר הטיפול האחרון שלך בסרילומאב מכיוון שתופעות לוואי עשויות להופיע זמן מה לאחר הטיפול האחרון בסרילומאב.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הקישור הבא
<https://sideeffects.health.gov.il>

כמו כן ניתן לדווח ישירות לסאנופי 09-8633081

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, כרטיס זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הכרטיס אושר בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך 17/06/2025

KEVZARA®
(sarilumab) injection
200 mg | 150 mg



بطاقة معلومات للمتعالج

- تحتوي هذه البطاقة للمتعالج على معلومات سلامة هامة التي يتوجب عليك معرفتها قبل، خلال وفي نهاية العلاج بـ ساريوماب (Sarilumab).
- يُعطى العلاج بـ ساريوماب بواسطة حقنة تحت الجلد.
- أعرض هذه البطاقة على كل طبيب يشارك في علاجك.
- يجب عليك قراءة النشرة للمستهلك الخاصة بـ ساريوماب بتمعن قبل بدء العلاج.

توجه حالا لتلقي علاج طبيّ إذا تطوّرت لديك أعراض مثل، حمى، تعرّق، حالات قشعريرة، سعال متواصل، نقص في الوزن وشعور بالوهن أو إذا تطوّرت لديك آلام غير عابرة في منطقة البطن.

العلاج بـ ساريوماب قد يُضعف من قدرة جهاز المناعة لديك على محاربة حالات العدوى فيزيد بالتالي من خطورة الإصابة بحالات عدوى أو قد يؤدي إلى تفاقم حالة عدوى موجودة.

- توجه إلى الطبيب إذا كنت تعاني من حالة عدوى معينة أو إذا كان لديك ميل للإصابة بحالات عدوى عديدة أو إذا كنت تعاني من حالات عدوى متكررة.
- توجه إلى الطبيب إذا تلقيت لقاحًا في الآونة الأخيرة أو قبل الحصول على لقاح.
- يجب إجراء فحوصات للكشف عن وجود مرض السل قبل بدء العلاج بـ ساريلوماب.
- يجب إبلاغ الطبيب المُعالج إذا عانيت في الماضي من diverticulitis (التهاب الرتج في الأمعاء الغليظة) أو من تقرحات في المعدة أو في الأمعاء.
- سيتم فحص تعداد خلايا الدم البيضاء والتغيرات في مستويات الكوليسترول لديك من خلال فحوصات دم قبل بدء العلاج بـ ساريلوماب وخلال العلاج أيضًا.

تفاصيل العلاج

المقدار الدوائي من ساريلوماب للحقن:

تاريخ بدء العلاج:

اسم
المريض:



اسم
الطبيب:



رقم
هاتف الطبيب:



رجاءً، احرص على أن تجلب معك خلال كل زيارة لدى أحد أفراد الطاقم الطبي، قائمة بجميع الأدوية الإضافية التي تتناولها.

احتفظ بهذه البطاقة لديك لمدة 2 أشهر بعد علاجك الأخير بـ ساريلوماب لأنه قد تظهر أعراض جانبية بعد فترة زمنية ما من العلاج الأخير بـ ساريلوماب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط التالي <https://sideeffects.health.gov.il>.

كما يمكن التبليغ مباشرة إلى ساتوفي 09-8633081

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ في هذه البطاقة بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

تمت المصادقة على هذه البطاقة وفق تعليمات وزارة الصحة في تاريخ 17/06/2025



KEVZARA[®]
(sarilumab) injection
200 mg | 150 mg

PATIENT CARD

- This patient card contains important safety information that you need to be aware of before, during, and after treatment with sarilumab. Sarilumab treatment is administered as a subcutaneous (SC) injection.
- Show this card to any doctor involved in your care.
- Carefully read the sarilumab package leaflet before starting treatment.

Seek medical attention immediately if you develop symptoms such as fever, sweats, chills, persistent cough, weight loss, listlessness, or if you develop stomach-area pain that does not go away.

Sarilumab treatment can lower the ability of your immune system to fight infections, which increases the risk of getting infections or make any infection worse.

- Talk to your doctor if you have any kind of infection, get a lot of infections, or have repeated infections.
- Talk to your doctor if you recently received any vaccination or before any vaccination.
- You should have been screened for tuberculosis prior to treatment with sarilumab.
- Update your doctor if you had in the past diverticulitis (condition of lower bowel) or ulcers in stomach or intestines.
- White blood cell counts and changes in your cholesterol levels will be monitored during blood tests performed before and during the treatment.

TREATMENT DETAILS

Dose of sarilumab Injection:

Start Date:



Patient's Name:



Doctor's Name:



Doctor's Phone:

Please make sure to bring a list of all the other medicines you are receiving to any visit with a healthcare professional.

Keep this card with you for 2 months after your last sarilumab treatment, since side effects could occur for some time after the last treatment with sarilumab.

Adverse events can be reported to the Ministry of Health via the following link: <https://sideeffects.health.gov.il>.

You can also report directly to Sanofi at 09-8633081.

This brochure was approved according to the guidelines of the ministry of health on 17/06/2025