



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) – 1986
يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

لوساردكس پلوس, أقراص

يحتوي كل قرص على 50 ملغ لوسارتان پوتاسيوم (Losartan potassium) و 12.5 ملغ هيدروكلوروثيازيد (Hydrochlorothiazide)

مركبات غير فعالة ومؤرجات في الدواء - أنظر بند 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
وصف هذا الدواء لك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن حالتهم الطبية مماثلة.

لوساردكس پلوس غير مخصص للأطفال والمراهقين دون جيل 18 سنة.

1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

لعلاج ارتفاع ضغط الدم في متعاليين يلائمهم العلاج المدمج ولخفض الاختطار (احتمال الخطر) لسكتة في متعاليين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتضخم البطين الأيسر (البطين الرئيسي) للقلب.

الفصيلة العلاجية: دمج صادة المستقبلية أنجيوتنسين II (لوسارتان) ومدر للبول من نوع ثيازيد (هيدروكلوروثيازيد).
أنجيوتنسين II هي مادة ينتجها الجسم, ترتبط بالمستقبلات في الأوعية الدموية وتتسبب في انقباضها. نتيجة لذلك, يتم التسبب بارتفاع في ضغط الدم. يمنع لوسارتان ارتباط أنجيوتنسين II بهذه المستقبلات ويسبب ارتخاء الأوعية الدموية, ونتيجة لذلك إلى انخفاض ضغط الدم. يعمل هيدروكلوروثيازيد عن طريق التسبب للكللى بتمرير المزيد من الماء والملح من خلاله. يساعد ذلك أيضاً في خفض ضغط الدم.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمواد الفعالة (لوسارتان, هيدروكلوروثيازيد), أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (أنظر بند 6).
- كنت حساساً (أليرجي) لمواد أخرى والتي هي من مشتقات السولفوناميدات (مثلاً: ثيازيدات أخرى, بعض الأدوية المضادة للبكتيريا مثل كوتريموكسازول). اسأل طبيبك إذا لم تكن متأكدًا.
- كنت تعاني من خلل وخيم في وظيفة الكبد.
- كان لديك مستويات منخفضة من البوتاسيوم, مستويات منخفضة من الصوديوم أو مستويات مرتفعة من الكالسيوم, التي لا يمكن تصحيحها من خلال العلاج.
- كنت تعاني من النقرس (Gout).
- كنت حاملاً لأكثر من 3 أشهر (يفضل تجنب لوساردكس پلوس أيضاً في بداية الحمل, أنظري البند "الحمل والإرضاع").
- كان لديك إصابة وخيمة في وظيفة الكلى أو أن كليتيك لا تنتجان البول أبداً.
- كان لديك سكري أو خلل في وظيفة الكلى وتعالج بدواء لخفض ضغط الدم يحتوي على أليسكيران.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي, قبل تناول الدواء.

إذا كنت تعاني من انخفاض في الرؤية أو ألم في العين. قد تكون هذه أعراض على تراكم السوائل في طبقة الأوعية الدموية للعين (choroidal effusion) أو ارتفاع في الضغط في العين وقد تظهر خلال ساعات حتى أسابيع من تناول الدواء. إذا لم يتم علاج هذه الحالة, قد تؤدي لفقدان دائم للرؤية. إذا كانت لديك في الماضي حساسية للبينسيلين أو لسولفوناميد, من الممكن أن تكون في اختطار أعلى لتطور هذه الأعراض.

أنت ملزمة بأن تخبري طبيبك إذا كنت تظنين أنك حامل (أو قد تدخلين في حمل). لا يوصى باستعمال لوساردكس پلوس في بداية الحمل، ويُمنع تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يتسبب بضرر وخيم لطفلك إذا تم تناوله في هذه المرحلة (أنظري البند "الحمل والإرضاع").

قبل العلاج بلوساردكس پلوس، أخبر الطبيب إذا:

- عانيت في الماضي من مشاكل في التنفس أو الرئتين (بما في ذلك التهاب أو سائل في الرئتين) بعد تناول هيدروكلوروثيازيد. إذا طوّرت ضيق تنفس وخيم أو صعوبات في التنفس بعد تناول لوساردكس پلوس، توجّه فوراً للحصول على علاج طبي.
- عانيت في الماضي من انتفاخ في الوجه، الشفتين، الحلق أو اللسان.
- كنت تتناول مدرات للبول.
- كنت تتبع حمية قليلة الملح.
- كنت تعاني أو عانيت من تقيؤ و/أو إسهال وخيم.
- كنت تعاني من قصور في القلب.
- كنت تعاني من قصور في وظيفة الكبد (أنظر في البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا").
- كنت تعاني من انسداد في الشرايين التي تؤدي إلى الكلى (تضييق في شرايين الكلية)، أو إذا لديك كلية واحدة تعمل فقط أو إذا خضعت لزرع كلية مؤخراً.
- لديك تضيق في الشرايين (atherosclerosis)، ذبحة صدرية (آلام في الصدر نتيجة لانخفاض وظيفة القلب).
- لديك تضيق في الصمام الأورطي أو التاجي (تضييق صمامات القلب) أو اعتلال قلب ضخامي (مرض يؤدي إلى تضخم عضلة القلب).
- كنت تعاني من السكري.
- كنت تعاني من النقرس (Gout).
- كنت تعاني من حالة أرجية، ربو أو حالة تسبب آلام مفاصل، طفح في الجلد وحمّى [Lupos] ذئبة حمامية جهازية].
- كان لديك مستويات مرتفعة من الكالسيوم أو مستويات منخفضة من البوتاسيوم أو أنك تتبع حمية قليلة البوتاسيوم.
- إذا توجب عليك الخضوع لتخدير (حتى لو كان ذلك لدى طبيب الأسنان) أو قبل جراحة، أبلغ طبيبك أو الفريق الطبي بأنك تتناول أقراص لوساردكس پلوس لأن التخدير قد يؤدي إلى انخفاض فجائي في ضغط الدم.
- كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأولى (متلازمة المرتبطة بارتفاع في إفراز هرمون الألدوستيرون من الغدة الكظرية، عقب خلل في الغدة الكظرية).
- كنت تتناول أحد الأدوية التالية التي تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم:
 - مثبط ACE (مثلاً، أنالپريل، ليزينوپريل، رامبپريل)، خاصة إذا كان لديك مشاكل في الكلى مرتبطة بالسكري
 - أليسكران.
- قد يفحص طبيبك أداء الكلى لديك، وضغط الدم، وكمية الشوارد (على سبيل المثال، البوتاسيوم) في دمك على فترات زمنية ثابتة. أنظر أيضاً المعلومات في بند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا".
- كنت تتناول أدوية التي قد ترفع مستوى البوتاسيوم في المصل (أنظر في بند 2 "تفاعلات بين الأدوية").
- مرضت في الماضي بسرطان الجلد، أو إذا كنت تُطور آفة غير متوقعة في الجلد أثناء استعمال الدواء. استعمال هيدروكلوروثيازيد، خاصة عند الاستعمال لفترة زمنية طويلة وبجرعات مرتفعة قد يزيد الاختطار لتطوّر أنواع معينة من سرطان الجلد والشفثين (سرطان جلد الذي ليس من نوع ميلانوما).
- يجب حماية الجلد من التعرض للشمس ولأشعة فوق البنفسجية (UV) أثناء استعمال لوساردكس پلوس.

أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من آلام بطن، غثيان، حالات تقيؤ أو إسهال بعد تناول الدواء. سوف يقرر طبيبك بخصوص مواصلة العلاج. لا تتوقف عن تناول الدواء على عاتقك.

تفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، تناولت في الآونة الأخيرة، أو يمكن أن تتناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

أخبر طبيبك إذا كنت تتناول إضافات بوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي بوتاسيوم، أدوية حاصرة للبوتاسيوم، أو أدوية أخرى التي قد ترفع مستويات البوتاسيوم في المصل (مثلاً، أدوية التي تحتوي تريمتوبريم)، حيث أن دمجها مع لوساردكس پلوس غير موصى به.

قد يحدث تفاعل بين أدوية مدرة للبول مثل هيدروكلوروثيازيد الموجود في لوساردكس پلوس وبين أدوية أخرى.

لا يجوز تناول **لوساردكس پلوس** بالدمج مع أدوية تحتوي ليثيوم من دون مراقبة لصيقة من قبل الطبيب.

قد يكون من الملائم اتباع وسائل حذر خاصة (على سبيل المثال, فحوصات دم) إذا كنت تتناول مدرات بول أخرى, مسهلات معينة, أدوية لعلاج النقرس (Gout), أدوية للسيطرة على نظم القلب أو للسكري (أدوية تعطى عن طريق الفم أو أنسولين).

من المهم أن يعلم طبيبك إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى لخفض ضغط الدم لديك.
- ستيرويدات.
- أدوية لعلاج السرطان.
- مسكنات للألم.
- أدوية لعلاج تلوثات فطرية.
- أدوية لعلاج التهاب المفاصل (arthritis).
- مستحضرات تحتوي على الراتنج لعلاج الكولسترول المرتفع مثل كوليسترامين.
- أدوية لترخية العضلات.
- أدوية للنوم.
- أدوية أفيونية مثل مورفين.
- 'Pressor amines' مثل أدرينالين أو أدوية أخرى من نفس الفئة.
- أدوية للسكري تُعطى عن طريق الفم أو إنسولين.

قد يتوجب على طبيبك تغيير الجرعة و/أو اتخاذ وسائل حذر أخرى:

إذا كنت تتناول مثبط ACE أو أليسكران (أنظر كذلك البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا" و- "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

رجاءً أعلم طبيبك أنك تتناول **لوساردكس پلوس** أيضًا إذا كنت على وشك الخضوع للتصوير وسوف يُعطى لك مادة مُضادة تحتوي اليود.

استعمال الدواء والغذاء والشراب

قد تتناقض كميات مبالغ بها من الملح في الطعام تأثير **لوساردكس پلوس**. يمكن تناول أقراص **لوساردكس پلوس** مع أو من دون طعام. يجب الامتناع عن شرب عصير الجريب فروت أثناء تناول أقراص **لوساردكس پلوس**.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يوصى بتجنب شرب الكحول خلال تناول هذه الأقراص: حيث أن الكحول بالدمج مع **لوساردكس پلوس** يزيد تأثير كل منهما.

الحمل والإرضاع

الحمل

يتوجب عليك أن تخبري طبيبك إذا كنت تظنين أنك حامل (أو قد تدخلين في حمل). سوف يوصيك طبيبك عادة أن تتوقفي عن تناول **لوساردكس پلوس** قبل دخولك في حمل أو بالحظة التي تعرفين فيها أنك حامل وسوف يوصيك بتناول دواء آخر بدلا من **لوساردكس پلوس**. لا يوصى باستعمال **لوساردكس پلوس** خلال الحمل ويُمنع تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل, لأنه قد يسبب ضررًا وخيمًا لطفلك إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

أبلغني طبيبك إذا كنت مرضعة أو على وشك الإرضاع. لا يوصى باستعمال **لوساردكس پلوس** من قبل الأمهات المرضعات, وقد يختار لك طبيبك علاجًا آخر إذا كنت معنية بالإرضاع.

الأطفال والمراهقين

لا توجد معلومات بخصوص استعمال **لوساردكس پلوس** لدى الأطفال. لذلك, لا يجوز إعطاء **لوساردكس پلوس** للأطفال.

الاستعمال لدى البالغين

يعمل **لوساردكس پلوس** بشكل جيد ويتم تحمله بنفس الدرجة لدى معظم المتعالجين البالغين, الكبار والأصغر سنًا. بالنسبة لمعظم المتعالجين الكبار هم بحاجة لنفس الجرعة كما للمتعالجين الأصغر سنًا.

السياسة واستعمال الآلات

عندما تبدأ العلاج بهذا الدواء, لا يجوز القيام بمهام تحتاج لانتباه خاص (على سبيل المثال: قيادة مركبة أو تشغيل آلات خطيرة) إلى أن تعرف كيف تستجيب للدواء.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي لوساردكس پلوس على لاكتوز. إذا قيل لك في السابق من قبل طبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة, يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً الاستعمال وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

تحدد الجرعة وكيفية العلاج من قبل الطبيب فقط.

الجرعة المتبعة عادة هي:

فرط ضغط الدم

الجرعة الاعتيادية من لوساردكس پلوس لأغلب المتعالجين المصابين بارتفاع ضغط الدم هي قرص واحد في اليوم من لوساردكس پلوس, من أجل السيطرة على ضغط الدم على مدار فترة 24 ساعة. الجرعة اليومية القصوى هي قرصين في اليوم من لوساردكس پلوس, مرة في اليوم.

المتعالجون الذين يعانون من ضغط دم مرتفع وتضخم البطين الأيسر

تحدد الجرعة من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول

لا يجوز شطر الاقراص, بسبب عدم وجود خط شطر. لا تتوفر معلومات بخصوص السحق والمضغ. يمكن تناول لوساردكس پلوس مع أو من دون طعام. يجب بلع الدواء مع كأس ماء.

إذا تناولت جرعة زائدة بالخطأ

قد تسبب جرعة زائدة انخفاضاً حاداً في ضغط الدم, خفقان القلب, نبض بطيء, تغيرات في تركيب الدم وجفاف. إذا تناولت جرعة زائدة أو بلع طفل من الدواء بالخطأ, توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

حاول أن تتناول لوساردكس پلوس كل يوم وفقاً لما وُصف لك. لكن, إذا نسيت تناول جرعة, لا تتناول جرعة إضافية. فقط عد لجدول تناول الزماني المعتاد.

يجب المداومة على العلاج كما أوصى الطبيب من أجل الحفاظ على السيطرة على ضغط الدم لديك. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية, لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملتصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها. إذا كان لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء, قد يسبب استعمال لوساردكس پلوس أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى فوراً إذا ظهر:

رد فعل تحسسي وخيم (طفح, حكة, انتفاخ الوجه, الشفتين, الفم أو الحلق ما قد يؤدي إلى صعوبات في البلع أو التنفس). هذا عرض جانبي وخيم ولكنه نادر, يظهر بشيوع 10-11 مستخدمين من بين 10,000. قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ أو للرقود في المستشفى.

نادرة جدًا (يمكن أن تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 شخصًا):
ضائقة تنفسية حادة (تشمل العلامات ضيق شديد في التنفس, حمى, ضعف وارتباك).

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر في 10-1 مستخدمين من بين 100):

- سعال, تلوث في سبل التنفس العليا, احتقان في الأنف, التهاب في الجيوب الأنفية, مشاكل في الجيوب الأنفية.
- إسهال, ألم البطن, غثيان, صعوبات في الهضم.
- آلام في العضلات أو انقباضات, آلام في القدمين, آلام الظهر.
- أرق, صداع, دوام.
- وهن, تعب, آلام في الصدر.
- ارتفاع بمستوى البوتاسيوم في الدم (الذي قد يسبب اضطرابات في نظم القلب), انخفاض في مستويات الهيموجلوبين.
- تغيرات في وظائف الكلى, يشمل قصور في الكلى.
- مستويات منخفضة من السكر في الدم (hypoglycemia).

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر في 10-1 مستخدمين من بين 1,000):

- فقر دم, بقع حمراء أو بنية على الجلد (أحيانًا خاصة على كفات القدمين, القدمين, الأذرع والمؤخرة, مع آلام في المفاصل, انتفاخ في اليدين وفي كفات القدمين وألم في البطن), كدمات, انخفاض في مستوى خلايا الدم البيضاء, مشاكل في التخثر, انخفاض في عدد الصفائح.
- فقدان الشهية, ارتفاع بمستويات حامض البول أو نقرس (Gout), ارتفاع بمستويات السكر في الدم, شذوذ في مستويات الشوارد في الدم.
- قلق, عصبية, اضطراب فرج (نوبات فرج متكررة), ارتباك, اكتئاب, أحلام شاذة, إضرابات في النوم, نعاس, ضرر بالذاكرة.
- إحساس بـ"دبابيس وإبر" أو إحساس مشابه لذلك, آلام في الأطراف, ارتداد, صداع نصفي (شقيقة), إغماء.
- رؤية مشوشة, شعور بالحرقان أو بالنخز في العينين, التهاب في ملتحة العينين, تفاقم الرؤية, رؤية الأشياء باللون الأصفر.
- رنين, أزيز, ضجة أو طرق في الأذنين, دوام.
- ضغط دم منخفض, الذي قد يكون مرتبط بتغيرات في الوضعية (شعور بدوار أو ضعف عند الوقوف), ذبحة صدرية (ألم في الصدر), نظم قلب غير سليم, حدث دماغي (TIA - نوبة إقفارية عابرة, "سكتة دماغية مصغرة"), نوبة قلبية, خفقان القلب.
- التهاب في الأوعية الدموية, يرافق في كثير من الأحيان بطفح في الجلد أو كدمات.
- ألم حلق, ضيق تنفس, التهاب الشعب الهوائية (Bronchitis), التهاب الرئتين, ماء في الرئتين (الذي يسبب صعوبات في التنفس), نزيف من الأنف, رشح, إحتقان.
- إمساك, إمساك شديد, غازات, مضايقة في البطن, انقباضات في المعدة, تقيؤ, جفاف في الفم, التهاب في غدة اللعاب, آلام أسنان يرقان (إصفرار العينين والجلد), التهاب البنكرياس.
- شرى, حكة, التهاب في الجلد, طفح, احمرار الجلد, حساسية للضوء, جلد جاف, بيغ, تعرق, تساقط الشعر.
- ألم في الذراعين, الكتفين, الفخذين, الركبتين ومفاصل أخرى, مفاصل منتفخة, تيبس, ضعف في العضلات.
- ارتفاع بوتيرة التبول بما في ذلك خلال الليل, خلل في وظائف الكلى بما في ذلك التهاب الكلى, تلوث في مسالك البول, سكر في البول
- انخفاض في الرغبة الجنسية, عجز جنسي.
- انتفاخ الوجه, انتفاخ موضعي (وذمة), سخونة.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر في 10-1 مستخدمين من بين 10,000):

- وذمة وعائية في الأمعاء: انتفاخ في الأمعاء المصحوب بأعراض مثل آلام بطن, غثيان, حالات تقيؤ وإسهال.
- التهاب الكبد (hepatitis), نتائج شاذة في فحوصات وظائف الكبد.

أعراض جانبية ذات شيووع غير معروف (أعراض جانبية لم يحدد شيووعها بعد):

- أعراض تشبه الإنفلونزا.
- ألم عضلات غير مبرر يرافقه بول داكن (بلون الشاي) (أنجلال الرُّبَيْدَات - rhabdomyolysis).
- مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم (Hyponatremia).
- شعور عام غير جيد.
- اضطرابات في حاسة الذوق.
- سرطان الجلد والثفتين (سرطان جلد الذي ليس من نوع ميلانوما).

- انخفاض في الرؤية أو الآلم في العينين نتيجة ضغط مرتفع (أعراض محتملة لتراكم السوائل في طبقة الأوعية الدموية في العين (choroidal effusion) أو جلوكوما حادة ضيقة الزاوية).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في صفحة الببب بموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه للاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ونظرهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך תפוגה) الذي يظهر على العلبة. تاريخ انتهاء الصلاحية يعود إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- ظروف التخزين: يجب الحفظ في العلبة الأصلية، في درجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تُساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, starch pregelatinised, hypromellose 2910, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 400, carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
قرص أبيض مستدير.

أحجام العلب المصادق عليها: 2, 10, 14, 20, 28, 30 قرص. قد لا تكون جميع أحجام العلب مسوقة.

المنتج وعنوانه: دكسل م.ض., دكسل 1, أور عكيًا 3060000, إسرائيل.

تم التنقيح في أيار 2025 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 141-56-31892-00
للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

صاحب التسجيل: دكسل فارما تكنولوجيا م.ض., شارع هكيما 10, يوكنعام عيليت, 2069200, إسرائيل