



וטמרקט בע"מ

972-3-9393000 www.vetmarket.co.il 972-3-9393001
דרך החורש 23, פארק תעשייה חבל מודיעין, ת.ד. 960, שוהם 6085001
Derech HaChosh 23, Industrial Park Hevel Modiin, P.O.B 960, Shoham, 6085001

מאי 2025

וטרינר/ית נכבדה,

חברת וטמרקט מודיעה על העדכונים הבאים בעלון לרופא ובעלון לצרכן של התכשיר

BAYTRIL 5% INJECTABLE SOLUTION VETERINARY

בייטריל 5% תמיסה להזרקה וטרינרי

התוויה:

In calves: Treatment of infections of the respiratory tract caused by enrofloxacin susceptible strains of Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica and Mycoplasma spp. Treatment of infections of the alimentary tract caused by enrofloxacin susceptible strains of Escherichia coli. Treatment of septicaemia caused by enrofloxacin susceptible strains of Escherichia coli. Treatment of acute mycoplasma-associated arthritis due to enrofloxacin susceptible strains of Mycoplasma bovis. only after the sensitivity of the bacteria has been proven and it has been found that there is no alternative treatment (proven resistance to other agents).

העלון לרופא והעלון לצרכן עודכנו. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד. תוספות מידע מסומנות באדום והחמרות בצהוב:

עלון לרופא:

4.5 Special precautions for use

....

- ii) Special precautions to be taken by the person administering the veterinary medicinal product to animals

Enrofloxacin may cause hypersensitivity (allergic reactions). People with known hypersensitivity to fluoroquinolones (e.g., enrofloxacin or ciprofloxacin) should avoid any contact with the product.

The product may be irritant to skin and eyes. Wear impervious gloves when handling the product. Avoid contact. Wash any splashes from skin or eyes immediately with water.

Wash hands and exposed skin after use. Do not eat, drink or smoke whilst using/handling the product.

4.6 Adverse reactions (frequency and seriousness)

...

In very rare cases, neurological signs (seizures, tremors, ataxia,

excitation) and anaphylactic reactions can also occur

עלון לצרכן:

5. תופעות לוואי

.....

במקרים נדירים מאד (פחות מחיה אחת מתוך 10,000 חיות), עלולים להופיע סימנים נוירולוגיים (פרכוסים, רעד, אטקסיה-הפרעה בקואורדינציה, עירור) וכן תגובות אנפילקטיות (אלרגיה חריפה).

10. אזהרות

....

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
- אנרופלוקסצין עלול לגרום לתגובה אלרגית. על אנשים עם רגישות ידועה לפלואורוקווינולונים (לדוגמה, אנרופלוקסצין או ציפרופלוקסצין) להימנע מכל מגע עם התכשיר. יש להימנע ממגע של התכשיר עם העיניים והעור עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים. יש ללבוש כפפות אטומות בעת טיפול במוצר. במקרה של נתזים על העור או העיניים יש לשטוף מיד עם מים. יש לשטוף ידיים ועור שנחשף לתכשיר לאחר השימוש. אין לאכול, לשתות ולעשן בזמן השימוש בתכשיר.

עלון לרופא ועלון לצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לחברת וטמרקט.