

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פרגובריס® עט מוכן להזרקה תמיסה להזרקה תת עורית

חומרים פעילים:

פוליטרופין אלפא (Follitropin Alfa (r-hFSH)

לוטרופין אלפא (Lutropin Alfa (r-hLH)

מוגשים בשלושה נפחים:

פרגובריס (300 יחב"ל * r-hFSH + 150 יחב"ל r-hLH) /0.48 מ"ל

פרגובריס (450 יחב"ל * r-hFSH + 225 יחב"ל r-hLH) /0.72 מ"ל

פרגובריס (900 יחב"ל * r-hFSH + 450 יחב"ל r-hLH) /1.44 מ"ל

(* יחב"ל – יחידות בין-לאומיות (IU)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראי סעיף 6.

קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוקח. שמרי עלון זה, ייתכן שתצטרכי לעיין בו שוב. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעבירי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדות ולמתבגרות מתחת לגיל 18.

1. למה מיועדת התרופה

התרופה מיועדת לגירוי זקינים והבשלתם בשחלות בנשים מבוגרות עם מחסור חמור בהורמונים גונדוטרופינים (FSH ו-LH).

קבוצה תרפויטית: הורמונים גונדוטרופינים אשר מעורבים בוויסות מערכת הרבייה.

התרופה מכילה 2 חומרים פעילים הנקראים - פוליטרופין אלפא (Follitropin Alfa) ולוטרופין אלפא (Lutropin Alfa). שני החומרים שייכים לקבוצת הורמונים הנקראת גונדוטרופינים שמעורבים בוויסות מערכת הרבייה.

החומרים הפעילים בתרופה הם העתקים של ההורמונים הטבעיים, FSH ו-LH אשר בגוף: הורמון FSH, הורמון מגרה הזקיך – מגרה הבשלת ביציות. הורמון LH, הורמון הצהבה – מעודד שחרור של הביציות.

התרופה מאפשרת לנשים עם רמות נמוכות של FSH ו-LH לפתח זקיך. הזרקה של הורמון נוסף - גונדוטרופין כוריוני אנושי (hCG) - מובילה לשחרור הביצית מתוך הזקיך. תהליך זה מסייע להשיג היריון.

2. לפני השימוש בתרופה

את וכן זוגך לתהליך ההפריה חייבים להיבדק לפני תחילת הטיפול על-ידי רופא מומחה לטיפול בבעיות פוריות.

אין להשתמש בתרופה אם:

- את רגישה (אלרגית) לחומרים הפעילים (FSH ו/או LH) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הלא פעילים, ראי סעיף 6).
- את סובלת מגידול במוח (בהיפותלמוס או בבלוטת יותרת המוח [בלוטת ההיפופיזה]).
- את סובלת משחלות מוגדלות או כיסי נוזלים בשחלות (ציסטות בשחלות) ממקור בלתי ידוע.
- את סובלת מדימום נרתיקי (וגינלי) לא מוסבר.
- את סובלת מסרטן בשחלות, ברחם או בשדיים.
- את סובלת ממצב שאינו מאפשר היריון תקין, לדוגמה בלות מוקדמת, פגם (עיוות) באיברי המין או גידול שפיר ברחם.

אין להשתמש בתרופה אם אחד מהמצבים הרשומים מעלה חל עלייך. אם אינך בטוחה, התייעצי עם הרופא, הרוקח או האחיות לפני השימוש בתרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

דברי עם הרופא, הרוקח או האחיות לפני השימוש בפרגובריס.

פורפיריה (Porphyria)

דברי עם הרופא שלך לפני תחילת הטיפול אם לך או לאחד מבני משפחתך יש פורפיריה (מחלה תורשתית בה אין יכולת פירוק של פורפירינים).

ספרי לרופא מייד אם:

- העור שלך הופך לשביר ומתכסה בקלות בשלפוחיות, במיוחד לאחר חשיפה תדירה לאור השמש.
- יש לך כאב בבטן, בזרוע או ברגל.

במקרים אלו, ייתכן שהרופא ימליץ על הפסקת הטיפול.

תסמונת גירוי יתר של השחלה (OHSS) Ovarian Hyperstimulation Syndrome

תרופה זו מגרה את השחלות ומעלה את הסיכון לפתח תסמונת גירוי יתר של השחלה (OHSS). במצב זה הזקיקים שלך מתפתחים יותר מדי והופכים לציסטות גדולות. אם את סובלת מכאבים בבטן התחתונה, עלייה מהירה במשקל, תחושת בחילה, הקאות או שיש לך קשיי נשימה, פני מיד לרופא. ייתכן שהרופא ינחה אותך להפסיק את השימוש בתרופה זו (ראי סעיף 4, תחת הכותרת "תופעות הלוואי החמורות ביותר").

במקרה שאינך מבייצת ואת מקפידה על מנת הטיפול המומלצת וזמני המתן, הסבירות להופעת תסמונת חמורה של גירוי יתר של השחלה היא נמוכה יותר. הטיפול עם פרגובריס לעיתים רחוקות גורם לתסמונת חמורה של גירוי יתר של השחלה. הסיכון להופעת התסמונת עולה אם משתמשים בתרופה להבשלה סופית של הזקיקים (המכילה גונדוטרופין כוריוני אנושי - hCG) – ראי סעיף 3 תחת הכותרת "מינון". אם את מפתחת גירוי יתר של השחלה, ייתכן שהרופא שלך לא ייתן לך טיפול בגונדוטרופין כוריוני אנושי - hCG במחזור טיפולי זה ויבקש ממך לא לקיים יחסי מין או שיבקש להשתמש באמצעי מניעה חסימתיים במשך 4 ימים לפחות. הרופא שלך יבצע מעקב קפדני של תגובת השחלה, בהתבסס על בדיקת אולטרסאונד ובדיקות דם (רמות אסטרדיול) לפני ובמהלך מחזור הטיפול.

היריון רב עוברי

כאשר משתמשים בפרגובריס, יש סיכון גבוה יותר להיריון עם יותר מעובר אחד ("היריון רב עוברי", לרוב תאומים), לעומת היריון כתוצאה מהתעברות טבעית. היריון רב עוברי יכול להוביל לסיבוכים רפואיים עבורך ועבור התינוקות שלך. את יכולה להפחית את הסיכון להיריון רב עוברי על-ידי שימוש במנה הנכונה של פרגובריס ועל-ידי מתן בזמנים הנכונים. מומלץ להיעזר בסריקות אולטרסאונד ובדיקות דם כדי למזער את הסיכון להיריון רב עוברי.

הפלה

במהלך גירוי השחלות ליצירת ביציות, הסיכון להפלה גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הרגילה.

היריון חוץ רחמי

נשים עם היסטוריה של חסימה או פגיעה בחצוצרות (מחלה בחצוצרות) נמצאות בסיכון להיריון בו העובר משתרש מחוץ לרחם (היריון חוץ רחמי), הן במקרה של היריון ספונטני והן בהיריון בעקבות טיפולי הפריה.

בעיות בקרישת דם (אירועי תסחיף פקיקי: תרומבואמבוליות)

יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה אם אי פעם היה לך או לאחד מבני משפחתך קרישי דם ברגל או בריאה או התקף לב או שבץ. את עלולה להיות בסיכון גבוה יותר לקרישי דם חמורים או להחמרה במצב קרישי דם קיימים בעת הטיפול בפרגובריס.

גידולים באיברי המין

היו דיווחים על גידולים בשחלות ובאיברי מין אחרים, הן שפירים והן ממאירים בנשים שעברו משטרי טיפול מרובים לטיפול באי-פריון.

תגובות אלרגיות

היו דיווחים בודדים של תגובות אלרגיות לפרגובריס שאינן חמורות. אם נתקלת בתופעה זו בתרופה דומה, דווחי לרופא לפני השימוש בפרגובריס.

ילדות ומתבגרות

פרגובריס אינה מיועדת לשימוש בילדות ומתבגרות מתחת לגיל 18.

תגובות בין תרופתיות

אם את לוקחת או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח.

אין לתת את התרופה פרגובריס עם תכשירים רפואיים אחרים בתערובת באותה זריקה. ניתן להשתמש בפרגובריס עם תכשיר פוליטרופין אלפא (Follitropin Alfa [FSH]) כזריקות נפרדות, אם נרשם לך על-ידי הרופא.

היריון והנקה

אין להשתמש בפרגובריס אם את בהיריון או מניקה.

נהיגה ושימוש במכונות

לא צפוי שתתקשה זו תשפיע על יכולתך לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פרגובריס מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נטרין למנה - נחשבת ל"נטולת נטרין".

פרגובריס (300 יחב"ל + 150 יחב"ל/0.48 מ"ל מכילה 0.176 מ"ג נטרין)
פרגובריס (450 יחב"ל + 225 יחב"ל/0.72 מ"ל מכילה 0.263 מ"ג נטרין)
פרגובריס (900 יחב"ל + 450 יחב"ל/1.44 מ"ל מכילה 0.527 מ"ג נטרין)

3. כיצד תשתמשי בתרופה

תמיד יש להשתמש בתרופה לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה בנוגע למינון ולאופן השימוש בתרופה.

השימוש בתרופה

- פרגובריס מיועדת למתן כזריקה מתחת לעור. יש לבחור אזור הזרקה אחר בכל יום וזאת על מנת להקטין את הגירוי בעור.
- הרופא או האחות יראו לך כיצד להשתמש בפרגובריס עט מוכן להזרקה כדי להזריק את התרופה.
- כאשר יאשרו שאת מסוגלת להזריק בבטחה את התרופה, תוכלי להכין ולהזריק את התרופה בעצמך בבית.
- כאשר את מזריקה לעצמך, יש לקרוא בעיון ולעקוב אחר החוברת "הוראות שימוש" המצורפת לאריזה.

מינון

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על-ידי הרופא בלבד.

משטר טיפול מתחיל עם מינון מומלץ של פרגובריס המכיל 150 יחב"ל של פוליטרופין אלפא (Follitropin Alfa) ו-75 יחב"ל של לוטרופין אלפא (Lutropin Alfa) בכל יום.

- בהתאם לתגובה שלך ייתכן שהרופא יחליט להוסיף בכל יום מנה של תכשיר פוליטרופין אלפא (Follitropin Alfa) בנוסף לזריקת הפרגובריס. במקרה זה, בדרך כלל מגדילים את המינון של פוליטרופין אלפא כל 7 או 14 יום ב-37.5-75 יחב"ל.
- הטיפול נמשך עד לקבלת התגובה הרצויה. זה קורה כאשר פיתחת זקיק מתאים, כפי שמאושר על-ידי אולטראסאונד ובדיקות דם.
- הדבר יכול לקחת עד 5 שבועות.

כאשר מושגת התגובה הרצויה, תינתן זריקה חד פעמית של גונדוטרופין כוריוני אנושי (hCG) בתוך 24-48 שעות לאחר הזריקה האחרונה של פרגובריס. מומלץ לקיים יחסי מין ביום הזרקה ה-hCG וביום שלאחריו. לחלופין, ניתן לבצע הזרעה תוך רחמית (IUI) או להיעזר בטכנולוגיית הפריה אחרת בהתאם לשיקול דעת הרופא.

אם הגוף מגיב חזק מדי, הטיפול יופסק ולא יינתן גונדוטרופין כוריוני אנושי (hCG) (ראי סעיף 2, תחת הכותרת "תסמונת גירוי יתר של השחלה"). במקרה זה הרופא ירשום לך מנה מופחתת של פוליטרופין אלפא במחזור הטיפול הבא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

השפעות מנת יתר של פרגובריס אינן ידועות, למרות זאת תיתכן התרחשות של תסמונת גירוי יתר של השחלה (OHSS). עם זאת, זה יתרחש רק אם ניתן גונדוטרופין כוריוני אנושי (hCG) (ראי סעיף 2, תחת הכותרת "תסמונת גירוי יתר של השחלה").

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פני מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והביאי אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. צרי קשר עם הרופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדקי התווית והמנה בכל פעם שאת נוטלת תרופה. הרכיבי משקפיים אם את זקוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועצי ברופא, ברוקח או באחות.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפרגובריס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבלי מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי החמורות ביותר
יש ליצור מיד קשר עם רופא אם את מבחינה באחת מתופעות הלוואי המפורטות להלן, ייתכן שהרופא יבקש להפסיק את השימוש בפרגובריס.

תגובות אלרגיות

תגובות אלרגיות כגון פריחה, אדמומיות בעור, סרפדת, נפיחות בפנים עם קשיי נשימה העלולות לעיתים להיות חמורות. תופעת לוואי זו מאוד נדירה.

תסמונת גירוי יתר של השחלה (OHSS) Ovarian Hyperstimulation Syndrome

- כאב בבטן התחתונה המלווה בבחילה או הקאות עלולים להיות תסמינים של תסמונת גירוי יתר של השחלה (OHSS). זה עלול להצביע על תגובת יתר לטיפול של השחלות ועל התפתחות של כיסים מלאים בנוזל או ציסטות (ראי סעיף 2, תחת הכותרת "תסמונת גירוי יתר של השחלה"). תופעת לוואי זו שכיחה. אם מתרחשת תופעה זו, הרופא יצטרך לבדוק אותך בהקדם האפשרי.
- תופעת תסמונת גירוי יתר של השחלה עלולה להפוך לחמורה כאשר חלה הגדלה משמעותית של השחלות, ירידה בייצור השתן, עלייה במשקל, קשיי נשימה ו/או אפשרות לצבירת נוזלים בבטן או בחזה. תופעת לוואי זו אינה שכיחה (עלולה להשפיע על עד 1 מ-100 מטופלות).
- סיבוכים של תסמונת גירוי יתר של השחלה, כגון פיתול של השחלות או התפתחות קרישי דם הם נדירים (עלולים להשפיע על עד 1 מתוך 1,000 מטופלות).
- סיבוכים חמורים בקרישיות הדם (אירועי תסחיף פקיקי), לרוב עם תסמונת חמורה של גירוי יתר של השחלה (OHSS), הם נדירים מאוד. סיבוך זה יכול לגרום לכאב בחזה, קוצר נשימה, שבץ או התקף לב. במקרים נדירים, זה עלול לקרות ללא קשר לתסמונת גירוי יתר של השחלה (OHSS) (ראי סעיף 2, תחת הכותרת "בעיות בקרישת דם (אירועי תסחיף פקיקי: תרומבואמבוליים)").

תופעות לוואי נוספות

שכיחות מאוד (עלולות להשפיע על יותר מאחת ל-10 מטופלות):

- כיסי נוזלים בשחלות (ציסטות בשחלות)
- כאב ראש
- תגובות מקומיות באתר ההזרקה כגון כאב, גירוד, חבורה, נפיחות או גירוי

שכיחות (עלולות להשפיע על עד אחת מתוך 10 מטופלות):

- שלשול
- כאב בחזה
- בחילות או הקאות
- כאב בבטן או באגן
- התכווצויות בבטן או נפיחות

נדירות מאוד (עלולות להשפיע על עד אחת מתוך 10,000 מטופלות):

- החמרה באסתמה

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה

- מנעי הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנעי הרעלה. אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקרר ($2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$). אין להקפיא. יש להגן מאור.
- לאחר פתיחה ראשונה ניתן לאחסן את העט המוכן להזרקה מחוץ למקרר (ב- 25°C) לתקופה של עד 28 יום. אין להשתמש בתרופה שנשארה בעט המוכן להזרקה לאחר 28 ימים.
- אין להשתמש בתכשיר במקרה שאת רואה שהתכשיר ניזוק, במקרה שהתמיסה אינה צלולה או עם חלקיקים.
- לאחר ההזרקה, השליכי את המחט המשומשת בבטחה.
- אין להשליך תרופות למערכת ניקוז השפכים (ביוב) או אשפת הבית. שאלו את הרוקח איך לזרוק את התרופות בהן אינך משתמשת יותר. אמצעים אלו יעזרו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה מכילה התרופה

החומרים הפעילים הם פוליטרופין אלפא ולוטרופין אלפא

- כל עט של פרגובריס (300 יחב"ל + 150 יחב"ל) 0.48 מ"ל מכיל 300 יחב"ל של פוליטרופין אלפא ו-150 יחב"ל של לוטרופין אלפא ב- 0.48 מ"ל ויכול לספק שתי מנות של פרגובריס 150 יחב"ל/75 יחב"ל.
- כל עט של פרגובריס (450 יחב"ל + 225 יחב"ל) 0.72 מ"ל מכיל 450 יחב"ל של פוליטרופין אלפא ו-225 יחב"ל של לוטרופין אלפא ב- 0.72 מ"ל ויכול לספק שלוש מנות של פרגובריס 150 יחב"ל/75 יחב"ל.
- כל עט של פרגובריס (900 יחב"ל + 450 יחב"ל) 1.44 מ"ל מכיל 900 יחב"ל של פוליטרופין אלפא ו-450 יחב"ל של לוטרופין אלפא ב- 1.44 מ"ל ויכול לספק שש מנות של פרגובריס 150 יחב"ל/75 יחב"ל.

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Sucrose, L-arginine monohydrochloride, poloxamer 188, L-Methionine, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, water for injection.

כמויות מזעריות של sodium hydroxide ו-concentrated phosphoric acid מוספות על מנת לשמור על רמת חומציות (pH) תקינה.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

פרגובריס מופיעה כתמיסה להזרקה צלולה, בצבע שקוף עד צהוב בהיר, בעט מוכן להזרקה רב מינוני:

- פרגובריס (300 יחב"ל + 150 יחב"ל) 0.48 מ"ל מגיעה באריזה הכוללת עט מוכן להזרקה רב מינוני אחד ו-5 מחטים חד פעמיות להזרקה.
- פרגובריס (450 יחב"ל + 225 יחב"ל) 0.72 מ"ל מגיעה באריזה הכוללת עט מוכן להזרקה רב מינוני אחד ו-7 מחטים חד פעמיות להזרקה.

- פרגובריס (900 יחב"ל + 450 יחב"ל)/1.44 מ"ל מגיעה באריזה הכוללת עט מוכן להזרקה רב מינוני אחד ו-14 מחטים חד פעמיות להזרקה.

בעל הרישום וכתובתו: מרק סרונו בע"מ, רחוב הקישון 18, יבנה 81220

שם היצרן וכתובתו: מרק אירופה B.V., אמסטרדם, הולנד

עלון זה נערך ביולי 2025

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 160 56 35355 00

הוראות שימוש

פרגובריס® עט מוכן להזרקה

(300 IU + 150 IU)/0.48 mL (450 IU + 225 IU)/0.72 mL (900 IU + 450 IU)/1.44 mL
Follitropin Alfa/Lutropin Alfa



מידע חשוב על פרגובריס עט מוכן להזרקה

- קראי את הוראות השימוש והעלון לצרכן לפני השימוש בפרגובריס.
- פעלי תמיד לפי הוראות שימוש אלו וההדרכה שניתנה לך על ידי הצוות הרפואי, שכן הם עשויים להיות שונים מניסיון העבר שלך. מידע זה יאפשר למנוע טיפול שגוי או זיהום מדקירה על ידי המחט או פציעה מזכוכית שבורה.
- העט פרגובריס מיועד להזרקה תת-עורית בלבד.
- השתמשי בעט פרגובריס רק אם הצוות הרפואי הדריך אותך כיצד להשתמש בו נכון.
- הצוות הרפואי יעדכן אותך כמה עטים של פרגובריס תצטרכי כדי להשלים את הטיפול.
- הזריקי את התרופה באותה שעה בכל יום.
- העט מגיע בשלוש פרזנטציות רב-מינוניות שונות:
 - 300 יחב"ל* + 150 יחב"ל/0.48 מ"ל
 - מכיל 0.48 מ"ל של תמיסת פרגובריס
 - מכיל 300 יחידות בין לאומיות של פוליטרופין אלפא ו-150 יחידות בין לאומיות של לטרופין אלפא
 - 450 יחב"ל + 225 יחב"ל/0.72 מ"ל
 - מכיל 0.72 מ"ל של תמיסת פרגובריס
 - מכיל 450 יחידות בין לאומיות של פוליטרופין אלפא ו-225 יחידות בין לאומיות של לטרופין אלפא
 - 900 יחב"ל + 450 יחב"ל/1.44 מ"ל
 - מכיל 1.44 מ"ל של תמיסת פרגובריס
 - מכיל 900 יחידות בין לאומיות של פוליטרופין אלפא ו-450 יחידות בין לאומיות של לטרופין אלפא

* יחב"ל - יחידות בין לאומיות

הערה:

- המנה המרבית שאת יכולה לכוון בעט פרגובריס (300 יחב"ל + 150 יחב"ל/0.48 מ"ל) היא 300 יחידות בין לאומיות.
- המנה המרבית שאת יכולה לכוון בעט פרגובריס (450 יחב"ל + 225 יחב"ל/0.72 מ"ל) ובעט פרגובריס (900 יחב"ל + 450 יחב"ל/1.44 מ"ל) היא 450 יחידות בין לאומיות.
- ניתן לסובב את כפתור כיוון המנה במרווחים של 12.5 יחידות בין לאומיות עד להגעה למנה המיועדת.
- עייני בעלון לצרכן למידע נוסף לגבי משטר המינון המומלץ, ותמיד עקבי אחר המינון המומלץ על ידי הרופא.

- המספרים המוצגים בחלון תצוגת המנה מייצגים את מספר היחידות הבין לאומיות (IU), ומציגים את המנה של פוליטרופין אלפא. הצוות הרפואי יאמר לך כמה יחידות בין לאומיות של פוליטרופין אלפא להזריק בכל יום.



איור 1



איור 2



איור 3

- המספרים המוצגים בחלון תצוגת המנה מסייעים לך:
 - א. לכוון את המנה שנרשמה עבורך (איור 1)
 - ב. לוודא שבוצעה הזרקה מלאה (איור 2)
 - ג. לקרוא את המנה שנותרה להזרקה עם עט נוסף (איור 3)
- הסירי את המחט מהעט מייד לאחר כל הזרקה.

אין לעשות שימוש חוזר במחטים.

אין לחלוק את העט ו/או המחט עם אדם אחר.

אין להשתמש בעט פרגובריס אם הוא נפל, נסדק או נפגם מכיוון שזה עלול לגרום לפציעה.

כיצד להשתמש ביומן הטיפולים של פרגובריס עט מוכן להזרקה

יומן הטיפולים נכלל בסוף הוראות השימוש.

השתמשי ביומן הטיפולים על מנת לתעד את הכמות שהוזרקה. הזרקת כמות לא נכונה של תרופה עלולה להשפיע על הטיפול שלך.

- תעדי את מספר יום הטיפול (עמודה 1), תאריך (עמודה 2), שעת ההזרקה (עמודה 3), ונפח העט (עמודה 4).
- תעדי את המנה שנרשמה עבורך (עמודה 5).
- בדקי שאת מכוונת את המנה הנכונה לפני ההזרקה (עמודה 6).
- לאחר ההזרקה, קראי את המספר המוצג בחלון תצוגת המנה.
- ודאי שקיבלת הזרקה מלאה (עמודה 7) או תעדי את המספר המוצג בחלון תצוגת המנה במידה והוא שונה מ-"0" (עמודה 8).
- במידת הצורך, הזריקי לעצמך באמצעות עט נוסף, כווני את המנה שנותרה הרשומה בחלק "הכמות שיש לכוון להזרקה השנייה" (עמודה 8).
- תעדי את המנה הזו שנותרה בסעיף "הכמות המכוונת להזרקה" (עמודה 6) בשורה הבאה.

השימוש ביומן הטיפולים לתיעוד ההזרקות היומיות שלך מאפשר לך לוודא בכל יום שקיבלת את המנה המלאה שנרשמה לך.

דוגמה ליומן טיפולים של עט (450 יחב"ל + 225 יחב"ל) 0.72/ל"מ:

1 מספר יום הטיפול	2 תאריך	3 שעת ההזרקה	4 נפח העט (IU) (300 IU + 150 IU) / 0.48 mL (450 IU + 225 IU) / 0.72 mL (900 IU + 450 IU) / 1.44 mL	5 המנה שנרשמה	6 הכמות המכוונת להזרקה	7 חלון תצוגת המנה	8 הכמות שיש לכוון להזרקה שנייה
#1	10 / 06	19:00	450 IU + 225 IU	150 IU / 75 IU	150		<input type="checkbox"/> אם אין "0", הזריקי את הכמות באמצעות עט חדש
#2	11 / 06	19:00	450 IU + 225 IU	150 IU / 75 IU	150		<input type="checkbox"/> אם אין "0", הזריקי את הכמות באמצעות עט חדש
#3	12 / 06	19:00	450 IU + 225 IU	225 IU / 112.5 IU	225		<input checked="" type="checkbox"/> אם אין "0", הזריקי את הכמות 75 באמצעות עט חדש
#3	12 / 06	19:00	450 IU + 225 IU	לא רלוונטי	75		<input type="checkbox"/> אם אין "0", הזריקי את הכמות באמצעות עט חדש

הכירי את פרגובריס עט מוכן להזרקה

המחט*:



העט:



* להמחשה בלבד. המחטים המסופקות עשויות להיראות מעט שונה.
** המספרים בחלון תצוגת המנה ומחסנית מלאי התרופה מציגים את מספר היחידות הבין לאומיות של התרופה.


שלב 1 הכיני את הציוד



איור 4




איור 5



איור 6

- 1.1 הניחי לעט לשהות בטמפרטורת החדר לפחות 30 דקות לפני השימוש כדי לאפשר לתרופה להגיע לטמפרטורת החדר.
 - 1.2 אל תשתמשי במיקרוגל או בגוף חימום אחר כדי לחמם את העט.
 - 1.3 הכיני משטח נקי וישר, כמו שולחן או משטח שיש, באזור מואר היטב.
1.3 תצטרכי גם (לא כלול באריזה):
 - ספוגיות אלכוהול ומכל לפריטים חדים (איור 4).
 - 1.4 שטפי את ידייך עם סבון ומים ויבשי אותן היטב (איור 5).
 - 1.5 השתמשי בידך כדי להוציא את עט פרגובריס מהאריזה.
 - 1.6 אל תשתמשי בכלים כלשהם, שימוש בכלים עלול לגרום נזק לעט.
 - 1.6 בדקי את השם על העט: "Pergoveris pre-filled pen".
 - 1.7 בדקי את תאריך התפוגה על תווית העט (איור 6).
- אל תשתמשי בעט פרגובריס אם תאריך התפוגה חלף או אם לא כתוב עליו "Pergoveris pre-filled pen".

שלב 2 התכונני להזרקה



איור 8



איור 7

2.1 משכי והסירי את מכסה העט (איור 7).

2.2 בדקי שהתרופה שקופה, חסרת צבע ואינה מכילה חלקיקים.


אין להשתמש בעט אם התרופה שינתה צבע או שהיא עכורה מכיוון שזה עלול לגרום לזיהום.

2.3 בדקי שחלון תצוגת המנה מכוון ל-"0" (איור 8).

בחרי את אזור ההזרקה:

2.4 הצוות הרפואי צריך להראות לך את אזורי ההזרקה לשימוש סביב אזור הבטן (איור 9). כדי למזער גירוי בעור, בחרי בכל יום אזור הזרקה אחר.

2.5 נקי את העור באזור ההזרקה על ידי ניגוב באמצעות ספוגית אלכוהול. אל תגעי בעור שניקית או תכסי אותו.



איור 9

שלב 3 חברי את המחט

חשוב: הקפידו תמיד להשתמש במחט חדשה עבור כל הזרקה. שימוש חוזר במחטים עלול לגרום לזיהום.

3.1 קחי מחט חדשה. השתמשי רק במחטים "לשימוש חד פעמי" שסופקו.

3.2 בדקי שהמכסה החיצוני של המחט לא פגום.

3.3 החזיקי בחוזקה את המכסה החיצוני של המחט.

3.4 בדקי שלשונית האיטום הניתנת להסרה על המכסה החיצוני של המחט לא פגומה או רופפת ושתאריך התפוגה לא חלף (איור 10).

3.5 הסירי את לשונית האיטום (איור 11).



איור 10



איור 11

אין להשתמש במחט אם היא פגומה, פג תוקפה או במקרה שהמכסה החיצוני של המחט או לשונית האיטום פגומים או רופפים. שימוש במחט שפג תוקפה או במחטים עם לשונית איטום או מכסה חיצוני פגומים יכול להוביל לזיהום. השליכי אותה למכל לפסולת חדה וקחי מחט חדשה.

3.6 הבריגי את המכסה החיצוני של המחט על קצה ההברגה של עט פרגובריס עד שתרגישי התנגדות קלה (איור 12).

אל תחברי את המחט חזק מדי, ייתכן שיהיה קשה להסיר את המחט לאחר ההזרקה.

3.7 הסירי את המכסה החיצוני של המחט על ידי משיכתו בעדינות (איור 13).

3.8 הניחי אותו בצד לשימוש מאוחר יותר (איור 14).

אין להשליך את המכסה החיצוני של המחט, מכיוון שהוא ימנע דקירה וזיהום בעת ניתוק המחט מהעט.

3.9 החזיקי את עט פרגובריס כשהמחט פונה כלפי מעלה (איור 15).

3.10 הסירי בעדינות והשליכי את מגן המחט הפנימי (איור 16).

אל תכסי מחדש את המחט עם מגן המחט הפנימי מכיוון שזה עלול לגרום לדקירה וזיהום.



איור 12



איור 13




איור 14



איור 16

איור 15


3.11. התבונני מקרוב בקצה המחט וחפשי טיפות זעירות של נוזל (איור 17).



איור 17

אז	אם
<p>בדקי אם יש טיפת נוזל בקצה המחט.</p> <ul style="list-style-type: none"> אם את רואה טיפת נוזל זעירה, המשיכי לשלב 4 כווני את המנה. אם אינך רואה טיפה זעירה בקצה המחט או בקירבתה, עלייך לבצע את השלבים בסעיף הבא כדי להוציא אוויר מהמערכת. 	<p>משתמשים בעט חדש</p>
<p>אין צורך לבדוק אם יש טיפת נוזל. המשיכי ישירות לשלב 4 כווני את המנה.</p>	<p>עושים שימוש חוזר בעט</p>

אם אינך רואה טיפה/טיפות קטנות של נוזל בקצה או קרוב לקצה המחט בפעם הראשונה שאת משתמשת בעט חדש:




איור 18

1. סובבי בעדינות את כפתור כיוון המנה קדימה עד שיופיע "25" בחלון תצוגת המנה (איור 18).

- את יכולה לסובב את כפתור כיוון המנה אחורה אם עברת את הערך "25".



איור 21



איור 20




איור 19

- אחזי בעט כשהמחט מופנית כלפי מעלה.
- הקישי בעדינות על מחסנית מלאי התרופה (איור 19).
- לחצי על כפתור כיוון המנה עד כמה שניתן. טיפת נוזל קטנה תופיע בקצה המחט (איור 20).
- בדקי שבחלון תצוגת המנה מופיעה הספרה "0" (איור 21).
- המשיכי לשלב 4 כווני את המנה.


אם לא מופיעה טיפת נוזל קטנה, צרי קשר עם הצוות הרפואי.

שלב 4 כיווני המנה

- 4.1. סובבי את כפתור כיוון המנה עד לתצוגת המנה הרצויה בחלון תצוגת המנה.
- דוגמה: אם המנה המיועדת הינה "150" יחידות בין לאומיות, ודאי שחלון תצוגת המנה מראה "150" (איור 22). הזרקת מנה לא נכונה של תרופה יכולה להשפיע על הטיפול שלך.



איור 23



איור 22

- סובבי את כפתור כיוון המנה קדימה (איור 22).
- ניתן לסובב את כפתור כיוון המנה אחורה אם סובבת אותו מעבר למנה המיועדת (איור 23).

- 4.2. בדקי שחלון תצוגת המנה מציג את המנה המלאה שנרשמה לך לפני שאת עוברת לשלב הבא.

שלב 6 הזריקי את המנה


חשוב: הזריקי את המנה כפי שהסביר לך הצוות הרפואי.

- 5.1. החדירי באיטיות את המחט במלואה לתוך העור (איור 24).



איור 24

- 5.2. הניחי את האגודל באמצע כפתור כיוון המנה. לחצי באיטיות על כפתור כיוון המנה כלפי מטה ככל הניתן והחזיקי אותו כדי להשלים את ההזרקה במלואה (איור 25).



איור 25

הערה: ככל שהמנה גדולה יותר, נדרש זמן רב יותר להזרקתה.


- 5.3. החזיקי את כפתור כיוון המנה לחוץ למשך 5 שניות לפחות (5s) לפני שתוציאי את המחט מהעור (איור 26).



איור 26

- המספר המוצג בחלון תצוגת המנה יחזור ל-"0".
- לאחר לפחות 5 שניות, מישכי את המחט החוצה מהעור תוך שמירה על כפתור כיוון המנה לחוץ (איור 27).


- כאשר המחט מחוץ לעור, שחררי את כפתור כיוון המנה.




איור 27

אל תשחררי את כפתור כיוון המנה עד שתוציאי את המחט מהעור.

שלב 6 הסירי את המחט לאחר כל הזרקה




איור 28



איור 29



איור 31



איור 30

- 6.1 הניחי את המכסה החיצוני של המחט על משטח ישר.
- 6.2 החזיקי בחוזקה את עט פרגובריס ביד אחת והחליקי את המחט לתוך המכסה החיצוני של המחט (איור 28).
- 6.3 המשיכי בדחיפת המחט המכוסה כנגד משטח יציב עד שישמע "קליק" (איור 29).
- 6.4 אחזי במכסה החיצוני של המחט ושחררי את המחט על ידי סיבובה בכיוון הפוך (איור 30).
- 6.5 השליכי את המחט המשומשת בבטחה למכל לפריטים חדים (איור 31). טפלי במחט בזהירות כדי למנוע פציעה מהמחט.

אין לעשות שימוש חוזר או לחלוק מחט משומשת.

שלב 7 לאחר ההזרקה




איור 32



איור 33

- 7.1 בדקי שקיבלת הזרקה מלאה:
 - בדקי שחלון תצוגת המנה מציג "0" (איור 32).
 - אם חלון תצוגת המנה מציג "0", השלמת את המנה.
 - אם חלון תצוגת המנה מציג מספר **גבוה מ-"0"**, עט פרגובריס ריק. לא קיבלת את המינון המלא שנרשם לך ועליך לבצע את שלב 7.2 להלן.
- 7.2 השלימי הזרקה חלקית (רק בעת הצורך):
 - **חלון תצוגת המנה** יציין את הכמות החסרה שאת צריכה להזריק באמצעות עט חדש. בדוגמה המוצגת, הכמות החסרה היא "50" יחידות בין לאומיות (איור 33).
 - כדי להשלים את המנה עם העט השני, חזרי על שלבים 1 עד 8.

שלב 8 אחסני את פרגובריס עט מוכן להזרקה



איור 34

- 8.1 החזירי את מכסה העט למקומו כדי למנוע זיהום (איור 34).
- 8.2 אחסני את העט באריזתו המקורית במקום בטוח ולפי המצוין בעלון לצרכן.
- 8.3 כשהעט ריק, שאלי את הצוות הרפואי כיצד להשליך אותו.

אין לאחסן את העט כשהמחט עדיין מחוברת, מכיוון שזה עלול לגרום לזיהום. אין לעשות שימוש חוזר בעט פרגובריס אם הוא נפל, נסדק או נפגם כיוון שזה עלול לגרום לפציעה. פני לצוות הרפואי אם יש לך שאלות.

