

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אונדציל אבקה

כל צנצנת מכילה:
אבץ אונדצילנאט 20% (Zinc Undecylenate 20%)
חומצה אונדצילנית 2% (Undecylenic Acid 2%)

מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

למניעה ולטיפול בזיהומי עור פטרייתיים, במיוחד פטרת כף הרגל (Athlete's foot).
קבוצה תרופוטית: אנטי פטריית.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (אבץ אונדצילנאט, חומצה אונדצילנית) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- הרחק מהעניים ומאזורים רגישים אחרים (כגון אף ופה).
- אין להשתמש על עור סדוק.
- אם הגירוי חמור, הפסק את השימוש.

ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים, אלא בהמלצת הרופא ובהשגחתו.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. היריון והנקה:

אם את בהיריון, עשוי להיות בהיריון או מיניקה, היוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכונית

לתרופה זו אין השפעה או השפעה זניחה על היכולת לנהוג או להפעיל מכונית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

טיפול

בהעדר הוראה אחרת מהרופא המינון המקובל בדרך כלל במבוגרים ובילדים מעל גיל שנתיים הוא:
יש לפזר פעמיים ביום (בוקר וערב) לאחר רחצה וייבוש, על כף הרגל ובין אצבעות הרגליים. בנוסף, רצוי לפזר את האבקה פעם ביום בתוך הגרביים, טרם לבישתן.

מניעה

בהעדר הוראה אחרת מהרופא המינון המקובל בדרך כלל במבוגרים ובילדים מעל גיל שנתיים הוא:
יש לפזר פעם ביום לאחר רחצה וייבוש, על כף הרגל ובין אצבעות הרגליים. בנוסף, רצוי לפזר את האבקה פעם ביום בתוך הגרביים, טרם לבישתן.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

יש להמשיך להשתמש בתרופה זו שבוע לאחר היעלמות סימני הזיהום הפטרייתיים.
אם חלה החמרה במצבך, יש לפנות לרופא.

צורת הנטילה-

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באונדציל אבקה

עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא בהקדם האפשרי בהופעת אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות:

- גירוי של העור (אדמומיות וגרד) או תגובות אלרגיות (פריחה, גרד, צפצופים בנשימה).
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל-25°C.
- ניתן להשתמש בתרופה עד 60 ימים מפתחת הצנצנת לראשונה, ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
- סגור היטב, למניעת חדירת לחות.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Talc, Colloidal Silicon Dioxide (Aerosil 200), Terpineol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

צנצנת פלסטיק המכילה אבקה לבנה.
גודלי אריזה מאושרים: 30 גרם, 80 גרם.
ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

יצרן ובעל הרישום: רקח תעשייה פרמצבטי בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון, 5881904, ישראל.

נערך ביולי 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
029-47-25330-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.