

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال في الحيوانات فقط

اسم الدواء البيطري، شكله ومعياره
سيتروماكس 1000 ملغ/غرام بيطري،
مسحوق لتحضير محلول للإعطاء في مياه الشرب

2. المادة الفعالة وكميتها في وحدة جرعة
AMOXICILLIN TRIHYDRATE 1000 mg/ 1 g
أموكسيسيلين تريهيدرات 1000 ملغ/ 1 غرام

3. لم أعد الدواء؟
لعلاج حالات عدوى تحدث بسبب جراثيم حساسة لأموكسيسيلين في الدجاج المخصص للحم. الفئة
العلاجية: مضادات حيوية من فئة البنسيلينات النصف-اصطناعية.

4. موانع الاستعمال
يمنع إعطاء المستحضر للأرانب، الهامستر، الجربيلات، والخنازير الغينية.
يمنع معالجة الحيوانات التي يعرف بأنها حساسة للبنسيلين أو اللينيتا لاكتام.

5. الأعراض الجانبية
لم يتم التبليغ عن أعراض جانبية للمستحضر.
يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض
جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة المنزل التابعة لوزارة الصحة (www.health.gov.il)
الذي يوجه للنموذج الانترنتي للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق دخول الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il/> :

6. حيوانات الهدف: الدجاج المخصص للحم.
يمنع تقديم المستحضر للدجاج المخصص لوضع البيض للأكل.

7. الجرعة وطريقة الإعطاء
يمكن استعمال المعادلة التالية لحساب الكمية المطلوبة لليوم من المستحضر (بالجرام):

$$\text{عدد الطيور} \times \text{معدل الوزن (كغم)} = \text{الجرعة (15 ملغ/كغم)}$$

لضمان جرعة دقيقة، يجب تحديد وزن الجسم بشكل دقيق قدر الامكان لتجنب إعطاء جرعة أقل من اللازم.
يتعلق استهلاك الماء مع الدواء بالحالة السريرية للطيور. بغية بلوغ الجرعة الصحيحة، يجب أن يكون
تركيز أموكسيسيلين في مياه الشرب ملائماً لاستهلاك الماء.

الجرعة الموصى بها هي 15 ملغ أموكسيسيلين تريهيدرات لكغم وزن جسم. فترة العلاج الاجمالية
يجب أن تكون 3 أيام متواصلة أو في حالات وخيمة 5 أيام متواصلة.

8. طريقة استعمال المستحضر
للإعطاء في مياه الشرب. يجب تحضير المحلول بواسطة مياه الحنفية الطازجة قبل الاستعمال مباشرة.
يجب التخلص من الماء مع الدواء الذي لم يتم استهلاكه بعد 24 ساعة. للتأكد من تناول المياه مع الدواء،
يجب عدم السماح للحيوانات بالوصول إلى مصادر مياه أخرى أثناء العلاج.

9. فترة الانتظار-

دواجن التسمين للذبح من أجل اللحم - يوم واحد.
يمنع تقديم المستحضر للدجاج المخصص لوضع البيض للأكل.

10. التحذيرات

• تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يستعمل المستحضر

- يجب تجنب استنشاق المسحوق.
- يجب غسل اليدين بعد الاستعمال.
- قد تسبب البنسيلينات والسيفالوسبورينات تفاعل حساسية (تحسس) بعد الحقن، الاستنشاق، البلع أو التلامس مع الجلد. حساسية مفرطة للبنسيلينات قد تؤدي إلى تفاعلات متبادلة مع السيفالوسبورينات، والعكس صحيح. التفاعلات التحسسية لهذه المواد قد تكون شديدة أحياناً.
- (1) يمنع استعمال الدواء في حال وجود حساسية معروفة تجاه هذه المواد أو إذا قيل لك ألا تعمل مع هذه المواد.
- (2) يجب الحذر عند الاستخدام لتجنب التعرض. يجب اتخاذ تدابير الحماية الموصى بها.
- (3) إذا كنت تطور أعراضاً بعد التعرض للدواء، مثل الطفح الجلدي، يجب عليك استشارة الطبيب وإظهار هذه التحذيرات للطبيب. تورم الوجه، الشفاه، والعينين أو صعوبة التنفس هي أعراض أكثر خطورة تتطلب علاجاً طبياً عاجلاً.

• الاستعمال في واضعات البيوض

دراسات المختبر على الفئران لم تُظهر دليلاً على تأثير ماسخ في الأجنة نتيجة إعطاء أموكسيسيلين.

• جرعة زائدة

لم يتم التبليغ عن مشاكل مع الجرعة الزائدة. يجب أن يكون العلاج عرضياً، ولا يوجد ترياق (دواء مضاد) محدد.

11. تعليمات التخزين

- امنع التسمم! هذا الدواء وأي دواء آخر يجب أن يحفظ في مكان مغلق بعيداً عن متناول الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على العبوة.

تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من الشهر.

• ظروف التخزين : دون 25°C.

- مدة الصلاحية بعد فتح العبوة - 3 أشهر.
- مدة صلاحية المنتج بعد تخفيفه بماء الشرب هي 24 ساعة، بتركيز 150 ملغ من الدواء لكل لتر من ماء الشرب.

12. تعليمات بخصوص التخلص من المستحضر/بقايا المستحضر في نهاية الاستعمال

كل ما يتبقى من مستحضر بيطري أو أي نفايات ناجمة عن استعمال مستحضر بيطري يجب أن تتلف على أنها نفايات سامة، لا يجوز رميها في المجاري.
• يجب التخلص من الماء مع الدواء الذي لم يتم استهلاكه بعد 24 ساعة.

13. معلومات إضافية

- لا يحتوي الدواء على مواد أخرى إضافة للمادة الفعالة
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة- كيس قاتم يحتوي على مسحوق بلون أبيض.
- بعد الاذابة نحصل على سائل صاف وعديم اللون.
- حجم العبوة: 1 كغم

المنتج: LABORATORIOS KARIZOO S.A., BARCELONA, SPAIN

صاحب التسجيل: فيتاماركيت م.ض.، ديرخ هوريش 23، بارك هتسيا اقليم موديعين.

تم الاعداد في 7/2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل المستحضرات الحكومي في وزارة الصحة: 178-68-36783-99