

**עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

**1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה**

סיטרמוקס 1000 מ"ג/גרם וטרינרי,  
אבקה להכנת תמיסה למתן במי שתיה

**2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון**

AMOXICILLIN TRIHYDRATE 1000 mg/ 1 g  
אמוקסיצילין טריהידראט 1000 מ"ג/1 גרם

**3. למה מיועדת התרופה**

לטיפול בזיהומים הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לאמוקסיצילין בתרנגולות פיטום.  
קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים הסמי-סינתטיים.

**4. התוויות נגד**

אין לתת את התכשיר לארנבות, אוגרים, גרבילים ושרקנים.  
אין לטפל בבעלי חיים שידועה לגביהם רגישות לפניצילינים או בטא-לקטאמים.

**5. תופעות לוואי**

לא דווחו תופעות לוואי לתכשיר.  
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על  
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות  
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,  
או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

**6. חיות מטרה: תרנגולות פיטום.**

אין להגיש התכשיר למטילות ביצי מאכל.

**7. מינון ואופן המתן**

ניתן להשתמש בפורמולה הבאה על מנת לחשב את הכמות הנדרשת ליום של התכשיר  
(בגרמים):

מספר העופות x משקל חי ממוצע (ק"ג)

66 (עבור מינון של 15 מ"ג/ק"ג)

על מנת לוודא מינון נכון, יש לקבוע את משקל הגוף באופן מדויק ככל האפשר כדי להמנע  
ממתן מינון נמוך מדי. צריכת המים עם התרופה תלויה במצב הקליני של העופות. על מנת  
להגיע למינון הנכון הריכוז של האמוקסיצילין צריך להיות מותאם בהתחשב בצריכת המים.

המינון המומלץ הוא 15 מ"ג אמוקסיצילין טריהידראט לק"ג משקל גוף. תקופת הטיפול  
הכוללת צריכה להיות 3 ימים רצופים או במקרים חמורים 5 ימים רצופים.

**8. אופן השימוש בתכשיר**

למתן במי השתייה. יש להכין את התמיסה עם מי ברז טריים מיד לפני השימוש. יש  
להפטר ממים עם תרופה שלא נצרכו לאחר 24 שעות. על מנת לוודא צריכה של המים עם  
התרופה, אין לאפשר לחיות גישה למקורות מים אחרים במהלך הטיפול.

## 9. זמן המתנה-

פטמים לשחיטה לבשר- יום אחד.  
אין להגיש התכשיר למטילות ביצי מאכל.

## 10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר  
יש להימנע משאיפת האבקה.  
יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.  
פניצילינים וצפלוספורינים עשויים לגרום לתגובת רגישות יתר (אלרגיה) לאחר הזרקה, שאיפה, בליעה או מגע עם העור. רגישות יתר לפניצילינים עשויה להוביל לתגובות צולבות לצפלוספורינים, ולהיפך.  
תגובות אלרגיות לחומרים אילו עשויות להיות חמורות לעיתים.  
(1) אין להשתמש בתכשיר במקרה של רגישות ידועה לחומרים אילו או אם נאמר לך לא לעבוד עם חומרים אילו.  
(2) יש להיזהר בשימוש כדי להימנע מחשיפה. יש לנקוט באמצעי ההגנה המומלצים.  
(3) אם הנך מפתח תסמינים בעקבות חשיפה לתכשיר, כגון פריחה עורית, עליך לפנות ליעוץ רפואי ולהראות לרופא אזהרה זו. התנפחות הפנים, השפתיים והעיניים או קשיי נשימה הם תסמינים חמורים יותר הדורשים טיפול רפואי דחוף.
- שימוש בזמן הטלה
- מחקרי מעבדה בחולדות לא הראו עדות לאפקט טרטוגני עקב מתן של אמוקסיצילין.
- מינון יתר
- לא דווחו בעיות עם מינון יתר. הטיפול צריך להיות סימפטומטי, אין אנטידוט (תרופת נגד) ספציפי.

## 11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : מתחת ל 25°C.
- חיי מדף לאחר פתיחת האריזה- 3 חודשים.
- חיי מדף לאחר מיהול במי שתיה - 24 שעות, בריכוז של 150 מ"ג תכשיר לליטר מי שתיה.

## 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

- כל תכשיר ווטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר ווטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביו. יש להפטר ממים עם תרופה שלא נצרכו לאחר 24 שעות.

## 13. מידע נוסף

- התרופה אינה מכילה חומרים אחרים בנוסף על החומר הפעיל
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה- שקית אטומה המכילה אבקה בצבע לבן. לאחר המסה מתקבל נוזל צלול וחסר צבע.
- גודל האריזה : 1 ק"ג

יצרן: LABORATORIOS KARIZOO S.A., BARCELONA, SPAIN

בעל הרישום: וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשייה חבל מודיעין.

נערך ב: 7/2025.

מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:

178-68-36783-99