

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إيميتريكس حقن

محلول للحقن 6 ملغ/0.5 ملل

تحتوي كل محقنة جاهزة سلفاً ذات 0.5 ملل على:

سوماتريبتان (ك سوكسينات) 6 ملغ

sumatriptan (as succinate) 6 mg

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إيميتريكس حقنة تحت الجلد يستعمل للتخفيف الحاد من نوبات الشقيقة، مع أو بدون هالة، وللعلاج الحاد بالصداع العنقودي (cluster headache). يجب إستعمال إيميتريكس حقن فقط عندما يكون هنالك تشخيص واضح لشقيقة أو لصداع عنقودي.

قد تحدث أعراض الشقيقة والصداع العنقودي نتيجة لتوسع مؤقت للأوعية الدموية في الرأس. إيميتريكس حقن يعتبر كخافض لتوسع تلك الأوعية الدموية. هذا الأمر بحد ذاته يساعد على تسكين الصداع والتخفيف من الأعراض الأخرى مثل الغثيان أو التقيؤ والحساسية للضوء والصوت.

الفصيلة العلاجية:

مسكنات للألام: تريبتانات - من المقدرات الإنتقائية للمستقبل 5-HT₁.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أليرجي) لـ سوماتريبتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6).
- إذا وجدت لديك مشكلة في القلب مثل تضيق الشرايين (مرض قلبي/إقفاري) أو آلام في الصدر (ذبحة صدرية)، أو إذا حدثت لديك نوبة قلبية.
- إذا وجدت لديك مشاكل في جريان الدم في رجليك التي تسبب آلام شبيهة بالتقلص أثناء المشي (مرض الأوعية الدموية المحيطية).
- إذا حدث لديك حادث دماغي أو حادث دماغي عابر (يسمى أيضاً نوبة إقفارية عابرة أو TIA).
- إذا وجد لديك ضغط دم مرتفع. من الجائز أن يكون بوسعك إستعمال إيميتريكس حقن إذا كان إرتفاع ضغط الدم لديك معتدلاً وقيدها بالمعالجة.
- إذا وجد لديك مرض كبدي حاد.

- مع أدوية أخرى للشقيقة، بما في ذلك تلك التي تحوي إرغوتامين، أو أدوية مشابهة مثل ميتيسير جيد ماليات (methysergide maleate)؛ أو أي تريبتان أو مقلد لـ 5-HT₁ (مثل ناراتريبتان أو زولميتريبنتان).
 - مع أي واحد من الأدوية المضادة للإكتئاب التالية:
 - مثبطات مونوأمين أو أكسيداز (MAOIs) أو إذا تناولت MAOI في الأسبوعين الأخيرين.
- إذا كان واحد مما ذكر يخصك:
- ← بلغ الطبيب، ولا تستعمل إيميتركس حقن.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

قبل العلاج بـ إيميتركس حقن أخبر الطبيب:

إذا وجدت لديك أية عوامل خطورة إضافية

- إذا كنت مدخناً بكثرة أو تستعمل علاجاً ببدائل النيكوتين، وخاصة
- إذا كنت رجلاً تجاوز عمر 40 سنة، أو
- إذا كنت امرأة بعد سن اليأس

في حالات نادرة جداً، تطور لدى أشخاص مشاكل قلبية شديدة بعد استعمال إيميتركس حقن، على الرغم من أنه لم تكن لديهم علامات لمرض قلبي قبل ذلك. إذا كانت إحدى النقاط السابقة تخصك فمن الجائز أن تكون معرضاً لخطورة أكبر لتطوير مرض قلبي - لذلك:

← أخبر الطبيب للتمكن من فحص الأداء الوظيفي لقلبك قبل أن يصف لك إيميتركس حقن.

إذا وجدت لديك سابقة لحدوث نوبات (إختلاجات)

أو إذا وجدت لديك حالات أخرى التي قد تزيد من احتمال حدوث نوبة لديك - على سبيل المثال، إصابة في الرأس أو الإدمان على الكحول:

← أخبر الطبيب لكي تكون تحت مراقبة حثيثة أكثر.

إذا كان لديك ضغط دم مرتفع، فمن الجائز أن إيميتركس حقن غير مناسب لك

← أخبر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال إيميتركس حقن.

إذا وجد لديك مرض في الكبد أو في الكلية

إذا إنطبق عليك أي مما ذكر:

← أخبر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال إيميتركس حقن.

إذا كنت حساساً لمضادات حيوية تسمى سولفوناميدات

فمن الجائز أن تكون حساساً أيضاً لـ إيميتركس حقن. إذا كنت تعلم بأنك حساساً لمضاد حيوي ولكنك غير واثق من أنه سولفوناميد:

← أخبر الطبيب أو الصيدلي، قبل استعمال إيميتركس حقن.

إذا كنت تتناول أدوية مضادة للإكتئاب المسماة SSRIs

(مثبطات إنقائية لإعادة امتصاص السيروتونين) أو SNRIs (مثبطات إعادة امتصاص سيروتونين ونورأدرينالين) أو TCAs (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة)

← أخبر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال إيميتركس حقن. أنظر أيضاً "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية" في السياق.

قد تحتوي محقنة إيميتركس حقن على لثي (لاتكس)

واقى الإبرة الذي على المحقنة قد يحتوي على لاتكس.

← أخبر الطبيب إذا كنت حساساً للاتكس.

إذا كنت تستعمل إيميتركس حقن في أوقات متقاربة

إن تكرار استعمال إيميتركس حقن الزائد عن الحد قد يفاقم الصداع لديك.

← أخبر الطبيب إذا كان هذا الأمر يخصك. من شأن الطبيب أن يوصيك بالتوقف عن استعمال إيميتركس حقن.

إذا كنت تشعر بألم أو بضغط في صدرك بعد استعمالك لـ إيميتركس حقن

تلك الأعراض قد تكون شديدة ولكنها عادة ما تزول بسرعة. إذا لم تزُل بسرعة، أو إذا تفاقمت:

← توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية. تحتوي الفقرة 4 (تظهر لاحقاً) على معلومات إضافية عن تلك الأعراض الجانبية المحتملة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

هنالك أدوية ممنوع تناولها مع إيميتركس حقن، وأخرى قد تسبب أعراضاً جانبية إذا تم تناولها مع إيميتركس حقن.

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

- إرغوتامين الذي يستعمل أيضاً لعلاج الشقيقة، أو أدوية مشابهة مثل ميتيسيرجيد (أنظر الفقرة 2 أسفل العنوان "لا يجوز استعمال الدواء"). لا تستعمل إيميتركس حقن بنفس الوقت مع هذه الأدوية. توقف عن تناول هذه الأدوية قبل 24 ساعة على الأقل من استعمال إيميتركس حقن. لا تتناول ثانية أي دواء يحوي إرغوتامين أو مركبات مشابهة لإرغوتامين بعد 6 ساعات على الأقل من استعمال إيميتركس حقن.
- تريبتانات/مقلدات المستقبل 5-HT₁ الأخرى (مثل ناراتريبتان، ريزاتريبتان، زولميتريبتان)، المستعملة أيضاً لعلاج الشقيقة (أنظر الفقرة 2 أسفل العنوان "لا يجوز استعمال الدواء"). لا تستعمل إيميتركس حقن في نفس الوقت مع هذه الأدوية. توقف عن تناول هذه الأدوية قبل 24 ساعة على الأقل من استعمال إيميتركس حقن. لا تتناول تريبتان/مقلد للمستقبل 5-HT₁ إضافي بعد 24 ساعة على الأقل من استعمال إيميتركس حقن.
- أدوية MAOIs المستعملة لعلاج الإكتئاب. إذا تناولتها في الأسبوعين الأخيرين فلا تستعمل إيميتركس حقن.
- أدوية SSRIs، SNRIs و- TCAs (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة) المستعملة لعلاج الإكتئاب. إن استعمال إيميتركس حقن مع هذه الأدوية يمكن أن يسبب متلازمة السيروتونين (مجموعة أعراض التي يمكن أن تشمل قلة راحة، إرتباك، تعرق، هذيان، زيادة المنعكسات، تقلصات عضلية، قشعريرة، زيادة النبض ورجفة). أخبر الطبيب فوراً إذا تأثرت على هذا النحو.
- هيبيريكوم بيرفوراتوم (St. John's Wort) إن تناول أدوية نباتية تحتوي على هيبيريكوم أثناء استعمال إيميتركس حقن قد يزيد من احتمال حدوث أعراض جانبية.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

- إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب قبل استعمال الدواء. هنالك معلومات محدودة فقط حول سلامة إيميتركس حقن على النساء الحوامل، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على حصول أية زيادة في الخطورة لحدوث عيوب خلقية. سوف يناقشك الطبيب فيما إذا كنت بحاجة أو لست بحاجة لاستعمال إيميتركس حقن عندما تكونين حاملاً.
- لا ترضعي طفلك لمدة 12 ساعة بعد استعمال إيميتركس حقن. إذا كنت تسحبين الحليب خلال هذه الفترة، إرمي الحليب ولا تعطيه لرضيعك.

السياقة وإستعمال الماكنات

قد يسبب لك دواءك أو أعراض الشقيقة الميل إلى النوم. في حال تأثرتك، فلا تقم بالقيادة أو تشغيل الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- **الصوديوم:** يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليومول صوديوم (23 ملغ) في المحقنة، لذا يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

إيميتريكس حقن عادةً ما يحقن في الفخذ.

إيميتريكس حقن مخصص للحقن تحت الجلد. لا يجوز بأي حال من الأحوال حقن إيميتريكس حقن داخل الوريد.

يتوفر دليل مرحلة - تلو - الأخرى لإستعمال إيميتريكس حقن في نهاية هذه النشرة (أنظر الفقرة 7).

متى يجب إستعمال إيميتريكس حقن

- يفضل إستعمال إيميتريكس حقن في اللحظة التي تشعر فيها ببدء حدوث الشقيقة أو الصداع العنقودي (**cluster headache**)، رغم أنه يمكن إستعماله في أي وقت خلال النوبة.

- لا يجوز إستعمال إيميتريكس حقن لمحاولة منع النوبة - يجب إستعماله فقط بعد بدء ظهور أعراض الشقيقة.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

الكبار بأعمار 18 حتى 65

- المقدار الدوائي الإعتيادي لكبار بأعمار 18 حتى 65 يعانون من شقيقة أو صداع عنقودي هو حقنة واحدة ذات 6 ملغ.

الأطفال دون عمر 18

- إيميتريكس حقن غير مخصص لإستعمال الأطفال دون عمر 18 سنة.

الكبار (فوق عمر 65)

- إيميتريكس حقن غير مخصص لإستعمال الكبار فوق عمر 65.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

في حال تجدد الأعراض لديك

- يمكنك إستعمال حقنة أخرى من إيميتريكس حقن إذا مرّت ساعة واحدة على الأقل من الحقنة الأولى، ولكن لا تستعمل أكثر من حقنتين خلال 24 ساعة.

إذا لم تؤثر الحقنة الأولى

- لا تستعمل حقنة جديدة أو أي مستحضر آخر من إيميتريكس لنفس النوبة.

إذا لم يخفف عليك إيميتريكس حقن أبداً:

← توجه إلى الطبيب أو الصيدلي لتلقي إستشارة.

إذا كنت تستعمل إيميتريكس حقن أكثر مما تحتاج

- لا تستعمل أكثر من حقنتين من إيميتريكس حقن خلال 24 ساعة.

إن إستعمال أكثر من اللازم من إيميتريكس حقن يمكن أن يسبب لك المرض. إذا إستعملت أكثر من حقنتين خلال 24 ساعة:

← راجع الطبيب لتلقي إستشارة.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيميتريكس حقن قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. بعض الأعراض قد تحدث نتيجة الشقيقة ذاتها.

رد فعل تحسسي: توجه فوراً إلى الطبيب

لقد حدثت الأعراض الجانبية التالية ولكن شيوعها الدقيق غير معروف.

• علامات الحساسية تشمل طفح، شرى (طفح حاك)؛ صفير؛ إنتفاخ الجفنين، الوجه أو الشفتين؛ إنهيار تام للأجهزة.

إذا كنت تقاسي من إحدى تلك الأعراض بعد وقت قصير من إستعمال إيميتريكس حقن: ← لا تستعمل الدواء ثانية. توجه فوراً إلى الطبيب.

أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10)

- ألم مؤقت في مكان الحقن
- شعور بحرقة أو حرق، إمرار، إنتفاخ، كدمات ونزف في مكان الحقن.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين)

- ألم، ثقل، ضغط أو توتر في الصدر، في الحنجرة أو في أجزاء أخرى من الجسم، أو شعور غير عادي، الذي يشمل خدر، وخز وسخونة أو برودة. تلك الأعراض قد تكون شديدة ولكنها عادة ما تزول بسرعة.

إذا إستمرت أو تفاقت تلك الأعراض (خاصة الألم في الصدر):

← توجه لتلقي مساعدة طبية عاجلة. يمكن أن تحدث تلك الأعراض لدى عدد قليل جداً من الأشخاص نتيجة نوبة قلبية.

أعراض جانبية شائعة أخرى تشمل:

- غثيان أو تقيؤ، رغم أن هذا الأمر قد يحدث جراء الشقيقة نفسها
- إرهاق أو نعاس
- دوام، الشعور بضعف، أو هبات من الحر
- ارتفاع مؤقت بضغط الدم
- ضيق في التنفس
- آلام عضلية.

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل)

- تغيرات في قيم وظائف الكبد في فحوص الدم. إذا توجب عليك إجراء فحص دم لوظائف الكبد، أخبر الطبيب بأنك تستعمل إيميتركس حقن.

قد يقاسي بعض المتعالجين من الأعراض الجانبية التالية لكن لا يعرف بأي وتيرة تحدث

- إختلاجات/نوبات، رجفان، تقلص عضلي قصير الأمد/مؤقت (الذي قد يؤثر على حركة الفك)، تصلب مؤخره الرقبة
- اضطرابات في الرؤية مثل وميض، تدني الرؤية، إدواجية الرؤية، فقدان الرؤية، لا بل قد يحدث في حالات معينة خلال غير عكوس في الرؤية (رغم أن هذه قد تحدث بسبب نوبة الشقيقة نفسها)
- مشاكل قلبية، قد يصبح فيها نبضك أسرع، أبطأ أو غير منتظم، آلام في الصدر (نبحة صدرية) أو نوبة قلبية
- جلد شاحب، بلون مائل للأزرق و/أو ألم في أصابع اليدين، في أصابع القدمين، في الأذنين، في الأنف أو في الفك كرد فعل للبرودة أو للتوتر (ظاهرة رينو)
- الشعور بإغماء (قد ينخفض ضغط الدم)
- ألم في الجانب الأيسر السفلي من البطن وإسهال دموي (إلتهاب القولون الإقفاري)
- إسهال
- إذا حدثت لديك مؤخراً إصابة أو إذا وُجد لديك إلتهاب (مثل الروماتيزم أو إلتهاب في القولون) فقد تقاسي من ألم أو تقاوم للألم في مكان الإصابة أو الإلتهاب
- ألم في المفاصل
- الشعور بقلق
- صعوبة في البلع
- تعرق مفرط.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يوصى بأن تحمل إيميتركس حقن معك تحسباً لحدوث نوبة شقيقة.
- إحتفظ دائماً الحقن الخاصة بك في العلبة التي رُودت بها، لحمايتها من الضوء. خزّن دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الطبيب أو الصيدلي حول كيفية التخلص بشكل آمن من علبة الخرطوشة الفارغة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

sodium chloride, water for injection.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
- كل عبوة علاج من إيميتريكس حقن تتوفر مع أداة للحقن (قلم) وعبوة خرطوشة تحوي محقنتين جاهزتين سلفاً.
- كل محقنة جاهزة سلفاً هي للاستعمال لمرة واحدة.
- صاحب الإمتياز: چلاكسو سميثكلين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: چلاكسو أوبيرايشنس (إنكلترا) م.ض.، برنارد كاسل، إنكلترا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 055-92-26920.
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- تم إعدادها في نيسان 2025.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.

©2025 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

7) دليل مرحلة - تلو - الأخرى لإستعمال عُدّة إيميتركس حقن الخاصة بك

تشرح لك هذه النشرة كيفية شحن قلم الحقن وكيفية إستعماله بغية إعطاء مقدار دوائي من إيميتركس حقن.

الرجاء قراءة هذه النشرة قبل إستعمال عدة الحقن.


عدة إيميتركس حقن الخاصة بشركة جلاكوسوسميثكلابن مخصصة للإستعمال مع الدواء إيميتركس حقن.

كل عدة حقن تتوفر مع إيميتركس علبة خرطوشة.

تحوي علبة الخرطوشة محقنتين جاهزتين سلفاً.

إحفظ بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال.

وصف الأجزاء:



كيفية الحقن بواسطة قلم إيميتركس حقن

- إقرأ النشرة بكاملها بتمعن قبل إستعمال قلم الحقن إيميتركس حقن.
- كل عدة حقن من إيميتركس حقن تشمل علبة خرطوشة التي تحوي محقنتين جاهزتين سلفاً مع إيميتركس حقن.
- كل محقنة جاهزة سلفاً هي للإستعمال لمرة واحدة.
- إستعن بالصورة أعلاه للتعرف على الأجزاء المختلفة لعدة الحقن.
- لا تشحن القلم حتى تكون جاهزاً لحقن الحقنة.

1 إرفع وإفتح غطاء العلبة الحاملة.



2 إنزع الختم الأحمر عن إحدى المحاقن. إفتح الغطاء الأزرق تحت الختم.

3 أخرج قلم الحقن من إيميتركس حقن من العلبة الحاملة. إفحص بأن القضيب الأبيض لا يبرز خارجاً بما يتجاوز طرف القلم (أنظر الصورة في الفقرة 11 في هذا الدليل).
إذا كان يبرز نحو الخارج، ضع القلم ثانية داخل العلبة الحاملة، إدفعه بقوة بحيث يجب أن يدخل القضيب لمكانه وسماع صوت طقة.
الآن، القلم جاهز للإستعمال.



4 إدفع قلم الحقن من إيميتركس حقن بقوة داخل علبة الخرطوشة المفتوحة ولولبه بلطف بإتجاه عقارب الساعة (نصف دورة تقريباً) حتى لا يمكن تدويره أكثر.



5 إحتفظ إصبعك بعيداً عن زر التحرير (زر الحقن) الأزرق وإسحب قلم الحقن من إيميتركس حقن خارج علبة الخرطوشة. من الجائز أن تضطر للسحب بقوة كافية من أجل عمل ذلك. يمنع قفل الأمان الحقن عن طريق الخطأ قبل أن تكون مستعداً.



6 الآن يكون القلم المشحون جاهزاً للإستعمال الفوري. لا تحاول إعادة القلم المشحون لداخل العلبة الحاملة إلا بعد إستعمالك للحقنة فقط، وإلا فقد يحصل عطب للإبرة كما أن القلم لن يعمل كما ينبغي.

7 إضغط القلم ذو الطرف الأزرق المطاول بقوة في مكان جلد نظيف - في الجانب الخارجي للفتحة غالباً (كما في الصورة) - بحيث ينزلق الجزء الرمادي نحو الأسفل ويغطي جزء من الطرف الأزرق. هذا الأمر يحرر قفل الأمان.



8 أمسك القلم بقوة وإضغط على زر الحقن الأزرق في الطرف العلوي لقلم الحقن من إيميتركس حقن. عد ببطء حتى 10 من خلال المحافظة على قلم الحقن من إيميتركس حقن ثابتاً جداً وزر الحقن مضغوطاً. لا تخرج القلم من الجلد مبكراً جداً لأننا يهدر قسم من الحقنة. بعد ذلك أخرج القلم وإحذر عدم لمس طرف الإبرة.

9 أعد فوراً المحقنة المستعملة للمكان الفارغ في علبة الخرطوشة.



10 إُدفع القلم نحو الأسفل داخل علبة الخرطوشة ما أمكن، لولب القلم نحو الخارج عن طريق التدوير عكس إتجاه عقارب الساعة (نصف دورة تقريباً) إلى أن يخرج.



11 أخرج قلم الحقن من إيبيتركس حقن من داخل علبة الخرطوشة. أعلق الغطاء الأزرق على المحقنة المستعملة.



12 أدخل قلم الحقن من إيبيتركس حقن ثانيةً للعلبة الحاملة وإدفعه نحو الأسفل حتى يثبت في مكانه. فهو يُسمع طقة عند عودته لمكانه. قلم الحقن من إيبيتركس حقن يكون جاهزاً للإستعمال حينئذٍ للمرة القادمة.



13 أألق عطاء العلبه الحامله إلى حين إضطرارك إلى إستعمال المحقنة الثانية.

Imi Inj PT v6B