

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ב - 1986

התרופה המשווקת על פי מרשם רופא בלבד

טופיתרים 25 מ"ג, 50 מ"ג, 100 מ"ג, 200 מ"ג טבליות

כל טבליה מכילה: טופירנט 25 מ"ג, 50 מ"ג, 100 מ"ג, 200 מ"ג
topiramate 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg

לחומרים בלתי פעילים ולארגוניים: ראה פרק 2, סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון על העליון עד סופו
בטוח
שימשת בתרופה.
עלון זה מכיל מידע מעמיקני על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק לילדו! אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לנשים הרות ולילדים מתחת לגיל שנתיים וכטיפול חד-תרופתי מתחת לגיל 7 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת ל:

- טיפול בכפרוסים. לשימוש במשולב עם תרופות אחרות במבוגרים ובילדים מגיל שנתיים ומעלה, או כטיפול חד-תרופתי לחולים מבוגרים ובילדים מגיל 7 שנים ומעלה.
- מניעת מיגרנה במבוגרים. התכשיר אינו מועד לשיכון כאב בזמן התקף מיגרנה.

קבוצה תרופית: תרופות אנטי אפילפטיות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה גריש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, המפורטים בסעיף 6.

- מניעת מיגרנה
- אין להשתמש בטופיתרים אם את בהריון.
- אם את אישה בגיל הפוריות, אין להשתמש בטופיתרים אלא אם את נטולת אמצעי מניעה בעלי יעילות גבוהה במהלך הטיפול בטופיתרים (מידע נוסף בסעיף "היריון והנקה – עצות חשובות לנשים בגיל הפוריות").

טיפול באפילפסיה

- אין להשתמש בטופיתרים אם את בהריון, אלא אם אין טיפול חלופי שמספק שליטה מספקת בכפרוסים.
- אם את אישה בגיל הפוריות, אין להשתמש בטופיתרים אלא אם את נטולת אמצעי מניעה בעלי יעילות גבוהה במהלך הטיפול בטופיתרים. יוצא הדופן היחיד הוא אם את טופיתריה טופיתריה שנותן שליטה מספקת בכפרוסים ואת מתכנתת להיכנס להריון. יש להוועץ ברופא על מנת לוודא שקבלת מידע אודות הסיכונים בטליות טופיתרים במהלך ההריון והסיכונים בכפרוסים במהלך ההריון (מידע נוסף בסעיף "הריון והנקה – עצות חשובות לנשים בגיל הפוריות").

אזהרות מיוחדות המנועות לשימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה בלמי
ההישג בתרופה לפני התחלת הטיפול אם אתה סובל מ:

בעיות בטליות בייחוד אבנים בכליות או שאתה חולה המטופל בידיאליזה. היסטוריה של בעיות הקשורות לנוזלי הדם והגוף (חמצת מטבולית metabolic acidosis).
בעיות כבד.

בעיות בעיניים (בייחוד אם אתה סובל מגלאוקומה).

בעיות גדיה.

אם אתה מבצע דיאטה קטוגנית (דיאטה דלת פחמימה ורבת שומנים).
אם אישה בגיל הפוריות. טופיתרים עלולים לפגוע בעובר כאשר ניטל במהלך ההריון. יש להשתמש באמצעי מניעה יעילים מאוד במהלך הטיפול עם טופיתרים ולפחות 4 שבועות מתום הטיפול בטופיתרים (ראי סעיף "הריון והנקה" למידע נוסף).

את בהריון. טופיתרים עלול לפגוע בעובר כשניטל במהלך ההריון. אם אחד מהמצבים מעלה רלוונטיים אליך, שוחח עם הרופא טרם השימוש בתרופה.

- אם אתה סובל מאפילפסיה, חשוב שלא תפסיק לקחת את התרופה ללא התייעצות תחילה עם הרופא.
- אין לקחת כל תרופה אחרת המכילה טופירנט, הניתנת לך כתחליף לתרופה זו, ללא התייעצות תחילה עם הרופא.
- ייתכן שבזמן השימוש בטופיתרים תאבד משקלך. יש להישקל באופן קבוע בזמן הטיפול עם טופיתרים. אם אתה מאבד משקל רב או ילד המטופל בטופיתרים אינו עולה מספיק במשקל, יש להוועץ ברופא. במספר קטן של חולים טטופלו בתרופות אנטי אפילפטיות כגון טופיתרינן, דווח על מחשבות אובדניות או התנהגות אובדנית. במקרה של הופעת מחשבות אובדניות יש לפנות לרופא מיד!
- טופיתרים עלול לגרום לתופעות לוואי עוריות חמורות. ספר לרופא מיד אם התפתחה פריחה ו/או שלפוחית בעור.

במקרים נדירים, טופיתרים עלול לגרום לרמות גבוהות של אמוניה בדם (נראה בדיקות דם)
העלול לגרום לנזק בתפקוד המוחי, בעיקר במתן משולב עם חומצה ולפרואית או סודיום ולפרואט. כיוון שייחכן שמדובר במצב חמור, יש לפנות לרופא אם מתרחשים הסימפטומים הבאים:

- קושי בחשיבה, זיכרון מידע או פתרון בעיות
- תחושה של פחוס עורנות/דריכות
- הרגשת ישנוניות וחוסר אנרגיה
- מנינונים וגבתיים של טופיתרים יכול עלות הסיכון לפתח סימפטומים אלו.

ילדים והנבגים:

תופעות הלוואי בילדים דומות באופן כללי לאלו במבוגרים, אולם תופעות הלוואי המיידיים בפרק "תופעות לוואי בילדים" עלולות להיות שכיחות יותר בילדים מאשר במבוגרים.

בדיקת ומעקב:

יש לבצע בדיקת היריון לפני תחילת הטיפול בטופיתרים.

איןטבאצבציות/המנובות בין תרופתינות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.
תרופות אחרות ולתרופות אחרות יכולה להיות השפעה על זה.
הרופא ישקול אם יש צורך להאמין את מינון הטופיתרים או תרופות אחרות שלך.

במייוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם את לוקח:

- תרופות אחרות המשפיעות או מפחיתות את רמת החשיבה שלך, הריכוז או קואורדינציית השרירים (למשל: מדכאי מערכת העצבים המרכזית כגון מרפי שרירים ותרופות להרגעה ושינה).

אמצעי מניעה הרומנוליים. טופיתרים עלול לפגוע בעילות של אמצעי מניעה הרומנוליים. יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף מסוג אמצעי שוחחי עם רופאך על אמצעי מניעת ההריון המתאים ביותר לשימוש בזמן הטיפול בטופיתרים. ספרי לרופא אם את חווה שינויים במחזור החודשי בזמן השימוש באמצעי מניעה הרומנוליים וטופיתרים. דימום לא סדיר עלול להתרחש. במקרה כזה – יש להמשיך ליטול את אמצעי המניעה הרומנוליים ולעדכן את הרופא.

הכן רשימה של כל התרופות שאת נוטל והראה רשימה זו לרופא או לרוקח בכל פעם לפני התחלת טליות תרופה חדשה.

יש לדון עם הרופא או הרוקח אם לגבי נטילת התרופות הבאות:

תרופות אנטי אפילפטיות אחרות.

ריספרידין (לטיפול בסכיזופרניה).

ליתיום (לטיפול באידיה דיפרסיה).

הידרוכלורוצ'ביאז, פרופרנולול, דיילטיאזם (לטיפול בבעיות לב והודרת לחץ דם).

מספופרמי, פיגוליתזון, גליבוריד, גליבג'נלמיד (לטיפול בסוכרת).

אמיטרפטילין, ונלפסקין (לטיפול בדיכאון).

פלורנדין (למניעת מיגרנות וטיפול בורג'ס).

הפיקוקס פרופרטום (St. John's wort). תרופה צמחית לטיפול בדיכאון.

וורפרין (לדילול דם).

שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול טופיתרים עם אוכל או ללא אוכל.

יש להקפיד על שתיית נוזלים מרובה במשך הטיפול (כדי להקטין את הסיכון ליצירת אבנים בכליות).

שימוש בתרופה וריצית אלקהול:

יש להימנע משתיית אלקהול בתקופת הטיפול עם התרופה.

היריון והנקה:

עצות חשובות לנשים בגיל הפוריות

טופיתרים עלולים להזיק לרופא. אם את בגיל הפוריות, שוחחי עם הרופא על אופציות טיפוליות חלופיות. דאגי להגיע למעקב עם הרופא לפחות פעם בשנה לשוחח על הטיפול והסיכונים.

מניעת מיגרנה

אין להשתמש בטופיתרים לטיפול במיגרנה אם את בהריון.

אין להשתמש בטופיתרים למניעת מיגרנה אם את אישה בגיל הפוריות, אלא אם את משתמשת באמצעי מניעה יעילים במיוחד. יש לבצע בדיקת היריון לפני תחילת הטיפול בטופיתרים עבור אישה בגיל הפוריות.

טיפול באפילפסיה

לטיפול באפילפסיה, אין להשתמש בטופיתרים אם את בהריון, אלא אם אין חלופה טיפולית מספקת לשליטה בכפרוסים.
אין חלופה טיפולית מספקת לטיפול באפילפסיה, אין להשתמש בטופיתרים אם את אישה בגיל הפוריות, אלא אם את משתמשת באמצעי מניעה יעילים במיוחד. יוצא הדופן היחיד הוא אם טופיתריה הינה התופעה הטיפולית היחידה לשליטה מספקת בכפרוסים, ואת מתכנתת להיכנס להריון. עליך לשוחח עם הרופא ולוודא שקבלת מידע לגבי הסיכונים בשימוש בטופיתרים בהריון, ועל הסיכונים בכפרוסים במהלך ההריון. העלולים לסכן את העובר.

לפני תחילת הטיפול עם טופיתרים יש לבצע בדיקת היריון עבור נשים בגיל הפוריות.

השימוש בתרופה יכול לגרום לסחרחורת, עייפות ובעיות ראייה. אל תנהג או תשתמש בממונות מסוכנות לפני שתשוחח תחילה עם הרופא.
שעבורה ניתנה)

יש סכנה לפגיעה בעובר אם נעשה שימוש בטופיתרים במהלך ההריון. אם את נוטלת טופיתרים במהלך ההריון, יש סיכון גבוה למומים בעובר.
בנשים הנוטלות טופירנט, 4-9 ילדים מכל 100 ייוולדו עם מומים. זה בהשוואה ל-1-3 ילדים מתוך 100 נולדים לאישה שאינה סובלת מאפילפסיה ואינה נוטלת טופירנט אנטי אפילפטיות. בעיקר נצפו שילדים שסועה (פיצול בשפה העליונה) וחך שסוע (פיצול בגג הפה). ילודים זכרים עלולים לסבול מעיוות של הפין (hypospadias). המומים הנ"ל עשויים להתפתח בשלב מוקדם של ההריון.
לתינוט טרם גילוי ההריון. אם את נוטלת טופירנט במהלך ההריון, יש סיכוי של 3-5% להפרעות על הפסקטורום האופטיטי, מוגבליות שכליות, או הפרעות קשב וריכוז (ADHD). ביחס לילדים שנולדו לאישה עם אפילפסיה שאינה נוטלת תרופות אנטי אפילפטיות.

בנטיילט טופיתרים במהלך ההריון, התינוק עשוי להיוולד קטן ובעל משקל נמוך מצפוי.
באחד המחקרים, 18% מהילדים לאימהות נוטלות טופירנט שומלך ההריון, היו קטנים ושקלו פחות מצפוי בלידה, בעוד ש- 5% מהילדים שנולדו לאימהות ללא אפילפסיה ושומך נוטלות תרופות אנטי אפילפטיות, נולדו קטנים ובעלי משקל נמוך מצפוי בלידה.

התינוצי עם הרופא אם יש לך שאלות לגבי סיכון זה במהלך ההריון. ייתכן שקיימות תרופות אחרות לטיפול במצבך בעלות סיכון נמוך יותר למומים בלידה.

הצורך בשימוש באמצעי מניעה עבור נשים בגיל הפוריות

אם את אישה בגיל הפוריות, שוחחי עם הרופא על טפילים חלופיים אחרים במקום טופיתרים. אם התקבלה החלטה להשתמש בטופיתרים, יש להשתמש באמצעי מניעה יעילים במיוחד במהלך הטיפול ו-4 שבועות לאחר תום הטיפול.

יש להשתמש באחד מאמצעי המניעה היעילים במיוחד (כגון התקן יחד רחמי) או שני אמצעים מניעה משלימים, כגון גלולות למניעת היריון יחד עם אמצעי מניעה מסוג אמצעי מניעה חוצצים (כגון קונדום, פסארי (כובעון נרתיקי) או דיאפרגמה). התינוצי עם הרופא איזה אמצעי מניעה מתאים ביותר עבורך.

אם את נוטלת אמצעי מניעה הרומנוליים, ישנה אפשרות של ירידה בסיטיל באפילפסיה או מיגרנה. יש להקול חלופות טיפוליות בלילות ונשים בגיל הפוריות. בקרי אצל הרופא כדי לבדוק את הטיפול שלך לפחות פעם בשנה.

אם אתה סובלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-החולים, והבא את אריזת התרופה איתך. אל תגרסם להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אם נטלת מנת יתר, ייתכן שתחושי שינוי, עייף או פחות ערני, תחוזה חוסר קואורדינציה, קוצש בדיבור או קושי בריכוז, ראייה כפולה או כיולת לא ממוסגשת, תחושת דיכאון או עצבנות, סחרחורת עקב לחץ דם נמוך, כאב בפרוסים.

מינון יתר יכול להתרחש כאשר אתה נוטל תרופות אחרות יחד עם טופיתרים.

אם שכתב ליטול תרופה זו

יש ליהטל מנה מיד כשזכרת, אך אם זכרת בסמוך למועד נטילת המנה הבאה, דלג על לג המנה ששכחת והמשך כרגיל. בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אם שכתב שתי מנות או יותר, צור קשר עם הרופא.

יש להשתמש בזהירות כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק טיפול ללא התייעצות עם הרופא משום שהסמנים עלולים לחזור. אם הרופא יחליט על הפסקת טיפול, המינון יוחפס באופן הדרגתי במשך מספר ימים.
אין ליטול תרופות בחושר! בדוק תהויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

ככל כנול תרופה, השימוש בטופיתרים עלול לגרום לתופעות לוואי: בחלק מהמשתמשים, אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מרף אחת מהן.

פנה לרופא באופן מיידי אם אתה מבחין באחת התופעות הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד - very common - תופעות שמופיעות ביותר משתמש אחד מעשרה:

- דיכאון (חדש או מחזורי)
- תופעות לוואי שכיחות - common - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:**

- פרכוסים
- חרדה, עצבנות, שינויים במצב הרחוח, בלבול, חוסר התמצאות
- הפרעות בריכוז, כאב בחשיבה, איבוד זיכרון, בעיות זיכרון (חדש, שינוי פתאומי או חמורה)
- אבנים בכליות, השתנה לתכופה או כאובת
- תופעות לוואי שכיחות - uncommon - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:**
- פרכוסים
- חרדה, עצבנות, שינויים במצב הרחוח, בלבול, חוסר התמצאות
- הפרעות בריכוז, כאב בחשיבה, איבוד זיכרון, בעיות זיכרון (חדש, שינוי פתאומי או חמורה)
- אבנים בכליות, השתנה לתכופה או כאובת
- תופעות לוואי שכיחות - uncommon - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000:**
- עלייה ברמת התומצה בדם (עלול לגרום לבעיות בנשימה כולל קוצר נשימה, איבוד תיאבון, בחילה, הקאות, עייפות מוגזמת וזפיקות לב
- מיתרות או לא מאוזנות)
- ירידה או הפסקת ההזעה (בייחוד בילדים צעירים החשופים לטמפרטורות גבוהות)

הניגוד ושימוש במכונות:

השימוש בתרופה יכול לגרום לסחרחורת, עייפות ובעיות ראייה. אל תנהג או תשתמש בממונות מסוכנות לפני שתשוחח תחילה עם הרופא.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

טבליות טופיתרים מכילות לקטוז. אם אתה סובל מחוסר סבילות לסוכרים מסוימים, התייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה.

טבליות טופיתרים מכילות פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבליה, שזה למעשה נחשב "נטול נתרן".

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

הרופא ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מינון בריאות נורמלי נמוך של טופיתרים יועיל בהדרגה את המינון עד למציאת המינון המתאים עבורך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לבלוע את טבליות טופיתרים בשלמותן.

בהיעדר קו חציה, אסור לחצות את הטבליה. אין מידע בנוגע לתישה/ליעה של הטבליה. טבליה כזו תחושה או לעוסה עלולה להשאיר טעם מר.

ניתן ליטול טופיתרים לפני, עם או אחרי האוכל.

יש להקפיד על שתייה מרובה במהלך הטיפול כדי להימנע מהיזוצרות אבנים בכליות בזמן הטיפול.

ילדות ונשים בגיל הפוריות

יש להתחיל את הטיפול בטופיתרים ולהיות במעקב של רופא מומחה בטיפול באפילפסיה או מיגרנה. יש להקול חלופות טיפוליות בלילות ונשים בגיל הפוריות. בקרי אצל הרופא כדי לבדוק את הטיפול שלך לפחות פעם בשנה.

אם אתה סובלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-החולים, והבא את אריזת התרופה איתך. אל תגרסם להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אם נטלת מנת יתר, ייתכן שתחושי שינוי, עייף או פחות ערני, תחוזה חוסר קואורדינציה, קוצש בדיבור או קושי בריכוז, ראייה כפולה או כיולת לא ממוסגשת, תחושת דיכאון או עצבנות, סחרחורת עקב לחץ דם נמוך, כאב בפרוסים.

מינון יתר יכול להתרחש כאשר אתה נוטל תרופות אחרות יחד עם טופיתרים.

אם שכתב ליטול תרופה זו

אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-החולים, והבא את אריזת התרופה איתך. אל תגרסם להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אם נטלת מנת יתר, ייתכן שתחושי שינוי, עייף או פחות ערני, תחוזה חוסר קואורדינציה, קוצש בדיבור או קושי בריכוז, ראייה כפולה או כיולת לא ממוסגשת, תחושת דיכאון או עצבנות, סחרחורת עקב לחץ דם נמוך, כאב בפרוסים.

מינון יתר יכול להתרחש כאשר אתה נוטל תרופות אחרות יחד עם טופיתרים.

אם שכתב ליטול תרופה זו

יש ליהטל מנה מיד כשזכרת, אך אם זכרת בסמוך למועד נטילת המנה הבאה, דלג על לג המנה ששכחת והמשך כרגיל. בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אם שכתב שתי מנות או יותר, צור קשר עם הרופא.

יש להשתמש בזהירות כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק טיפול ללא התייעצות עם הרופא משום שהסמנים עלולים לחזור. אם הרופא יחליט על הפסקת טיפול, המינון יוחפס באופן הדרגתי במשך מספר ימים.
אין ליטול תרופות בחושר! בדוק תהויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

ככל כנול תרופה, השימוש בטופיתרים עלול לגרום לתופעות לוואי: בחלק מהמשתמשים, אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מרף אחת מהן.

פנה לרופא באופן מיידי אם אתה מבחין באחת התופעות הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד - very common - תופעות שמופיעות ביותר משתמש אחד מעשרה:

- דיכאון (חדש או מחזורי)
- תופעות לוואי שכיחות - common - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:**

- פרכוסים
- חרדה, עצבנות, שינויים במצב הרחוח, בלבול, חוסר התמצאות
- הפרעות בריכוז, כאב בחשיבה, איבוד זיכרון, בעיות זיכרון (חדש, שינוי פתאומי או חמורה)
- אבנים בכליות, השתנה לתכופה או כאובת
- תופעות לוואי שכיחות - uncommon - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000:**
- עלייה ברמת התומצה בדם (עלול לגרום לבעיות בנשימה כולל קוצר נשימה, איבוד תיאבון, בחילה, הקאות, עייפות מוגזמת וזפיקות לב
- מיתרות או לא מאוזנות)
- ירידה או הפסקת ההזעה (בייחוד בילדים צעירים החשופים לטמפרטורות גבוהות)

- מצב רוח מרומם באופן לא רגיל
- אובדן הכרה
- עיוורון בעין אחת,

• מחשבות וליטות לפגיעה עצמית חמורה

• איבוד חושי משהד ראייה

תופעות לוואי נדירות - rare - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000:

- גלאוקומה (הסימה של נוזלים בעין הגורמת לעלייה בלחץ תוך עיני, כאב או ירידה בראייה)
- קושי בחשיבה, זיכרון מידע או פתרון בעיות, חוסר ערנות/דריכות, הרגשה מאוד ישנונית וחוסר אנרגיה – הסימפטומים הנ"ל עלולים להיות סימן לרמת אמוניה גבוהה בדם (היפראמוניה) העלולה לגרום לשינוי בתפקוד המוחי (אנצפלופתיה היפראמונית)

- תגובות עוריות חמורות, כגון תסמונת טטיבסד לגונסו וטוקסיק אידימטל נקרויליסי (Toxic Epidermal Necrolysis) הנ"ל כולים להופיע בפרחה עם או ללא שלפוחית, גרזני בעור, צעעים ונפיחות באזור הפה, הרגשה עם חף העיניים וסובי איברי המין. הפריחה העורית עלולה להתפתח לנזק עורי מפושט (התקלפות שכבת העור החיצונית ורוקמות ריריות שטחיות) ובעלת השלכות מסכנות חיים.

תופעות לוואי נוספות, ששכיחותן אינה ידועה (טרם נקבעה):

דלקת עיבה בעין (אובאיטיס) המלווה בתסמינים כגון אדמומיות בעין, כאב