

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إكسيلون لصقة 5 إكسيلون لصقة 10 إكسيلون لصقة 15

لصقة للإستعمال على الجلد (لصقة جلدية)

المادة الفعالة:

تحتوي كل لصقة على:

إكسيلون لصقة 5: لصقة بحجم 5 سم² للإعطاء عبر الجلد تحتوي على 9 ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة تحرير الدواء هي: 4.6 ملغ خلال 24 ساعة.

إكسيلون لصقة 10: لصقة بحجم 10 سم² للإعطاء عبر الجلد تحتوي على 18 ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة تحرير الدواء هي: 9.5 ملغ خلال 24 ساعة.

إكسيلون لصقة 15: لصقة بحجم 15 سم² للإعطاء عبر الجلد تحتوي على 27 ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة تحرير الدواء هي: 13.3 ملغ خلال 24 ساعة.

المواد غير الفعالة:

أنظر الفقرة 6 'معلومات إضافية'.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بد لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إكسيلون لصقة 5 وإكسيلون لصقة 10: لعلاج الخرف (dementia) - مشاكل الذاكرة) الخفيف حتى المتوسط من نوع ألزهايمر.

إكسيلون لصقة 15: لعلاج الخرف (dementia) - مشاكل الذاكرة) من نوع ألزهايمر. تم إثبات النجاعة لدى مرضى يعانون من مرض ألزهايمر خفيف، متوسط وشديد.

الفصيلة العلاجية:

من مثبطات الإنزيم كولين إستيراز (anticholinesterases)

ينتمي ريفاستيجمين لمجموعة المواد المسماة مثبطات كولين إستيراز. لدى متعالجين لديهم خرف (dementia) ناجم عن مرض ألزهايمر، تموت خلايا عصبية معينة في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى نسب منخفضة للناقل العصبي (neurotransmitter) أستيتيل كولين (مادة تمكن الخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض). يعمل ريفاستيجمين عن طريق حجب الإنزيمات المفككة للأستيتيل كولين: أستيتيل كولين إستيراز و بوتيريل كولين إستيراز. من خلال حجب هذه الإنزيمات، يتيح إكسيلون إرتفاع نسب الأستيتيل كولين في الدماغ، ويساعد في تقليل أعراض مرض ألزهايمر. إكسيلون مخصص لعلاج المرضى الكبار الذين يعانون من خرف طفيف، متوسط وشديد، مرض متقدم (progressive) لإضطراب في الدماغ الذي يؤثر بالتدرج على الذاكرة، القدرة الفكرية والسلوك.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة ريفاستيجمين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، المفصلة في الفقرة 6 'معلومات إضافية'
- حدث لديك ذات مرة رد فعل تحسسي لدواء من نوع مشابه (مشتقات الكربامات - carbamate derivatives)
- حدث لديك رد فعل جلدي الذي ينتشر بما يتجاوز حجم اللصقة، إذا حدث رد فعل موضعي قوي (مثل حويصلات، زيادة إلتهاب الجلد، إنتفاخ) وإذا لم يتحسن هذا الوضع خلال 48 ساعة بعد إزالة اللصقة
- إذا كانت هذه الحالات تنطبق عليك، يجب إبلاغ الطبيب ولا يجوز إستعمال إكسيلون لصقة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إكسيلون لصقة، إحك للطبيب إذا:

- وُجدت لديك، أو كانت لديك ذات مرة، حالة قلبية، مثل نبض غير منتظم أو بطيء، إطالة مقطع QTc، سابقة عائلية لإطالة مقطع QTc، إضطراب في النظم من نوع تسرع القلب البطيني (torsades de pointes - ضفيرة التواءات)، أو لديك إنخفاض في نسبة البوتاسيوم أو المغنزيوم في الدم
- وُجدت لديك، أو كانت لديك ذات مرة، قرحة معدية نشطة
- وُجدت لديك، أو كانت لديك ذات مرة، صعوبات في التبول
- وُجدت لديك، أو كانت لديك ذات مرة، إختلاجات

- وُجد لديك، أو كان لديك ذات مرة، ربو أو مرض تنفسي خطير
 - كنت تعاني من إرتجاع
 - كان وزن جسمك منخفضاً
 - وُجدت لديك ردود فعل للجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤ وإسهال. قد تصاب بالتجفاف (جراء فقدان سوائل أكبر مما ينبغي) وذلك إذا إستمر التقيؤ أو الإسهال
 - وُجد لديك خلل في الأداء الوظيفي للكبد
- في هذه الحالات، من الجائز أن يراقب طبيبك وضعك بصورة حثيثة أكثر أثناء العلاج بالدواء.

في حالة عدم إستعمالك إكسيلون لصقة لفترة تزيد عن ثلاثة أيام، فلا يجوز لصق اللصقة التالية بدون إستشارة الطبيب المعالج.

الأطفال والمراهقون

إكسيلون لصقة غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

- قد يعيق إكسيلون الأدوية المضادة للفعل الكوليني حيث أن بعضها هي أدوية تستعمل للتخفيف من تشنجات أو تقلصات المعدة (مثل ديسيكولمين)، لعلاج مرض الباركنسون (مثل أمانتادين) أو لمنع مرض دوار السفر (مثل ديفينهيدرامين، سكوبولامين أو ميكليزين)
- لا يجوز إستعمال إكسيلون لصقة في نفس الوقت مع ميتوكلوبراميد (دواء يستعمل لتخفيف أو لمنع الغثيان والتقيؤات). إن إستعمال هذين الدوائين سوية من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل، مثل تصلب الأطراف وإرتجاع اليمين
- إذا كنت مقدماً على إجتيان عملية جراحية خلال فترة العلاج بـ إكسيلون لصقة، فيجب إبلاغ طبيبك عن إستعمال هذا الدواء، حيث أن إكسيلون لصقة من شأنه أن يزيد من تأثير مريخيات عضلية معينة خلال التخدير

- يجب توخي الحذر عند إستعمال إكسيلون لصقة سوية مع حاجبات بيتا (أدوية مثل أتينيولول المستعملة لعلاج فرط ضغط الدم، الذبحة الصدرية وحالات قلبية أخرى). إن إستعمال هذين الدوائين سوية من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل، مثل تباطؤ النبض (نبض بطيء) الذي قد يؤدي إلى حدوث إغماء أو فقدان الوعي
- يجب توخي الحذر عند إستعمال إكسيلون سوية مع أدوية أخرى التي يمكن أن تؤثر على نظم قلبك أو على النظام الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT)

إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان إستعمال إكسيلون لصقة مع الطعام والشراب.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

بالإمكان إستعمال إكسيلون لصقة مع الكحول.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

- إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل إستعمال الدواء
- لا تتوفر معلومات بخصوص إستعمال إكسيلون لدى النساء الحوامل. إذا كنت حاملاً، يجب دراسة فوائد إكسيلون لصقة مقابل التأثيرات المحتملة على الجنين. لا يجوز إستعمال إكسيلون لصقة خلال فترة الحمل إلا إذا كان ذلك ضرورياً بشكل واضح
- لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بـ إكسيلون لصقة. من غير المعروف فيما إذا كان إكسيلون يُطرح في حليب الأم

السياقة وإستعمال الماكينات

سوف يقدم لك طبيبك المشورة فيما إذا كان مرضك يسمح لك بقيادة السيارة وإستعمال الماكينات بشكل آمن. من شأن إكسيلون لصقة أن يؤدي إلى إغماء أو إرتباك شديد. إذا كنت تشعر بإغماء أو إرتباك، فلا يجوز قيادة السيارة، إستعمال الماكينات أو إجراء أي نشاط يتطلب اليقظة.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

هام:

- يجب نزع اللصقة السابقة قبل لصق لصقة واحدة جديدة
- فقط لصقة واحدة في اليوم
- لا يجوز قص اللصقة إلى قطع
- يجب الضغط على اللصقة بقوة لمدة 30 ثانية على الأقل بواسطة راحة اليد
- للإستعمال الخارجي فقط

كيفية بدء العلاج؟

سوف يشير لك طبيبك أية لصقة إكسيلون الأكثر ملاءمة لك.

- يبدأ العلاج عادة بإستعمال لصقة إكسيلون 5 (4.6 ملغ في الـ 24 ساعة)

- المقدار الدوائي اليومي الإعتيادي الموصى به هو لصقة إكسيلون 10 (9.5 ملغ في الـ 24 ساعة). إذا كان التحمل جيداً، فمن شأن الطبيب أن يرفع المقدار الدوائي إلى لصقة إكسيلون 15 (13.3 ملغ في الـ 24 ساعة)
 - يجب إستعمال لصقة واحدة فقط في كل مرة وتبديل اللصقة بلصقة جديدة بعد 24 ساعة
- من الجائز أن يلائم لك الطبيب المقدار الدوائي أثناء العلاج ليتناسب مع إحتياجاتك الشخصية.


لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

في حالة عدم إستعمالك إكسيلون لصقة لفترة تزيد عن ثلاثة أيام، فلا يجوز لصق اللصقة التالية قبل إستشارة طبيبك. بالإمكان مواصلة العلاج بلصقة من نفس المقدار الدوائي وذلك إذا لم يتم التوقف عن العلاج لأكثر من ثلاثة أيام. وإلا، فسوف يبدأ الطبيب العلاج من جديد بلصقة إكسيلون 5 (4.6 ملغ في الـ 24 ساعة).

أين يجب لصق إكسيلون لصقة؟

- قبل لصق لصقة يجب التأكد من أن الجلد نظيف، جاف وبدون شعر، خالٍ من أي مسحوق، زيت، كريم ترطيب أو مستحلب التي يمكنها أن تؤثر على إلتصاق اللصقة بالجلد بشكل سليم، بدون تشققات، طفح و/أو تهيجات
- يجب نزع اللصقة الحالية بحذر قبل لصق لصقة جديدة. إذا ألصقت على جسمك عدة لصقات، فإن جسمك قد يكون معرضاً لكمية فائضة من الدواء، حالة التي قد تكون خطيرة
- يجب لصق لصقة واحدة فقط في اليوم، فقط في إحدى الأماكن الممكنة الظاهرة في الرسوم أدناه:
 - الجزء العلوي من الذراع الأيسر أو الجزء العلوي من الذراع الأيمن
 - الجانب العلوي الأيسر من الصدر أو الجانب العلوي الأيمن من الصدر (يجب الإمتناع عن اللصق على الثدي)
 - الجانب العلوي الأيسر من الظهر أو الجانب العلوي الأيمن من الظهر
 - الجانب الأيسر من أسفل الظهر، أو الجانب الأيمن من أسفل الظهر

كل 24 ساعة، يجب نزع اللصقة السابقة قبل لصق لصقة جديدة واحدة على إحدى الأماكن الممكنة التالية فقط:




عندما تقوم بتبديل اللصقة، عليك نزع لصقة اليوم السابق قبل لصق اللصقة الجديدة، في كل مرة في مكان آخر على الجلد (مثلاً على الجانب الأيمن للجسم في اليوم الأول وعلى الجانب الأيسر في اليوم التالي، في الجزء العلوي من الجسم في اليوم الأول وفي الجزء السفلي من الجسم في اليوم التالي). لا يجوز لصق لصقة جديدة في نفس المكان بالضبط مرتين خلال 14 يوماً.

كيف يجب لصق إكسيلون لصقة؟

إن اللصقة دقيقة، مسدودة، مصنوعة من البلاستيك وتلتصق على الجلد. كل لصقة معبأة بكيس مغلق يحميها حتى تكون جاهزاً للصقها. لا يجوز فتح الكيس أو إخراج اللصقة إلا فقط قبل إصاقها فعلاً.


يجب نزع اللصقة الحالية بحذر قبل لصق لصقة جديدة.




متعالجون يبدأون العلاج للمرة الأولى ومتعالجون يبدأون العلاج من جديد بعد التوقف عن العلاج، الرجاء البدء من الرسم الثاني.

- كل لصقة معبأة بكيس مغلق الذي يحميها. يجب فتح الكيس فقط عندما تكون جاهزاً لإستعمال اللصقة.

يجب قص الكيس بواسطة مقص على طول الخط المتقطع وإخراج اللصقة من الكيس.






- هنالك طبقة واقية تغطي الجانب اللاصق للصقة. إنزع جانب واحد من الطبقة الواقية ولا تلمس القسم اللاصق للصقة بأصابعك.



- ضع القسم اللاصق للصقة على المنطقة العليا أو السفلى من الظهر، على الجزء العلوي من الذراع أو على الصدر وأنزع القسم الثاني للطبقة الواقية.



إذا كان الأمر يساعدك، يمكنك مثلاً كتابة اليوم من الأسبوع على اللصقة بواسطة قلم حبر جاف دقيق.

يجب إبقاء اللصقة في المكان باستمرار إلى حين موعد تبديلها بلصقة جديدة. من الجائز أن ترغب في تجربة أماكن مختلفة للثق اللصقة الجديدة من أجل إيجاد الأماكن الأكثر راحة والأماكن التي لا تحتك فيها الثياب باللصقة.

كيف يجب نزع إكسيلون لصقة؟

يجب السحب بلطف وببطء طرف واحد من اللصقة من أجل نزعها عن الجلد. في حال بقاء آثار مادة لاصقة على الجلد، قم بتطيب المنطقة بلطف بماء دافئ وصابون لطيف أو إستعمل زيت الأطفال لإزالتها. لا يجوز إستعمال الكحول أو سوائل أخرى مذيبة (مزيل طلاء الأظافر أو مذيبات أخرى).

يجب غسل اليدين بالصابون والماء بعد نزع اللصقة. في حالة التماس مع العينين أو إذا ظهر إحمرار في العينين بعد العلاج باللصقة، يجب شطف العينين فوراً بالكثير من الماء والتوجه لتلقي مساعدة طبية إذا لم تجد حلاً لهذه الأعراض.

هل بالإمكان إستعمال اللصقة أثناء الإغتسال، السباحة أو أثناء المكوث في الشمس؟

- إن الإغتسال في حوض الإستحمام، السباحة أو الحمام من غير المفترض أن تؤثر على اللصقة. يجب مراقبة اللصقة حتى لا ترتخي أثناء ممارسة هذه النشاطات.
- لا يجوز تعريض اللصقة لأي مصدر حرارة خارجي (مثل ضوء الشمس بكثرة، حمام بخار (ساونا)، حجرة التسفع) لفترات زمنية طويلة.

ما الذي يجب فعله في حالة سقوط اللصقة؟

إذا سقطت اللصقة يجب لصق لصقة جديدة لما تبقى من اليوم، وبعد ذلك يجب تبديلها في اليوم التالي في الموعد المحدد.

متى ولأي فترة زمنية يجب إستعمال إكسيلون لصقة؟

- من أجل تحقيق الفائدة من العلاج عليك إستعمال لصقة جديدة كل يوم، يستحسن تبديل لصقة في نفس الساعة من كل يوم.
- يجب إستعمال لصقة واحدة فقط في كل مرة وتبديلها بلصقة جديدة بعد 24 ساعة.

إذا إستعملت بالخطأ لصقات إكسيلون أكثر من المطلوب

إذا إستعملت بالخطأ أكثر من لصقة واحدة، فيجب نزع كل اللصقات عن جلدك وبعد ذلك إبلاغ الطبيب المعالج بأنك إستعملت بالخطأ أكثر من إكسيلون لصقة واحدة. من الجائز أن تحتاج لمراقبة طبية. لقد قاسى بعض الأشخاص الذين إستعملوا بالخطأ إكسيلون أكثر مما ينبغي من غثيان، تقيؤ، إسهال، ضغط دم مرتفع وهلوسة. نبض بطيء وإغماء قد يحدثان أيضاً.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء أو قام بلصق لصقة على نفسه، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال إكسيلون لصقة

إذا إكتشفت أنك نسيت إستعمال إكسيلون لصقة، فعليك لصق لصقة جديدة فوراً.

اللصقة التالية يمكنك لصقها في الموعد الإعتيادي في اليوم التالي. لا يجوز إستعمال لصقتين معاً من أجل التعويض عن تلك المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن إستعمال إكسيلون لصقة

إحك للطبيب أو للصيدلي إذا توقفت عن إستعمال اللصقة.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إكسيلون لصقة قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندشهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

شيوخ الأعراض الجانبية يكون أكبر عند بدء العلاج أو عند رفع المقدار الدوائي للدواء. في أغلب الحالات تختفي الأعراض الجانبية بالتدرج، نظراً لتعود الجسم على الدواء.

إنزع اللصقة وبلغ الطبيب المعالج فوراً، إذا شعرت بواحد أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية التي قد تصبح خطيرة:

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

- فقدان الشهية للطعام
- الشعور بدوار
- الشعور بهيجان
- عدم السيطرة على التبول (عدم القدرة على التبول كما ينبغي)
- التهاب في المسالك البولية
- قلق
- إكتئاب
- إرتباك
- صداع
- إغماء
- مشاكل في البطن مثل غثيان أو تقيؤ، إسهال
- حرقان
- ألم في البطن
- طفح
- رد فعل تحسسي في مكان لصق اللصقة، مثل حويصلات أو إتهاب الجلد
- الشعور بإرهاق أو ضعف
- تناقص في الوزن
- سخونة

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000:

- مشاكل في ضربات قلبك، مثل تباطؤ ضربات القلب
- قرحة في المعدة
- تجفاف (فقدان سوائل أكثر مما ينبغي)
- فرط نشاط (مستوى مرتفع من النشاط، قلة راحة)
- عدوانية (Aggression)
- أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000:
- سقوطات

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

- تصلب الذراعين أو الرجلين وإرتجاج اليدين
- أعراض جانبية شيوعتها غير معروف** (أعراض شيوعتها لم يحدد بعد):
- تفاقم علامات مرض الباركنيسون (رعاش) - مثل إرتجاج، تصلب وتخبط أثناء المشي
- إتهاب البنكرياس - العلامات تشمل ألم شديد في أعلى البطن، يتوافق غالباً بغثيان أو تقيؤات
- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة
- إرتفاع ضغط الدم
- نوبات إختلاج
- إضطرابات في الكبد (إصفرار الجلد، إصفرار بياض العينين، بول داكن شاذ أو غثيان، تقيؤات، إرهاق وفقدان الشهية للطعام مجهولة السبب)
- تغيرات في نتائج الفحوص التي تدل على وظائف الكبد
- الشعور بعدم هدوء
- كوابيس ليلية
- متلازمة بيزا (حالة تشمل إنقباض عضلي لا إرادي مع إلتواء شاذ للجسم والرأس إلى جانب واحد)
- رؤية أشياء ليست موجودة (هلوسة)
- إرتجاج
- ميل للنوم
- طفح، حكة
- إحمرار الجلد
- حويصلات

- رؤية أشياء ليست موجودة (هلوسة)
- إرتجاج
- ميل للنوم
- طفح، حكة
- إحمرار الجلد
- حويصلات

إنزع اللصقة وتوجه إلى طبيبك فوراً إذا شعرت بإحدى الأعراض الجانبية أعلاه.

أعراض جانبية إضافية بُلغ عنها بخصوص إكسيلون كبسولات أو إكسيلون محلول وقد تظهر عند إستعمال اللصقات:

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

فأض من اللعاب، الشعور بعدم هدوء، شعور عام سيء، إرتجاج، فرط تعرق.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000:

عدم إنتظام نظم القلب (مثل نظم قلب سريع)، صعوبات في النوم، سقوطات عرضية.

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض التي تظهر لدى10-1 مستعملين من بين 10,000:

نوبات إختلاج، قرحة في الأمعاء، ألم في الصدر الذي قد ينجم عن تشنج في القلب.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

إرتفاع ضغط الدم، إتهاب البنكرياس - العلامات تشمل ألم شديد في أعلى البطن، غالباً يترافق بغثيان أو تقيؤات، نزف في الجهاز الهضمي - يظهر على شكل دم في البراز أو في القيء، رؤية أشياء غير موجودة (هلوسة). بعض المتعالجين الذين عانوا من تقيؤات شديدة عانوا من تمزق في أنبوب المريء الذي يربط بين الفم والمعدة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، او عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة نوفارتيس بواسطة عنوان البريد الإلكتروني التالي: safetydesk.israel@novartis.com.

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية
- إحفظ اللصقة داخل الكيس إلى حين موعد إستعمالها
- لا يجوز إستعمال اللصقة إذا كانت معطوبة أو إذا بدت عليها علامات ضرر
- بعد نزع اللصقة، قم بطيها لنصفين بحيث تكون الجوانب اللاصقة موجهة نحو الداخل، يجب ضغط الجوانب على بعضها وسدها بإحكام. أعد اللصقة المستعملة إلى الكيس الخاص بها وقم برميها بحيث لا يكون بإمكان الأطفال التعامل معها. لا يجوز لمس العينين بواسطة أصابعك، يجب غسل اليدين بالصابون والماء بعد نزع اللصقة. لا يجوز إلقاء الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمُركب الفعال أيضاً على:

acrylic pressure-sensitive adhesive; silicone pressure-sensitive adhesive; poly (butylmethacrylate, methylmethacrylate); silicone oil 12,500 cSt, dimethicone; tocopherol (all-rac-a), vitamin E

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تشمل العلبة أكياس، في كل كيس لصقة إكسيلون واحدة.

اللصقة هي لصقة رقيقة للجلد، مصنوعة من ثلاث طبقات.

الجزء الخارجي هو بلون بيج، وعليه علامات:

إكسيلون لصقة 5: **AMCX**

إكسيلون لصقة 10: **BHDI**

إكسيلون لصقة 15: **CNFU**

أحجام العلبة:

إكسيلون لصقة 5: إكسيلون لصقة 10: 3، 7، 30، 60 لصقة.

إكسيلون لصقة 15: 7، 30 لصقة.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه:

نوفارتيس إسرائيل م.ض،، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم إعدادها في تموز 2025.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إكسيلون لصقة 5: 139 69 31674

إكسيلون لصقة 10: 139 70 31675

إكسيلون لصقة 15: 150 97 33884

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.