



File Name	FRUZAQLA-PIL-ARB-D10		
Product	FRUZAQLA	Job No.	24001326
Language	Arabic	Artwork	Patient Leaflet
Document History			
Ver.	Date	Change description	By
14-Jul-25	13:09	Last save	

Our Expertise. Your Success.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

فروزا كلا 1 ملغ
فروزا كلا 5 ملغ

كبسولات صلبة

تحتوي كل كبسولة فروزا كلا 1 ملغ على 1 ملغ من المادة الفعالة فروكوينتينيب، .fruquintinib
تحتوي كل كبسولة فروزا كلا 5 ملغ على 5 ملغ من المادة الفعالة فروكوينتينيب، .fruquintinib

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 ("معلومات إضافية") في هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

- فروزا كلا معدّ لعلاج البالغين المصابين بالسرطان النقيلي في القولون أو في المستقيم (metastatic colorectal cancer, mCRC) والذين عولجوا في الماضي بـ:
- علاج كيميائي يعتمد على فلوروبريميدين، أو كساليپلاتين وإيرينوتيكان.
 - علاج بمثبطات VEGF (vascular endothelial growth factor)
 - علاج بمثبطات EGFR (epidermal growth factor receptor) إذا كان الورم من نوع RAS wild-type وأنتج لهم ذلك من الناحية الطبية.

المجموعة العلاجية: مواد مضادة للأورام، مثبطات تيروسين كيناز لمستقبل بطانة الأوعية الدموية (VEGFR).

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعّالة فروكوينتينيب أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء (مفصلة في البند 6).

تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بفروزا كلا، أخبر الطبيب عن حالتك الطبية وإذا:

- كان لديك ضغط دم مرتفع.
- كان لديك مشاكل نزفية.
- كانت لديك عدوى.
- كانت لديك مشاكل في الكبد أو الكلى.
- كنت تخطط لإجراء عملية جراحية أو أجريت عملية جراحية مؤخرًا. يجب عليك التوقف عن تناول فروزا كلا قبل أسبوعين على الأقل من العملية الجراحية المخططة لك. سيخبرك الطبيب متى يمكنك البدء بتناول فروزا كلا مرة أخرى بعد العملية الجراحية.
- عانيت مؤخرًا من خثرة دموية، سكتة دماغية أو نوبة قلبية.
- كانت لديك حساسية لتارترازين (FD&C Yellow رقم 5) أو لأصفر سانست (FD&C Yellow رقم 6).
- كنت حاملاً أو تخططين للحمل – انظري بند "الحمل، الإرضاع والخصوبة".
- كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع - انظري بند "الحمل، الإرضاع والخصوبة".
- كنت تتناول مميعات الدم (مضادات التخثر).

الأطفال والمراهقون

فروزاكلا مخصص للاستعمال لدى البالغين، من غير المعروف ما إذا كان فروزاكلا آمناً وناجماً للأطفال والمراهقين. لم يتم فحص نجاعة وسلامة الدواء لدى متلقي العلاج بعمر أقل من 18 عاماً.

فحوصات ومتابعة

يجب إجراء فحص حمل قبل بدء العلاج بـ فروزاكلا - انظري بند "الحمل، الإرضاع والخصوبة".

سيفحص الطبيب ضغط دمك قبل بدء العلاج بـ فروزاكلا، مرة واحدة كل أسبوع خلال أول شهر من العلاج، وبعد ذلك مرة واحدة في الشهر على الأقل أو في أحيان أكثر تقارباً إذا توجب ذلك خلال العلاج.

سيجري طبيبك فحوص دم قبل وأثناء العلاج بـ فروزاكلا لفحص مشاكل الكبد.

سيفحص طبيبك ما إذا كان هناك بروتين في البول قبل بدء العلاج بـ فروزاكلا وأثناءه.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من شأنك أن تتناول أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول مميعات الدم (مضادات التخثر).

من شأن الأدوية التي تسرع كثيراً إخلاء فروزاكلا من الجسم أن تقلل نجاعته (مثلاً ريفامبين). يجب تجنب الاستعمال في نفس الوقت.

إذا كان ذلك ممكناً، يجب تجنب الاستعمال مع أدوية قد تؤثر على نجاعة فروزاكلا (مثلاً: إيفافيرنز).

استعمال الدواء والغذاء

يُمكن تناول فروزاكلا مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

يمكن لـ فروزاكلا أن يلحق الضرر بالطفل الذي لم يولد بعد (الجنين). يُمنع الحمل أثناء العلاج بـ فروزاكلا. النساء اللواتي قد يصبحن حوامل:

- يجب إجراء فحص حمل قبل بدء العلاج بـ فروزاكلا.
- يجب استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة أسبوعين بعد آخر جرعة من فروزاكلا.
- أخبر طبيبك فوراً إذا أصبحت حاملاً أثناء العلاج بـ فروزاكلا.

الرجال الذين لديهم زوجات من شأنهن أن يحملن:

- استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة أسبوعين بعد آخر جرعة من فروزاكلا.
- أخبر طبيبك فوراً إذا أصبحت زوجتك حاملاً أثناء علاجك بـ فروزاكلا.

الإرضاع

من غير المعروف ما إذا كان فروزاكلا ينتقل إلى حليب الأم. يُمنع الإرضاع أثناء العلاج ولمدة أسبوعين بعد آخر جرعة من فروزاكلا.

الخصوبة

قد يؤدي فروزاكلا إلى مشاكل خصوبة لدى النساء، الأمر الذي قد يؤثر على قدرتك على إنجاب الأطفال. تحدثي مع طبيبك إذا كانت لديك مخاوف بشأن الخصوبة.

السياقة واستعمال الماكينات

لـ فروزاكلا تأثير قليل على قدرتك على السياقة واستعمال الماكينات. قد تشعر بأنك متعب بعد تناول فروزاكلا. لا تقم بالسياقة أو تستعمل أي معدات أو ماكينات إذا شعرت بأعراض تؤثر على قدرتك على التركيز ورد الفعل.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي فروزاكلا 1 ملغ على مواد صبغية قد تسبب ردود فعل تحسسية: تارترازين (FD&C Yellow رقم 5، tartrazine/E102) وأصفر سانست FCF (FD&C Yellow رقم 6، sunset yellow FCF/E110) انظر أيضاً بند "الأعراض الجانبية".

يحتوي فروزاكلا 5 ملغ على مادة صبغية قد تسبب ردود فعل تحسسية: ألور الأحمر AC (allura red AC- FD&C Red 40) - انظر أيضاً بند "الأعراض الجانبية".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

إذا كانت لديك أعراض جانبية معينة، فقد يغير طبيبك الجرعة لديك، إيقاف العلاج مؤقتًا، أو إيقاف العلاج بـ فروزاكلا بشكل دائم. لا تغير جرعتك أو تتوقف عن تناول فروزاكلا إلا إذا أخبرك الطبيب بذلك.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

الجرعة المعتادة، عادة، هي: فروزاكلا مرة واحدة يوميًا لمدة 21 يومًا (3 أسابيع) ثم استراحة لمدة 7 أيام (أسبوع واحد). هذه دورة علاجية واحدة.

كرر هذه الدورة طالما أوصاك الطبيب المعالج بالعلاج.

تناول فروزاكلا في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، مع الطعام أو بدونه، وابتلع الكبسولة كاملة. يُمنع مضغ، إذابة أو فتح الكبسولات، نظرًا لأن الآثار المحتملة لعدم تناول الكبسولة كاملة غير معروفة. إذا كانت لديك، أو كنت تعتقد بأن لديك، صعوبة في بلع الكبسولات كاملة، تحدث مع طبيبك قبل بدء العلاج.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول فروزاكلا

إذا نسيت تناول جرعة من فروزاكلا، يمكنك تناول الجرعة المنسية خلال 12 ساعة في نفس اليوم. إذا مرت أكثر من 12 ساعة، تناول الجرعة المعتادة في اليوم التالي في الوقت المعتاد.

يُمنع تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

لا تتناول جرعة إضافية إذا تقيأت بعد تناول فروزاكلا. تناول جرعتك الثابتة في اليوم التالي في الوقت المعتاد.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال فروزاكلا أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

قد يسبب فروزاكلا أعراضًا جانبية خطيرة، تشمل:

- ضغط دم مرتفع (فرط ضغط الدم). عرض جانبي شائع جدا (يظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة مستعملين): قد يسبب فروزاكلا فرط ضغط الدم الذي قد يكون خطيرا. قد يصف طبيبك دواء لعلاج ضغط الدم المرتفع لديك إذا لزم الأمر. أخبر طبيبك إذا كنت تختبر أيًا من الأعراض التالية لفرط ضغط الدم أثناء العلاج:

- صداع شديد
- ألم في الصدر
- الشعور بضبابية أو دوار
- صعوبات في التنفس
- ارتباك
- حالات رعاف
- تغييرات في الرؤية
- حالات تقبؤ

- نزيف شديد (كدمية). عرض جانبي شائع (يظهر لدى 10-1 من بين 100 مستعمل): يمكن أن يسبب فروزاكلا نزيفًا قد يكون خطيرًا ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة. أخبر طبيبك إذا كنت تختبر أيًا من أعراض النزيف التالية أثناء العلاج:

- نزيف شاذ، شديد أو لا يتوقف
- دم في البول أو البول يبدو أحمر، وردي أو بني
- كدمات
- السعال مع دم أو خثرات دموية
- الشعور بالضبابية
- نزيف طمئي أشد من المعتاد
- تغير دم أو قيء يشبه نفل القهوة
- نزيف مهبل شاذ
- دم في البراز أو براز أسود يشبه القطران
- أنزفة من الأنف (رعاف) تحدث في أوقات متقاربة

- **حالات عدوى. عرض جانبي شائع جدا (يظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة مستعملين):**
يمكن أن يزيد فروزاكلا من خطر حدوث حالات عدوى، بما في ذلك حالات عدوى خطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة. حدثت حالات العدوى الأكثر شيوعًا مع فروزاكلا في المسالك البولية، الأنف أو الحنجرة والرتتين. **أخبر طبيبك إذا اختبرت أحد أعراض العدوى التالية أثناء العلاج:**

- سخونة
- صعوبات في التنفس
- سعال شديد مع أو بدون ارتفاع في إنتاج المخاط
- حرقان أو ألم عند التبول
- ألم شديد في الحنجرة
- احمرار، انتفاخ أو ألم في أي جزء من الجسم

- **تمزق في البطن أو جدار الأمعاء (انثقاب في الجهاز الهضمي). عرض جانبي شائع (يظهر لدى 10-1 من بين 100 مستعمل):** يمكن أن يسبب فروزاكلا انثقابًا في الجهاز الهضمي والذي قد يكون خطيرًا ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة. **أخبر طبيبك فورًا إذا كنت تختبر أيًا من الأعراض التالية لانثقاب الجهاز الهضمي أثناء العلاج:**

- آلام شديدة في البطن (المعدة) أو ألم في البطن لا يزول
- دم في البراز أو براز أسود يشبه القطران
- حالات تقيؤ أو حالات تقيؤ دموي
- حالات غثيان
- سخونة أو قشعريرة

- **انسداد الأمعاء. عرض جانبي شائع (يظهر لدى 10-1 من بين 100 مستعمل).**

- **مشاكل في الكبد. عرض جانبي شائع جدا (يظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة مستعملين):** يعد ارتفاع إنزيمات الكبد في الدم أمرًا شائعًا جدا مع فروزاكلا ويمكن أن يكون خطيرًا أيضًا وقد يؤدي إلى الوفاة. **أخبر طبيبك إذا كنت تختبر أيًا من الأعراض التالية لمشاكل الكبد أثناء العلاج:**

- اصفرار الجلد أو الجزء الأبيض من العينين
- فقدان الشهية
- بول بلون غامق (بلون الشاي)
- حالات غثيان أو تقيؤ
- ألم في المنطقة اليمنى العلوية من البطن (المعدة)
- نزيف أو كدمات

- **بروتين في البول (بيلة بروتينية). عرض جانبي شائع جدا (يظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة مستعملين):** وجود بروتين في البول شائع جدا مع فروزاكلا ويمكن أن يكون خطيرًا أيضًا. **أخبر طبيبك إذا كنت بحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد، أو إذا كنت تختبر انتفاخًا في الوجه، اليدين، الذراعين، الرجلين أو القدمين أثناء العلاج.**

- **ردود فعل جلدية في اليد-الرجل (Palmar-Plantar Erythrodysesthesia [PPE]). عرض جانبي شائع جدا (يظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة مستعملين):** ردود فعل جلدية في اليد-الرجل شائعة جدا مع فروزاكلا ويمكن أن تكون خطيرة. **أخبر طبيبك إذا كنت تختبر طفحًا جلديًا شديدًا أو احمرارًا، ألم، حويصلات، نزيف أو انتفاخ في راحتي اليدين أو القدمين أثناء العلاج.**

- **متلازمة اعتلال الدماغ الخلفي العكسي (PRES). عرض جانبي غير شائع (يظهر لدى 10-1 من بين 1000 مستعمل):** PRES هي حالة خطيرة يمكن أن تحدث في دماغك أثناء العلاج بـ فروزاكلا. **أخبر طبيبك فورًا إذا اختبرت أيًا من الأعراض التالية أثناء العلاج:**

- صداع
- تغيرات في الرؤية
- اختلاجات
- مشاكل في التفكير
- ارتباك

- **مشاكل في شفاء الجروح. عرض جانبي غير شائع (يظهر لدى 1-10 من بين 1000 مستعمل):** قد لا تشفى الجروح كما ينبغي أثناء العلاج بـ فروزاكلا. **أخبر طبيبك** إذا كنت تخطط لإجراء أي عملية جراحية قبل البدء بـ فروزاكلا أو أثناء العلاج.
 - يجب عليك التوقف عن تناول فروزاكلا قبل أسبوعين على الأقل من العملية الجراحية المخطط لها.
 - سيخبرك طبيبك متى يمكنك البدء بتناول فروزاكلا مرة أخرى بعد العملية الجراحية.
- **خثرات دم في الأوعية الدموية (الشرابين). عرض جانبي غير شائع (يظهر لدى 1-10 من بين 1000 مستعمل):** يمكن أن يسبب فروزاكلا خثرات دموية أو انسدادًا في الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية، سكتة دماغية أو وفاة. **احصل على مساعدة طبية فورًا** إذا اختبرت أيًا من الأعراض التالية أثناء العلاج:
 - آلام قوية أو ضغط في الصدر
 - آلام في الذراعين، الرجلين، الظهر، الرقبة أو الفك
 - ضيق تنفس
 - خدر أو ضعف في الوجه، الذراع أو الرجل، خاصة في جانب واحد من الجسم
 - الشعور بالضعف أو إغماء
 - تعرّق مفرط عن المعتاد
 - ارتباك مفاجئ، صعوبة في التحدث أو فهم الأشياء
 - مشاكل في المشي
 - صداع شديد ومفاجئ
 - تغيرات مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كليهما
 - دوار، أو فقدان التوازن أو التناسق
- **خلل في أداء الكثير من الأعضاء. عرض جانبي غير شائع (يظهر لدى 1-10 من بين 1000 مستعمل).**
- **ردود الفعل تحسسية تجاه FD&C Yellow رقم 5 و- FD&C Yellow رقم 6.** يحتوي فروزاكلا 1 ملغ على المركبات غير الفعالة تارترازين (FD&C Yellow رقم 5) وأصفر سانست (FCF FD&C Yellow رقم 6). تارترازين قد يسبب ردود فعل تحسسية (بما في ذلك الربو القصبي) لدى بعض الأشخاص، وخاصة لدى الأشخاص الذين لديهم أيضًا حساسية للأسبرين، يمكن أن يسبب وأصفر سانست FCF أيضًا ردود فعل تحسسية. **أخبر طبيبك** إذا كنت تختبر شرى، طفح أو صعوبات في التنفس أثناء العلاج بـ فروزاكلا.

أعراض جانبية أخرى

أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا واجهت أحد الأعراض الجانبية التالية:

- تشمل أعراض فروزاكلا الجانبية الشائعة جدا (تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة مستعملين) ما يلي:
 - ضعف، نقص القوة والطاقة، الشعور بالإرهاق الشديد أو النعاس (وهن)
 - فم مؤلم أو جفاف، جروح في الفم أو تقرحات
 - قلة نشاط الغدة الدرقية (نقص نشاط الدرقية)، والذي قد يسبب التعب، ارتفاع الوزن وتغييرات في الجلد والشعر
 - آلام المفاصل (ألم مفصلي)، آلام العظام والعضلات
 - فحوص دم تظهر مستويات زائدة من القيم التالية: دهون ثلاثية، كوليسترول، ناقله أمين الأسبارتات، ناقله أمين الألانين (ALT)، بيليروبين، فوسفاتاز قلوي، زمن الثرومبلاستين الجزئي (Activated Partial Thromboplastin Time, aPTT)، كرياتينين، جلوكوز، حمض اليوريك (حمض البول).
 - فحوص دم تظهر مستويات منخفضة من القيم التالية: ألبومين، صوديوم، مغنيسيوم، الخلايا اللمفاوية، الصفائح الدموية، الكالسيوم، البوتاسيوم، الهيموجلوبين.
- أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى 1-10 من بين 100 مستعمل) ما يلي:
 - ألم شرجي (مستقيمي)

- ارتباط غير سليم بين أجزاء الجهاز الهضمي (ناسور)
- ارتفاع في إنزيمات البنكرياس

• أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى 1-10 من بين 1000 مستعمل):

- التهاب البنكرياس

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقويّ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين في درجة حرارة تحت الـ 30°C .
يجب التخزين في العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة.
احفظ القنينة مغلقة جيداً.
يُمنع إخراج ماص الرطوبة (desiccant) من القنينة.

يجب إلقاء دواء لم يعد ضمن الاستعمال بشكل آمن.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

microcrystalline cellulose or cellulose, microcrystalline (PH-101); corn starch or maize starch, and talc.

يحتوي غلاف كبسولة فروزاكلا 1 ملغ على:

gelatin; titanium dioxide/E171; tartrazine - FD&C yellow 5/E102; sunset yellow FCF - FD&C Yellow 6/E110.

يحتوي غلاف كبسولة فروزاكلا 5 ملغ على:

gelatin; titanium dioxide/E171; brilliant blue FCF FD&C blue 1/E133, allura red AC-FD&C red 40/E129.

محتوى الحبر:

shellac/dewaxed shellac/E904; dehydrated alcohol/ethanol anhydrous; isopropyl alcohol; butyl alcohol/butanol; propylene glycol/E1520; purified water; strong ammonia solution /ammonia solution, concentrated; potassium hydroxide; ferrosferric oxide/iron oxide black/E172;

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة؟

فروزاكلا 1 ملغ - كبسولة جيلاتينية صلبة بحجم 3، ذات غطاء بلون أصفر قاتم وجسم أبيض قاتم، مع الختم "HM013" بالحبر الأسود فوق "1 mg" على جسم الكبسولة.

فروزا كلا 5 ملغ - كبسولة جيلاتينية صلبة بحجم 1، ذات غطاء بلون أحمر قاتم وجسم أبيض قاتم، مع الختم "HM013" بالحرير الأسود فوق "5 mg" على جسم الكبسولة.

تحتوي كل عبوة كرتون على قنينة واحدة تحتوي على 21 كبسولة صلبة وماص للرطوبة (desiccant).

صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه: تاكيدا إسرائيل م.ض.، شارع إفعال 25، ص.ب. 4140، بيتاح تكفا
4951125

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

فروزا كلا 1 ملغ: 178-41-37922-99

فروزا كلا 5 ملغ: 178-42-37923-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

تمت تحريرها في حزيران 2025.