

## سبوسيل معلق

المادة الفعالة وتركيزها

يحتوي كل 1 ملل على:

selenium sulfide 25 mg

(سيلينيوم سولفيد 25 ملغ)

المواد غير الفعالة ومسببات الأرجية في المستحضر: انظر الفصل 2 البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. يجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. إذا لم يطرأ تحسن على وضعك أو تفاقم وضعك بعد/خلال العلاج الموصى به فيجب مراجعة الطبيب.

### 1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

لعلاج القشرة، التهاب الجلد الدهني (ديرماتيتيس سيبوريا) في فروة الرأس والسعفة المبرقشة (tinea versicolor).

الفصيلة العلاجية: مضاد للفطريات.

يعمل المستحضر ضد القشرة بطريقتين:

- عن طريق تقليل دهنية فروة الرأس.
- عن طريق إبطاء نمو طبقة خلايا الجلد الموجودة على فروة الرأس والتي تسبب القشرة.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (سيلينيوم سولفيد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).
- وجد لديك تشقق في الجلد، تلوث في الجلد أو التهاب شديد في الجلد في موضع العلاج لأن ذلك قد يسبب تزايداً في امتصاص سيلينيوم سولفيد إلى الدم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- سبوسيل مخصص للاستعمال الخارجي فقط. سبوسيل ليس مخصصاً للبلع.
- امتنع عن ملامسة الدواء للعينين. إذا دخل الدواء إلى العينين بالخطأ - فاشطف فوراً بالكثير من الماء البارد.
- لا تترك الدواء بتلامس مع الشعر أو الجلد لمدة أطول من المدة التي أوصي بها. قد يسبب هذا الشيء تهيجاً، إحساساً بالحرق أو ظهور حويصلات. كذلك، لا تستعمله في أحيان أكثر تقارباً مما أوصي به.
- عند دهن الدواء على الجسم لعلاج السعفة المبرقشة، قد ينشأ تهيج جلدي، خاصة في المنطقة التناسلية (في منطقة الأعضاء الجنسية) وفي مناطق الثنيات الجلدية. يجب شطف هذه المناطق جيداً بعد الاستعمال.
- قبل الاستعمال انزع المجوهرات المصنوعة من الذهب، الفضة والمعادن الأخرى لأن الدواء قد يسبب تغيراً في لونها.
- إذا كان الشعر يتضرر من المواد الكيميائية (مثل مواد الصبغ، التبييض، التجعيد أو التلميس الدائم) أو إذا كان الشعر رمادياً أو أبيض، فقد يطرأ تغير على لون الشعر. من أجل منع تغير لون الشعر، يجب شطف الدواء جيداً عن الشعر فوراً بعد الاستعمال.
- اشطف الدواء جيداً عن الشعر قبل الصبغ، صبغ الخُصل بالألوان، التجعيد أو التلميس الكيميائي. لا يجوز استعمال الدواء لمدة يومين قبل أو بعد أحد هذه العلاجات للشعر.
- انزع دبائيس الشعر قبل الاستعمال وامتنع عن تلامس المادة مع المسطحات المعدنية.

الأولاد والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال الرضع والأولاد. لم يتم فحص السلامة والفعالية لدى الأولاد والأطفال الرضع.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، تظنين أنك حامل أو كنتِ مرضعاً.

يجب استشارة طبيب أو صيدلي قبل استعمال الدواء إذا كنتِ حاملاً أو مرضعاً، تظنين أنك حامل أو تخططين حملاً.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي سبوسيل على پارابينات (ميثيل پارابين وپروپيل پارابين)، وهي قد تسبب ردود فعل تحسسية (قد تكون متأخرة). إذا حدثت ردود فعل تحسسية، فتوقف عن الاستعمال.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية الاستعمال المتبعة عادة هي:

لعلاج السعفة المبرقشة (tinea versicolor):

1. ادهن على المنطقة المصابة، واجعله يرغو مع القليل من الماء.
2. اترك الدواء على الجلد لما يقارب 10 دقائق.
3. اشطف جيداً.
4. كرر العملية مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع.

لعلاج القشرة و التهاب الجلد الدهني (ديرماتيتيس سيبوريا) في فروة الرأس:

1. دلك كمية صغيرة (5-10 ملل) من المعلق على فروة رأس رطبة.
2. اتركها على فروة الرأس لمدة 2 إلى 3 دقائق.

3. اشطف فروة الرأس جيداً.
4. كرر العملية واشطف جيداً.
5. بعد العلاج اشطف يديك جيداً.
6. نفذ العلاج المذكور أعلاه مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين وبعد ذلك مرة واحدة كل أسبوع-أسبوعين أو مرة واحدة كل بضعة أسابيع. لا يجوز في أي حال أن تستعمل المادة لأكثر من مرتين في الأسبوع.

#### يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والأطفال الرضع. إذا لم يطرأ تحسن على وضعك أو تفاقم وضعك بعد/خلال العلاج الموصى به فيجب مراجعة الطبيب. لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط. خضّ القنينة قبل الاستعمال.

يجب الامتناع عن ملامسته للعينين و/أو الأنسجة المخاطية. إذا بلعت الدواء بالخطأ أو إذا قام ولد ببلع الدواء بالخطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر معك عبوة الدواء. بلع سيبوسيل قد يسبب الغثيان أو التقيؤ.

لا يجوز تناول الأدوية في العنمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواءً. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سيبوسيل إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

#### أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد)

- رد فعل تحسسي، طفح جلدي أو شرى.
- تهيج وحساسية في الجلد أو في فروة الرأس – يوصفان أحياناً كحساس بالحرق.
- تزايد تساقط الشعر. قد يحدث صلح.
- تغيير في لون الشعر. يمكن اجتناب ذلك أو تقليله إلى الحد الأدنى عن طريق شطف الشعر جيداً بعد العلاج.
- تزييت الشعر وفروة الرأس أو جفاف في منطقة الاستعمال.
- قد تظهر حويصلات، خاصةً إذا تلامس الدواء مع الشعر أو الجلد لمدة أطول من المدة التي أوصي بها.
- تهيج في العينين، تضرر القرنية (ألم في العين، وجود فوائض دم في الأوعية الدموية [فرط الدم] وعمى مؤقت) – قد تظهر نتيجة لتعرض العينين لسبوسيل.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

#### التبليغ عن الأعراض الجانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- ظروف التخزين: يجب التخزين في مكان بارد، فيما دون 25°C.
- عمر التخزين بعد فتح المستحضر: 12 شهراً.
- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Sodium lauryl ether sulfate, aluminum magnesium silicate, sodium dihydrogen phosphate dehydrate, cocamide DEA, sodium chloride, citric acid anhydrous, fragrance (I.F.F. #9138) herbal, titanium dioxide, methyl paraben, captan, propyl paraben, purified water

#### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

معلّق برتقالي اللون معبأ في قنينة بلاستيكية من 30 أو 100 غرام. قد لا تسوّق جميع أحجام العبوات.

#### المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:

تارو للصناعة الصيدلانية م.ض.، شارع هاكيتور 14، خليج حيفا، 2624761، إسرائيل.

#### رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

016-79-21210-00

حررت النشرة في نيسان/أبريل 2025.

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.