

## וי-טירס, טיפות עיניים, תמיסה

הרכב:

הידרוקסיאתילצלוז 0.4% W/V (Hydroxyethylcellulose 0.4% W/V).  
כל 1 מ"ל מכיל: 4 מ"ג הידרוקסיאתילצלוז.

מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה- ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".  
**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

וי-טירס משמש להגנה על העיניים ולסיכה במקרים של יובש בעיניים, כאשר יצירת הדמעות אינה מספקת.  
**קבוצה תרופתית:** דמעות מלאכותיות.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (הידרוקסיאתילצלוז) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה בעת הרכבת עדשות מגע (ראה מידע נוסף בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").

### תגובות בין תרופתיות:

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

### היריון והנקה:

ניתן להשתמש בוי-טירס בתקופת ההיריון וההנקה.

### נהיגה ושימוש במכונית:

כמו בכל טיפות עיניים, ראייתך עולה להיות מטושטשת לאחר השימוש. המתן עד שראייתך תחזור להיות ברורה לפני נהיגה או שימוש במכונית.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה בנזלקוניום כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות ולשנות את צבען. יש להסיר את עדשות המגע לפני השימוש בתרופה, ולהחזירן 15 דקות לאחר השימוש.

בנזלקוניום כלוריד עלול גם לגרום לגירוי בעין, בייחוד אם אתה סובל מעיניים יבשות, או הפרעות בקרנית (השכבה השקופה בחלק הקדמי של העין). אם אתה מרגיש תחושה לא רגילה, צריבה או כאב בעין לאחר השימוש בתרופה, פנה לרופא שלך.

תרופה זו מכילה 0.1 מ"ג של בנזלקוניום כלוריד בכל 1 מ"ל, שהוא ריכוז שווה ערך ל- 0.1 מ"ג/מ"ל.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

התרופה מתאימה לילדים, מתבגרים ומבוגרים.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

1-2 טיפות, 3-4 פעמים ביום או לפי הצורך. אם תחושת היובש בעיניים מחמירה או אם אין הקלה לאחר 3 ימים, יש לפנות לרופא.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

**צורת הנטילה:**

**לא לבלוע!** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

### הוראות השימוש:

1. רחץ היטב את ידיך טרם השימוש בטיפות העיניים.
2. הטה ראשך לאחור או שכב על המיטה ובעזרת האצבע, הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין וצור מרווח.
3. לתוך המרווח, טפטף את התרופה ועצום את עיניך למשך 1-2 דקות ואל תעפעף.
4. למניעת זיהום התמיסה, הקפד שפיית הבקבוקון לא תבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האצבע והעין, וסגור את הבקבוקון היטב לאחר השימוש.

### אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אין ליטול תרופות בחוץ! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוי-טירס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. ייתכן שתחושה, לפרק זמן קצר, טשטוש ראייה או תחושת צריבה קלה, לאחר השימוש בטיפות. טיפות עיניים המכילות בנזלקוניום כלוריד עלולות לגרום לגירוי בעין, במיוחד בקרב הסובלים מעיניים יבשות או מהפרעות בקרנית. למידע נוסף, ראה בסעיף 2- "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**אם הפיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות

([www.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

### • תנאי אחסון:

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- ניתן להשתמש בתרופה עד 30 יום מפתיחת הבקבוקון לראשונה, ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
- יש לשמור על הבקבוקון סגור היטב.
- אין להשתמש בתרופה זו אם חל שינוי בצבע התמיסה או אם היא הפכה לעכורה.

• אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

Sodium Chloride, Sodium Citrate, Potassium Chloride, Disodium Edetate, Benzalkonium Chloride, Hydrochloric Acid/ Sodium Hydroxide, Purified Water.

### כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוקון המכיל תמיסה צלולה, חסרת צבע עד מעט צהובה.

**גודל אריזה מאושר:** 15 מ"ל.

### יצרן ובעל הרישום:

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, רח' הטחנה 6, ת.ד. 114, בנימינה 3055002, ישראל.

נערך ביולי 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 02-28588-93-100

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.