

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986

يسوّق الدواء بدون وصفة طبية

كورسوديل غسول للفم 0.2% w/v

المادة الفعالة:

كلورهيكسيدين ديجلوكونات 0.2% w/v

Chlorhexidine digluconate 0.2% w/v

المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في المستحضر – انظر رجاءً البند 2 تحت العنوان «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» والبند 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. ينبغي عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات الواردة في البند «كيف تستعمل الدواء».

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

- لإعاقة تكوّن اللويحة السنية (البلاك)
- للمساعدة في علاج ومنع التهاب اللثة (جينجيفيتيس)
- للمساعدة في الحفاظ على النظافة الصحية للفم
- للاستعمال بعد الجراحات أو العلاجات السنية، للحث على تعافي اللثة
- للاستعمال في حالة التقرحات والالتهابات الناجمة عن أطقم الأسنان، والتلوث الفطري في الفم

الفصيلة العلاجية: مطهر

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. انظر رجاءً البند 6 للاطلاع على المركبات الإضافية.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- لا يجوز الإستعمال لدى الأطفال دون عمر 12 سنة إلا بتوصية من الطبيب.
- للاستعمال فقط في تجويف الفم. لا يجوز البلع. اشطف جيداً بالماء في حال ملامسة المستحضر للعينين أو للأذنين.
- في حال حدوث رد فعل تحسسي شديد، عليك التوقف عن الإستعمال والتوجه فوراً لتلقي المساعدة. أنظر «أعراض جانبية».
- قد تخلّ معاجين الأسنان بفعالية غسول الفم. بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، اشطف الفم جيداً بالماء وانتظر 5 دقائق قبل استعمال كورسوديل لغسل الفم. بدلاً من ذلك، بإمكانك استعمال غسول الفم في وقت آخر من اليوم.
- لا يجوز تبييض الأقمشة التي كانت بتلامس مع غسول الفم.
- قد يظهر تبقع مؤقت للأسنان واللسان. أنظر «أعراض جانبية».
- قد يطرأ تغير على الإحساس بالطعم أو ستشعر بإحساس بالذغ، الوخز أو التتميل في تجويف الفم. انظر البند 4 «الأعراض الجانبية».

الأولاد والمراهقون

الدواء مخصص للاستعمال لدى متلقي العلاج الذين يزيد عمرهم عن 12 عاماً. إذا كان العمر دون ذلك فيجب مراجعة الطبيب قبل الاستعمال.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع

من الممكن إستعمال الدواء، إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

مكروچول چلیسیرول هیدروکسی سیترات قد يؤدي لردود فعل في الجلد.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

يجب الاستعمال فقط إذا كان قفل السداد موجودًا وبشكله الكامل قبل الفتح.

الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:

إستعمل مرتين في اليوم. إملاً الغطاء حتى خط 10 ملل. اغسل الفم بشكل شامل لمدة دقيقة واحدة ومن ثم إيصق.

إلتهاب اللثة: يوصى بالإستعمال لمدة شهر.

تقرحات في الفم وفطريات الفم: إستمر بالإستعمال لمدة يومين بعد الشفاء.

إلتهابات الفم عقب أطقم الأسنان: قم بتنظيف ونقع طقم الأسنان خاصتك بغسول الفم لمدة 15 دقيقة مرتين في اليوم.

بعد عمليات جراحة الأسنان: القيام بالغسل وفقاً لتعليمات طبيب الأسنان خاصتك. إذا إستمرت أعراضك، توجه للطبيب.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

لا يجوز البلع.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كورسوديل غسول للفم قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

توقف عن استعمال غسول الفم وتوجه فوراً لتلقي المساعدة الطبية إذا ظهر لديك طفح جلدي، انتفاخ في الشفتين، في اللسان، في

الحلق أو في الوجه أو إذا وجدت لديك صعوبات في التنفس.

من شأن هذه الأعراض أن تكون علامات لرد فعل تحسسي شديد والذي هو نادراً جداً.

توقف عن إستعمال غسول الفم وتوجه للطبيب إذا ظهر لديك هياج في الفم، ألم أو إنتفاخ للوجه - الخدين.

يُفترض أن تزول هذه الأعراض عند إيقاف العلاج.

أعراض جانبية أخرى يمكن حدوثها:

تبع مؤقت للسان. يختفي هذا العرض عند إيقاف العلاج.

تبع مؤقت للأسنان. يمكن إزالته عادة بواسطة فرك الأسنان. يمكنك منع التبع بواسطة الإمتناع عن شرب الشاي، القهوة، أو النبيذ

الأحمر - خاصةً بعد ساعة من الإستعمال، وعن طريق الفرك اليومي بواسطة معجون الأسنان (أنظر «كيفية إستعمال الدواء»). إذا

بقي التبع يمكن إزالته بواسطة التنظيف والصقل عند طبيب الأسنان أو أخصائية صحة الأسنان. يمكنك أن تنظف طقم أسنانك

بواسطة مادة لتنظيف أطقم الأسنان.

قد تلاحظ تغيراً في حاسة الذوق، إحساساً بالذغ، تنميلاً، أو وخزاً في اللسان عندما تستعمل غسول الفم لأول مرة. يختفي ذلك

عادة مع إستمرار العلاج. إذا حدث تقشر للجلد داخل الفم، خفف غسول الفم مع كمية مساوية من الماء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة

الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي»

الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن

أعراض جانبية أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <http://sideeffects.health.gov.au>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم

الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية، للإستعمال حتى 6 شهور من الفتح.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً –

Purified water, Sorbitol liquid, Glycerol, Macrogolglycerol hydroxystearate and Optamint
291616 flavour.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة –

محلول شفاف، صافٍ إلى عكر قليلاً، برائحة النعنع.

قنينة ذات 300 ملل مع غطاء لولبي.

صاحب الامتياز والمستورد: هاليون سي.إتش. إسرائيل م.ض.، ص.ب. 3256، بيتاح تيكفا.

تم تحرير النشرة في آب/أغسطس 2024.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 029-96-21599

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.