

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986
يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ديوفان 40 ملغ أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:

Valsartan 40 mg

فالسارتان 40 ملغ

ديوفان 80 ملغ أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:

Valsartan 80 mg

فالسارتان 80 ملغ

ديوفان 160 ملغ أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:

Valsartan 160 mg

فالسارتان 160 ملغ

المواد غير الفعالة ومولّدات الحساسية: أنظر الفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بد لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ديوفان 40 ملغ مخصص لعلاج قصور القلب وتقليل المبيت في المستشفى لدى مرضى لديهم عدم تحمل للأدوية المثبطة للإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACEI). للعلاج بعد إحتشاء عضلة القلب، وذلك لتحسين حالة بقائهم على قيد الحياة.

ديوفان 80 ملغ وديوفان 160 ملغ مخصصان لعلاج فرط ضغط الدم. لعلاج قصور القلب وتقليل المبيت في المستشفى لدى مرضى لديهم عدم تحمل للأدوية المثبطة للإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACEI). للعلاج بعد إحتشاء عضلة القلب، وذلك لتحسين حالة بقائهم على قيد الحياة.

● إن إرتفاع ضغط الدم يزيد من عبء العمل على القلب والشرايين، إذا لم يتم علاج إرتفاع ضغط الدم، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة الأوعية الدموية للماغ، القلب والكلى. النتيجة قد تؤدي إلى سكتة، قصور القلب أو قصور الكلى. إن إرتفاع ضغط الدم يزيد من خطورة حدوث نوبات قلبية. إن خفض ضغط الدم إلى نسب سليمة يقلل من خطورة تطور هذه الإضطرابات.

● لعلاج المرضى البالغين بعد نوبة قلبية (إحتشاء عضلة القلب)، وذلك لتحسين حالة بقائهم على قيد الحياة ولتقليل مشاكل إضافية في القلب. ● لعلاج قصور القلب العرضي لدى المرضى البالغين، قصور القلب يشمل ضيق في التنفس، إنتفاخ الرجلين وراحتي القدمين جراء تراكم السوائل. قصور القلب يعني بأن عضلة القلب غير قادرة على ضخ الدم بقوة كافية لتزويد الجسم بكافة الدم الذي يحتاجه.

الفصيلة العلاجية:

مضاد للمستقبل أنجيوتنسين II.

ينتمي ديوفان إلى فصيلة الأدوية الحاحية للمستقبل أنجيوتنسين II، فهي تساعد في السيطرة على إرتفاع ضغط الدم. إن أنجيوتنسين II عبارة عن مادة طبيعية موجودة في الجسم والتي تؤدي لتضييق الأوعية الدموية، وبذلك تؤدي إلى إرتفاع ضغط الدم. يعمل ديوفان عن طريق حجب تأثير أنجيوتنسين II، نتيجة لذلك ترتخي الأوعية الدموية، وينخفض ضغط الدم.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- لديك فرط حساسية (اليرجي) للمادة الفعالة فالسارتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6)
 - كنت تعاني من إضطراب خطير في وظائف الكبد
 - كنت في فترة الحمل لأكثر من 3 أشهر (يُفضّل الإمتناع عن ديوفان في بداية الحمل أيضاً - أنظري فقرة "الحمل والإرضاع")
 - كنت معالجا بدواء لخفض ضغط الدم يحتوي على الأيسكيريدين (aliskiren) بسبب كونك مريضاً بالسكري أو تعاني من خلل في وظيفة الكلى
- إذا إنطبقت عليك إحدى تلك الحالات، بلغ الطبيب بدون تناول ديوفان.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ ديوفان، إحك للطبيب إذا:

- وُجد لديك مرض في الكبد
- وُجد لديك مرض كلوي خطير أو كنت تجري الدليزة
- كنت تعاني من تضيق شريان الكلية

- اجتزت مؤخراً زراعة كلية
- وُجد لديك مرض قلبي خطير، مغاير لقصور قلب أو نوبة قلبية
- إحك لطبيبك إذا حدث لديك ذات مرة إنتفاخ في اللسان والوجه الذي نتج جراء رد فعل تحسسي يسمّى وذمة وعائية، عند تناولك لدواء آخر (بما في ذلك مثبطات ACE). إذا إنطبقت عليك هذه الأعراض عند تناول ديوفان، فيجب التوقف حالاً عن تناول ديوفان، ولا يجوز تناول ديوفان ثانية على الإطلاق. أنظر أيضاً الفقرة 4. "الأعراض الجانبية"

● إذا كنت تقاسي من آلام في البطن، غثيان، تقيؤات أو إسهال بعد تناول ديوفان، فسوف يقرر طبيبك حول مواصلة العلاج. لا تتوقف عن تناول ديوفان من تلقاء نفسك

● إذا كنت تتناول أدوية ترفع من كمية اليوتاسيوم في الدم. ذلك يشمل إضافات اليوتاسيوم أو بدائل الملح الحاوية على بوتاسيوم، أدوية حافظة لليوتاسيوم وهيبارين. من الجائز أن يطلب منك فحص كمية اليوتاسيوم في الدم بفواصل زمنية ثابتة

● كنت تعاني من الأدوستيرونية، مرض تنتج فيه الغدتان الكظريتان لديك فائض من هورمون الألدوستيرون. في هذه الحالة لا يوصى بإستعمال ديوفان

● فقدت كمية كبيرة من السوائل (تجفاف) جراء إسهالات وتقيؤات أو جرعات مرتفعة من الأدوية المدرة للبول

● كنت تتناول إحدى الأدوية التالية التي تُستعمل لعلاج إرتفاع ضغط الدم:

○ دواء من نوع مثبطات ACE (الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين) (مثلاً: إنالابريل، ليزينوبريل، رامبيريل)، خاصة إذا وُجدت لديك مشاكل كلوية تتعلق بمرض السكري

○ الأيسكيريدين

○ كنت معالجا بمثبط ACE بمشاركة أدوية أخرى لعلاج قصور القلب، التي تعرف بمضادات لمستقبلات (حاجبات المستقبلات) القشرانية المعدنية (MRA) (مثلاً سيبرونولاكتون، إيليريتون) أو حاجبات بيتا (مثلاً: ميتوبرولول)

إقرأ أيضاً بتمعن المعلومات في الفقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا:" عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تعتقدين بأنك (أو من شأنك أن تكوني) حامل. لا يوصى بتناول ديوفان في مراحل مبكرة من الحمل، لا يجوز تناول ديوفان إذا تجاوزت ثلاثة أشهر من الحمل، لأنه قد يحدث ضرر جدي للجنين إذا إستعملت الدواء في هذه المرحلة (أنظري فقرة "الحمل والإرضاع").

الأطفال:

هذا الدواء غير مخصص للرضع، الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة:

من الجائز أن يفحص طبيبك ووظائف الكلية لديك، ضغط الدم وكمية الشوارد الكهربائية في الدم (مثلاً: اليوتاسيوم) بفواصل زمنية ثابتة.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. إن العلاج يمكن أن يتأثر إذا تم تناول ديوفان سوية مع أدوية معينة. من الجائز أن يحتاج الأمر تغيير الجرعة الدوائية، إتخاذ وسائل الحذر أو في حالات معينة التوقف عن تناول إحدى الأدوية. بالأخص يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

● أدوية أخرى تستعمل لخفض ضغط الدم، خاصة المدرات البولية، مثبطات ACE (مثل: إنالابريل، ليزينوبريل وإلخ) أو الأيسكيريدين (أنظر أيضاً الفقرتين "لا يجوز إستعمال الدواء إذا:" و- "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء")

● أدوية ترفع كمية اليوتاسيوم في الدم. هذه تشمل إضافات اليوتاسيوم أو بدائل الملح الحاوية على بوتاسيوم، أدوية حافظة لليوتاسيوم وهيبارين نوع معين من مسكنات الآلام المسماة مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs)

● مضادات حيوية معينة (من مجموعة الريفاميسين)، دواء يستعمل للوقاية من رفض العضو المزروع (سيكلوسبورين) أو دواء مضاد للفطريات الرجعية المستعمل لعلاج ثلوث HIV/أيدز (ريتونافير). هذه الأدوية من شأنها أن تزيد من تأثير ديوفان

● ليثيوم، دواء يستعمل لعلاج أنواع معينة من الأمراض النفسية

بالإضافة:

● إذا كنت معالجا بعد نوبة قلبية، فإن المشاركة مع مثبطات ACE (دواء لعلاج نوبة قلبية) غير موصى بها

● إذا كنت معالجا من قصور القلب، فإن المشاركة الثلاثية لـ: مثبطات ACE، أدوية أخرى لعلاج قصور القلب المعروفة بمضادات (ذات نشاط حاجب) لمستقبلات القشرانية المعدنية (MRA) (مثلاً سيبرونولاكتون، إيليريتون) أو حاجبات بيتا (مثلاً ميتوبرولول)، هذه المشاركة غير موصى بها.

إستعمال الدواء والطعام:

بالإمكان تناول ديوفان مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع:

● عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو من شأنك أن تكوني حامل).

يقترح بأن طبيبك سيقدم لك المشورة بالتوقف عن تناول ديوفان قبل أن تصبحي حاملاً أو فوراً عند العلم بأنك حامل، وهو سيقدم لك المشورة بتناول دواء آخر بدلاً من ديوفان. لا يوصى بـ ديوفان في المراحل الأولية من الحمل ولا يجوز تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يسبب ضرراً جدياً للطفل إذا قمت بإستعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

● أخبري طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين البدء بالإرضاع. لا يوصى بـ ديوفان للأمهات المرضعات وعلى ما يبدو فإن طبيبك سيختار علاجاً آخرًا من أجلك إذا رغبت في الإرضاع، خاصة إذا وُلد طفلك للثو، أو ولد قبل أوانه.

السياقة وإستعمال الماكنت:

قبل قيادة المركبة، إستعمال الماكنت أو إجراء أي نشاط يتطلب التركيز، عليك التأكد بأنك مدركاً لكيفية تأثير ديوفان عليك. بالمشابه لأدوية عديدة أخرى المستعملة لعلاج إرتفاع ضغط الدم، فإن ديوفان قد يؤدي إلى حدوث تورم ولضعف التركيز.

3) كيفية استعمال الدواء؟

● نرف أو ظهور كدمات غير اعتيادية (علامات لقلة الصفائح الدموية – إنخفاض نسبة الصفائح الدموية)

- ألم في العضلات (myalgia)
- سخونة، ألم في الحنجرة أو تقرحات في الفم نتيجة لتولثات (أعراض لإنخفاض نسبة خلايا الدم البيضاء المسمى قلة العدلات)
- إنخفاض نسبة الهيموغلوبين وإنخفاض نسبة خلايا الدم الحمراء في الدم (الأمراض الذي قد يؤدي إلى حدوث فقر الدم في حالات خطيرة)
- ارتفاع نسب البوتاسيوم في الدم (الذي في حالات خطيرة، قد يثير حدوث تشنجات عضلية وعدم إنتظام نظم القلب)
- ارتفاع في قيم وظائف الكبد (الذي قد يدل على تضرر الكبد) بما في ذلك ارتفاع البيليروبين في الدم (الذي قد يؤدي في حالات خطيرة إلى إصفرار الجلد والعينين)
- ارتفاع نسبة البولة الأزوتية في الدم وارتفاع نسب الكرياتينين في المصل (الأمراض الذي يمكن أن يدل على عدم سلامة الأداء الوظيفي الكلوي)
- إنخفاض نسب الصوديوم في الدم (الذي قد يثير حدوث إرهاق، إرتباك، إرتجاف العضلات و/أو تشنجات في حالات خطيرة)

إن وتيرة حدوث أعراض جانبية معينة من شأنها أن تتغير بحسب حالتك. مثلاً، إن أعراض جانبية مثل دوار وإنخفاض الأداء الوظيفي للكلى لوحظت بوتيرة منخفضة أكثر لدى المرضى الذين عولجوا من ارتفاع ضغط الدم مقارنة بمرضى عولجوا من قصور القلب أو بعد نوبة قلبية التي حدثت مؤخراً.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إبلاغ شركة نوفارتيس بواسطة عنوان البريد الإلكتروني التالي: safetydesk.israel@novartis.com

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسيب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية. يجب التخزين في العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة. لا يجوز الإستعمال إذا كانت العبوة معطوبة. لا يجوز رمي الأدوية عبر المجاري أو القمامة المنزلية، إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد هناك الحاجة إليها، وذلك من أجل حماية جودة البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Microcrystalline cellulose, crospovidone, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica.

يحتوي طلاء القرص على:

Hypromellose, titanium dioxide (E171), macrogl 8000, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172), iron oxide black (E172) (only 40 mg and 160 mg).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

دِيوفَان 40 ملغ أقراص مطلية: قرص أصفر بيضوي ذو أطراف مائلة، مع خط للشرط في جانب واحد، مع الطباعة "D" و- "O" في جانبيّ الخـط و- "NVR" في الجانب الآخر من القرص.

بالإمكان شطر القرص لجرعتي دواء متساويتين.

حجم العبوة: 14 أو 28 قرصاً (من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العبوة).

دِيوفَان 80 ملغ أقراص مطلية: قرص أحمر فاتح مستدير ذو أطراف مائلة، مع خط للشرط في جانب واحد، مع الطباعة "D" و- "V" في جانبيّ الخـط و- "NVR" في الجانب الآخر من القرص.

من أجل تسهيل البلع، يمكن، إذا دعت الحاجة، شطر القرص للإستعمال الفوري. يجب بلع كلا النصفين سوية مباشرة بعد الشطر.

حجم العبوة: 14، 28، 56 أو 98 قرصاً (من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العبوة).

دِيوفَان 160 ملغ أقراص مطلية: قرص رمادي-برتقالي بيضوي، محدب قليلاً، مع خط للشرط في جانب واحد مع الطباعة "DX" في جانبيّ الخـط و- "NVR" في الجانب الآخر من القرص.

من أجل تسهيل البلع، يمكن، إذا دعت الحاجة، شطر القرص للإستعمال الفوري. يجب بلع كلا النصفين سوية مباشرة بعد الشطر.

حجم العبوة: 14، 28، 56 أو 98 قرصاً (من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العبوة).

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م.ض، ص.ب. 9240، تل أبيب.

تم إعدادها في حزيران 2025.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
دِيوفَان 40 ملغ أقراص مطلية: 137 42 31281
دِيوفَان 80 ملغ أقراص مطلية: 127 85 30548
دِيوفَان 160 ملغ أقراص مطلية: 127 86 30549

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

DIO APL JUNE25 V2

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية متعلقة بالإستجاب من أجله وُصِف الدواء. بالإمكان إستعمال دِيوفَان لدى مرضى بأعمار 65 سنة وما فوق. هذا الدواء غير مخصص للرضع، الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

عادة لا يلاحظ مرضى ضغط الدم المرتفع بعلامات المشكلة. الكثير منهم يشعرون بشكل جيد. لذا من المهم المواظبة على الزيارات لدى طبيبك حتى ولو شعرت بشكل جيد.

طريقة تناول:

بالإمكان تناول دِيوفَان مع أو بدون طعام. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص المطلي. يجب بلع دِيوفَان مع كأس من الماء. يجب تناول دِيوفَان في نفس الوقت من كل يوم. لتعليمات الشطر الرجاء إقرأ بتمعن البند "كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة".

إذا تناولت جرعة دوائية أكبر

إذا كنت تشعر بدوار شديد و/أو إغماء توجه حالاً إلى طبيبك وإنتقل لوضعية الإستلقاء. إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وأخبرنا معك عبلة الدواء.

إذا نسيت تناول دِيوفَان

إذا نسيت تناول جرعة دوائية، تناولها حالاً عند تذكرك بذلك. إذا حان تقريباً موعد تناول الجرعة الدوائية التالية، قم بتقوية الجرعة الدوائية المنتسية. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إن التوقف عن العلاج قد يفاقم مرضك. قبل التوقف يجب مناقشة الطبيب أو الصيدلي عن تداعيات التوقف.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توقرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال دِيوفَان قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.

لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية معينة قد تكون جدية وتتطلب تدخلاً طبياً فوراً: يجب التوجه حالاً للطبيب إذا وجدت لديك أعراض لوزمة وعائية (رد فعل تحسسي معين) مثل:

- إنتفاخ الوجه، اللسان أو الحنجرة
- صعوبات في التنفس وفي البلع
- حكة وشرى

إذا شعرت بإحدى الأعراض المذكورة، توقف عن تناول دِيوفَان وإتصل فوراً بطبيبك (أنظر أيضاً بند "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 10 مستعملين):

- دوار
- ضغط دم منخفض مع أو بدون أعراض مثل دوار وإغماء عند الإنتقال لوضعية الوقوف
- إنخفاض في الأداء الوظيفي الكلوي (علامات لإضطراب في الكلى)
- أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 100 مستعمل):
- رد فعل تحسسي (وزمة وعائية) أنظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء". يجب التوجه حالاً للطبيب لتلقي مساعدة طبية
- فقدان مفاجئ للوعي (إغماء)
- الشعور بدوار (فيرتيغو)
- تراجع خطير في وظائف الكلى (علامات لقصور كلوي خطير)
- تشنجات عضلية، عدم سلامة نظم القلب (علامات لفرط البوتاسيوم في الدم – فائض من البوتاسيوم)
- ضيق في التنفس، صعوبات في التنفس خلال الإستلقاء، إنتفاخ راحتي القدمين أو الرجلين (علامات لقصور القلب)
- صداع
- سعال
- ألم في البطن
- غثيان
- إسهال
- إرهاق
- ضعف عام

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل):

- وزمة وعائية في الأمعاء: إنتفاخ في الأمعاء الذي يظهر مصحوب بأعراض مثل آلام في البطن، غثيان، تقيؤات وإسهال
- أعراض جانبية يشيع غير معروف (لا يمكن تقييم شيعوعها من المعطيات المتوفرة):

- حوصلات في الجلد (علامة لإلتهاب الجلد [dermatitis] الحويصلي)
- ردود فعل تحسسية تتراقد بطفح، حكة وشرى، أعراض سخونة، إنتفاخ المفاصل وآلم في المفاصل، آلام عضلية، من الجائز ظهور أعراض لإنتفاخ الغدد الليمفاوية و/أو أعراض شبيهة الإنفلونزا (علامات لمرض المصل – serum sickness)
- بقع بنفسجية – حمراء، سخونة، حكة (علامات لإلتهاب الأوعية الدموية المسمى أيضاً (vasculitis))