

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קורסודיל שטיפת פה 0.2% w/v

חומר פעיל:

כלורהקסידין דיגלוקונאט 0.2% w/v

Chlorhexidine digluconate 0.2% w/v

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – אנא ראה סעיף 2 תחת הכותרת "מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה" וסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף "כיצד תשתמש בתרופה".

1. למה מיועדת התרופה?

- לעיכוב היווצרות פלאק
 - כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (גינג'יטיס)
 - כעזר בשמירה על הגיינת הפה
 - לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים
 - לשימוש בכיבים ובדלקות עקב שיניים תותבות, ופסרת בפה
- קבוצה תרפויטית: אנטיספטי**

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. אנא ראה סעיף 6 לרכיבים נוספים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 שנים אלא בהמלצת רופא.
- לשימוש בחלל הפה בלבד. אין לבלוע. שטוף ביסודיות במים אם התכשיר בא במגע עם העיניים או עם האוזניים.
- במקרה של תגובה אלרגית קשה, עליך להפסיק השימוש ולגשת מיד לקבלת עזרה. ראה 'תופעות לוואי'.
- משחות שיניים עלולות לפגום בפעילות של שטיפת הפה. לאחר צחצוח השיניים, שטוף את הפה ביסודיות עם מים והמתן 5 דקות לפני השימוש בקורסודיל לשטיפת הפה. לחילופין, אתה יכול להשתמש בשטיפת הפה בזמן אחר של היום.
- אין להלבין בדים שהיו במגע עם שטיפת הפה.
- עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים והלשון. ראה 'תופעות לוואי'.
- ייתכן שיחול שינוי בתחושת הטעם או שתורגש תחושת צריבה, עקצוץ או נימול בחלל הפה. ראה סעיף 4 'תופעות לוואי'.

ילדים ומתבגרים

התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל לגיל 12 שנה. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא לפני השימוש.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

ניתן להשתמש בתרופה אם את בהריון או מניקה.

מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה
מקרוגולגליצרול הידרוקסיסטארט עלול לגרום לתגובות בעור.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר. השתמש רק אם הסוגר על הפקק נמצא בשלמותו לפני הפתיחה. המינון המקובל בדרך כלל: השתמש פעמיים ביום. מלא את הפקק עד לקו 10 מ"ל. שטוף את הפה ביסודיות למשך דקה אחת ולאחר מכן תירק. דלקת חניכיים: מומלץ להשתמש במשך חודש. כיבים בפה ופטרית פה: המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר החלמה. דלקות פה בעקבות שיניים תותבות: נקה והשרה את התותבות שלך בשטיפת הפה למשך 15 דקות פעמיים ביום. לאחר ניתוחים דנטליים: לשטוף לפי הוראות רופא השיניים שלך. אם התסמינים שלך נמשכים, פנה לרופא. אין לעבור על המנה המומלצת. אין לבלוע. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. אין לקחת תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקורסודיל שטיפת פה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. הפסק להשתמש בשטיפת הפה ופנה מיד לעזרה רפואית אם מופיעה אצלך פריחה, נפיחות בשפתיים, בלשון, בגרון או בפנים או אם יש לך קשיי נשימה. תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד. הפסק להשתמש בשטיפת הפה ופנה לרופא אם מופיע אצלך גירוי בפה, כאב או נפיחות של פנים-הלחיים. תופעות אלו אמורות לחלוף עם הפסקת הטיפול. תופעות לוואי אחרות שיכולות להתרחש: הכתמה זמנית של הלשון. תופעה זו נעלמת עם הפסקת הטיפול. הכתמה זמנית של השיניים. זו בדרך כלל ניתנת להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול למנוע הכתמה באמצעות המנעות משתיית תה, קפה או יין אדום - במיוחד שעה לאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה 'כיצד תשתמש בתרופה'). אם הכתמה נותרת היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השיננית. אתה יכול לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר לניקוי תותבות. ייתכן שתבחין בשינוי בחוש הטעם, בתחושת צריבה, בנימול, או בעקצוץ בלשון כאשר אתה משתמש בשטיפת הפה לראשונה. זה בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול. אם מתרחש קילוף של העור בתוך הפה, דלל את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים. אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <http://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן מתחת ל-25°C. לשימוש עד 6 חודשים מהפתיחה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם -

Purified water, Sorbitol liquid, Glycerol, Macrogolglycerol hydroxystearate and Optamint 291616 flavour.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה -

תמיסה שקופה, צלולה עד מעט עכורה, בריח מנטה. בקבוק של 300 מ"ל עם פקק מתברג. בעל הרישום **ויבואן**: הלאון סי.אייץ'. ישראל בע"מ, ת.ד. 3256, פתח תקווה. נערך באוגוסט 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 029-96-21599. לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים. סימני מסחר בבעלות או בזכיינות של Haleon. © Haleon 2024 או הזכייין.