



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) – 1986
يُسَوَّق الدواء بدون وصفة طبيب

ميكروليت, حقنة شرجية

تحتوي كل أنبوبة من 5 ملل على:
جليسيرول (Glycerol) 0.625 g
سيترات الصوديوم (Sodium citrate) 0.450 g
لوريل سلفو أسيتات الصوديوم (Sodium laurylsulphoacetate) 0.045 g

مواد غير فعّالة ومسببات الحساسية (مستأجرة) في الدواء – انظر للبند 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مُلخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
عليك استعمال الدواء حسب التعليمات في بند 3 "كيفية استعمال الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.
عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد عدة أيام.

1. لأي غرض مُخصّص الدواء؟

الدواء مُخصّص للتخفيف من الإمساك.
الفصيلة العلاجية: مُسهل
ميكروليت يعمل عن طريق تليين البراز بواسطة امتصاص الماء للأمعاء.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجي) للمواد الفعّالة (جليسيرول, سيترات الصوديوم, لوريل سلفو أسيتات الصوديوم) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6).
- كنت تعاني من مرض أمعاء التهابي مثل، التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.
- عانيت في مرة من المرات من وضع شديد من مشاكل في الأمعاء أو عدم راحة في المعدة (عدا عن الإمساك).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بميكروليت, أخبر الطبيب إذا:

- كنت بحاجة لمكملات الفيتامينات لأي سبب كان.
- كنت تستعمل ميكروليت بوتيرة مرتفعة للغاية ولفترة طويلة, قد يُسبب هذا إسهال وفقدان سوائل. إذا حدث هذا, يجب إيقاف استعمال الدواء واستشارة الطبيب.

الاستعمال المتواصل قد يؤدي إلى التعلق بالمُسَهِّلات.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ, أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة, أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية, أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. على وجه الخصوص إذا كنت تأخذ:
• مكملات الفيتامينات, لأن استعمال ميكروليت بشكل متواصل قد يضر بامتصاص فيتامينات مُعينة في جسمك.

الحمل والإرضاع

يمكن استعمال ميكروليت بشكل آمن في فترة الحمل, قبل الولادة وفي فترة الإرضاع, لكن كما في كل دواء, استشريري الطبيب قبل الاستعمال.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي ميكروليت على سوربات الذي قد يُسبب تهيج موضعي في الجلد (على سبيل المثال التهاب الجلد التماسي).

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك أن تتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.
الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي:
لدى البالغين والأطفال من جيل 6 سنوات وما فوق: أنبوبة واحدة عند الحاجة.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

تعليمات الفتح:

يجب تدوير اللسان الموجود في طرف الفوهة ومن ثم سحبه حتى يتمزق اللسان.

طريقة الاستعمال:

يجب ترطيب الفوهة بالقليل من المادة. يوصى بالاستلقاء على الجانب والركبتين ملتصقتين بالبطن أو الجلوس على كرسي المرحاض, ومن ثم إدخال الفوهة بكاملها بلطف لفتحة الشرج وعصر الأنبوبة حتى تفرغ. يجب الاستمرار بالعصر أثناء إخراج الفوهة من فتحة الشرج, تجنباً لإعادة سحب المادة.

لدى الأطفال, يجب إدخال الفوهة حتى نصف طولها فقط لداخل فتحة الشرج. لا يجوز الاستعمال في حال وجود مقاومة أثناء الإدخال.

يجب استعمال الدواء فوراً من لحظة فتح الأنبوبة. إذا كانت هنالك بقايا, يجب التخلص منها.

يعمل ميكروليت عادةً خلال 15 حتى 60 دقيقة. يوصى بالبقاء قريباً من المرحاض بعد استعمال الدواء.
لا يجوز استعمال ميكروليت في أوقات متقاربة أو لأكثر من أسبوع بشكل متواصل بدون استشارة الطبيب.

كيف تستطيع المساهمة في نجاح العلاج؟

يجب الحرص على شرب سوائل خلال اليوم (6-8 كؤوس) التي تساعد في تليين البراز, نظام غذائي غني بالألياف وممارسة الرياضة البدنية.

إذا استعملت أكثر مما تحتاج من ميكروليت

- إن استعمال ميكروليت بشكل مفرط قد يُسبب الإسهال وفقدان سوائل. إذا حدث هذا, أخبر الطبيب.
- إن استعمال ميكروليت بوتيرة مرتفعة للغاية ولفترة طويلة قد يُسبب تهيج فتحة الشرج وقد يُقلل من امتصاص الفيتامينات من الطعام.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

ككل أي دواء, قد يؤدي استعمال ميكروليت لأعراض جانبية. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

إن استعمال ميكروليت عادةً لا يُسبب أعراضاً جانبية, لكن أحياناً قد يظهر تشنج طفيف في البطن.

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه للاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية, أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال نظرهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقبؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP.) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: خزّن تحت 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تُساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركبات الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Sorbitol, water, potassium sorbate

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

سائل شفاف في أنبوبة بلاستيكية من 5 ملل.

أحجام العبوات المصادق عليها: 12, 100 أو 500 أنبوبة في العبوة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوّقة.

تم التنقيح في آب 2021 حسب تعليمات وزارة الصحة
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 047-20-23432-03

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مخصص لكلا الجنسين.
المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض, شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل