



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אוקסופורין® 400, קפליית בשחרור מושהה

כל קפלייה מכילה פנטוקסיפילין (Pentoxifylline) 400 מ"ג.
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת לשיפור זרימת הדם בכלי הדם היקפיים.
קבוצה תרפויטית: נגזרת מתילקסנטיין.
התרופה שייכת לקבוצת תרופות המרחיבות כלי דם היקפיים. היא פועלת באמצעות הגברת זרימת הדם לזרועות ולרגליים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (פנטוקסיפילין), לתרופות דומות אחרות כגון תאופילין או אמינופילין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). סימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, התנפחות השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון
 - יש לך בעיות לב או אם עברת לאחרונה התקף לב
 - אתה סובל מפלפיטציות חמורות (דופק מהיר מאוד ולא סדיר)
 - אתה סובל משבץ המלווה בדימום מוחי (cerebral hemorrhage)
 - אתה סובל מדימום תוך עיני (retinal hemorrhage)
- אין להשתמש בתרופה אם אחד או יותר מהמצבים המפורטים לעיל נכון לגביך. אם אינך בטוח, היוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת **אוקסופורין**.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באוקסופורין, ספר לרופא אם:

- אתה מרגיש סחרחורת או עילפון במעבר מהיר משכיבה לעמידה או לישיבה (לחץ דם נמוך)
 - אתה סובל מבעיות באספקת דם ללב שנגרמות מהתקשות או היצרות עורקים
 - אתה סובל מבעיות בכבד או בכליה
- אם אינך בטוח אם אחד או יותר מהמצבים המפורטים לעיל נכונים לגביך, היוועץ ברופא לפני נטילת **אוקסופורין**.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. זאת מכיוון שאוקסופורין עלול להשפיע על פעילותן של תרופות מסוימות. בנוסף, תרופות מסוימות עלולות להשפיע על פעילות אוקסופורין.

במיוחד ספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקח:

אוקסופורין עלול להגביר את השפעתן של התרופות הבאות:

- תרופות לטיפול בסוכרת כולל תרופות במתן דרך הפה או אינסולין
- תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה
- תרופות נוגדות קרישת דם כגון וארפרין

השימוש בתרופות הבאות בשילוב עם אוקסופורין, מעלה את הסיכוי להופעת תופעות לוואי:

- קטורולאק (לשיכוך כאב)
- תאופילין (לטיפול בצפצופים בנשימה או קשיי נשימה)
- ציפרופלוקסצין (לטיפול בזיהומים חיידיקיים)
- תרופות המשמשות למניעת היווצרות קרישי דם
- סימטידין (לטיפול בצרבת וכיבי קיבה)

שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול אוקסופורין עם או מייד לאחר ארוחות.

היריון והנקה

אין ליטול אוקסופורין אם את בהיריון. היוועצי ברופא או ברוקח לפני נטילת כל תרופה. אם את מניקה או מתכננת להניק, היוועצי ברופא או ברוקח לפני נטילת אוקסופורין. זאת משום שכמויות קטנות מאוד של התרופה עלולות לעבור לחלב אם.

נהיגה ושימוש במכוונת

בזמן השימוש בתרופה זו אתה עלול לחוש סחרחורת. אם זה קורה, אין לנהוג או להשתמש בכלים או במכוונת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה לקטוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חזקה מדי, אל תשנה את המינון בעצמך, היוועץ ברופא. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא: **מבוגרים כולל קשישים:** המינון ההתחלתי המקובל הוא קפלייה אחת (400 מ"ג) 3 פעמים ביום. הרופא שלך עשוי להוריד את המינון לקפלייה אחת פעמיים ביום. **מטופלים הסובלים מבעיות כליה:** ייתכן שהרופא שלך ירשום לך מינון נמוך יותר. **ילדים: אוקסופורין אינו מיועד לטיפול בילדים. אין לעבור על המנה המומלצת.**

צורת הנטילה:

- יש לבלוע את התרופה בשלמותה עם הרבה נוזלים, עם או מייד לאחר הארוחה.
- קו החלוקה על גבי הקפלייה אינו מיועד לחצייה. אסור לחצות, לכתוש או ללעוס את הקפלייה, מאחר שהתרופה בשחרור מושהה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר, אתה עלול לסבול מהתופעות הבאות: לחץ דם נמוך, ישנוניות, פרכוסים או דופק לא סדיר. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באוקסופורין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מייד לרופא או לבית החולים בהופעת:

- תגובה אלרגית. הסימנים יכולים לכלול: פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, התנפחות השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון
- דימום תת עורי
- קיא דמי או דם בצואה
- מצב הנקרא דלקת לא זיהומית של קרום המוח (aseptic meningitis). הסימנים כוללים כאב ראש, נוקשות צוואר, כאב עיניים או חוסר נוחות בחשיפה לאור בהיר

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם אתה סובל מהתופעות הבאות:

- יש לך נטייה לשטפי דם יותר מהרגיל. ייתכן עקב הפרעה בדם (תרומבוציטופניה)
- עלייה בדופק או דופק מהיר (טכיקרדיה)
- כאב חזה (תעוקת חזה – אנגינה פקטוריס)
- דופק לא סדיר (פלפיטציות)
- זיהומים תכופים כגון חום, צמרמורות חמורות, כאב גרון או כיבים בפה. ייתכן שאלו סימנים של בעיה בדם הנקראת לויקופניה
- אתה סובל מזיהומים יותר מהרגיל. זה יכול להיגרם עקב ירידה במספר תאי הדם הלבנים (נויטרופניה)

תופעות לוואי נוספות

- בחילה או הקאה, שלשול
- כאב ראש, סחרחורת או עילפון
- הסמקה
- אי שקט, בעיות שינה
- מחלה בה קיימת חסימה של דרכי המרה בכבד (intrahepatic cholestasis). הסימנים כוללים צהבת, פריחה או חום וצבע השתן הופך להיות כהה יותר
- חוסר נוחות או נפיחות בבטן
- פריחה
- עצירות
- הפרשת רוק מוגברת מהרגיל

בדיקות דם

אוקסופורין יכול לשנות את רמות אנזימי הכבד, הניתנים לזיהוי בבדיקות דם. מצב זה יכול להעיד על בעיות בתפקוד הכבד.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אחסן במקום חשוך, מתחת ל-25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), macrogol 400, erythrosine aluminum lake (E127), indigo carmine aluminum lake (E132), quinoline yellow aluminum lake (E104), carnauba wax

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

קפלייה בצבע ורוד, עם קו חלוקה בשני הצדדים.
גודלי אריזה מאושרים: 50 או 100 קפליות. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

נערך בפברואר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 011-41-23858-00
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

יצרן ובעל רישום: דקסל בע"מ, רחוב דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל