



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أوكسوپورين 400, حبسولات ذات تحرير متائي

تحتوي كل حبسولة بينتوكسيفيلين (Pentoxifylline) 400 ملغ
المواد غير الفعالة ومُسببات الحساسية في الدواء - أنظر بند 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة عن جزء
من مركبات الدواء".

إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت
لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء لأجلك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مماثلة لحالتك.

1. لأي غرض مُخصَّص الدواء؟

يُستعمل الدواء لتحسين جريان الدم في الأوعية الدموية المحيطية.

الفصيلة العلاجية: مشتقة مثيلكسانتين.

يتبع الدواء فصيلة أدوية التي توسع الأوعية الدموية المحيطية. فهو يعمل عن طريق زيادة جريان الدم للأذرع والرجلين.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- إذا كنت حساسًا (أرجي) للمادة الفعالة (بينتوكسيفيلين)، لأدوية شبيهة أخرى مثل ثيوفيلين أو أمينوفيلين أو لأي واحد من المركبات الإضافية في التي يحتويها الدواء (أنظر بند 6). علامات رد الفعل الأرجي تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو التنفس، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحلق أو اللسان
 - كانت لديك مشاكل في القلب أو مررت مؤخرًا بنوبة قلبية
 - كنت تعاني من خفقان قلب وخيم (نظم قلب سريع جدًا وغير منتظم)
 - كنت تعاني من سكتة دماغية المصحوبة بنزيف دماغي (cerebral hemorrhage)
 - كنت تعاني من نزيف داخل العين (retinal hemorrhage)
- لا يجوز استعمال الدواء إذا كان واحد أو أكثر من الحالات المفصلة أعلاه ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، إستشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوكسوپورين.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

قبل العلاج بأوكسوپورين، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تتعسر بالدوار أو الإغماء عند الانتقال السريع من الإستلقاء للوقوف أو الجلوس (ضغط دم منخفض)
 - كنت تعاني من مشاكل في تزويد الدم للقلب الناجمة عن تصلب أو تضيق الشرايين
 - كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلية
- إذا لم تكن متأكدًا إذا كان واحد أو أكثر من الحالات المفصلة أعلاه ينطبق عليك، إستشر الطبيب قبل تناول أوكسوپورين .

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر
الطبيب أو الصيدلي بذلك. ذلك لأن أوكسوپورين قد يؤثر على فعالية أدوية معينة. بالإضافة لذلك، أدوية معينة قد تؤثر
على فعالية أوكسوپورين.

أخبر الطبيب أو الصيدلي خصوصًا إذا كنت تأخذ:

قد يزيد أوكسوپورين من تأثير الأدوية التالية:

- أدوية لعلاج السكري يشمل أدوية بالإعطاء الفموي أو الإنسولين
 - أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع
 - أدوية مضادة لتخثر الدم مثل وارفارين
- استعمال الأدوية التالية بتوليفة مع أوكسوپورين، يزيد الإختطار لظهور الأعراض الجانبية:
- كيتورولاك (لتسكين الألم)
 - ثيوفيلين (لعلاج الصفير أثناء التنفس أو مشاكل التنفس)
 - سيبروفلوكساسين (لعلاج تلوثات بكتيرية)
 - أدوية المُستعملة لمنع تشكّل خثرات الدم
 - سيمتيدين (لعلاج الحرقة وقرحة المعدة)

استعمال الدواء والغذاء

يجب تناول أوكسبوريين مع الوجبات أو بعدها مباشرةً.

الحمل والإرضاع

لا يجوز تناول أوكسبوريين إذا كنت حامل. إستشيرى الطبيب أو الصيدلى قبل تناول كل دواء. إذا كنت مرضعة أو تخططين للحمل, إستشيرى الطبيب أو الصيدلى قبل تناول أوكسبوريين, ذلك لأن كميات صغيرة جداً من الدواء قد تنتقل لحليب الأم.

السياقة واستعمال الآلات

خلال استعمال هذا الدواء قد تشعر بالدوار. إذا حدث ذلك, لا يجوز السياقة أو استعمال الأدوات والآلات .

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على لاكتوز. إذا قيل لك في السابق من قبل الطبيب أنه يوجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة, يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلى إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

إذا كنت تشعر أن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم, لا تقم بتغيير الجرعة من تلقاء نفسك, إستشر الطبيب .

يتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط. الجرعة المتبعة بشكل عام هي:

البالغين يشمل المسنين: الجرعة الابتدائية المتبعة هي حبسولة واحدة (400 ملغ) 3 مرات في اليوم. قد يقلل طبيبك الجرعة إلى حبسولة واحدة مرتين في اليوم.

معالجون الذين يعانون من مشاكل في الكلية: من الممكن أن يصف لك طبيبك جرعة أقل.

الأطفال: أوكسبوريين غير مُخصَّص للعلاج لدى الأطفال.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول:

- يجب بلع الدواء بكامله مع الكثير من السوائل, مع الوجبة أو بعدها مباشرةً.
- خط التقسيم الموجود على ظهر الحبسولة غير مُخصَّص للشطر. لا يجوز شطر, سحق أو مضغ الحبسولة, لأن الدواء ذو تحرير متأنى.

إذا تناولت بالخطأ جرعة أكبر من اللازم

إذا أفرطت بتناول الجرعة, قد تعاني من التأثيرات التالية: ضغط دم منخفض, نعاس, اختلاجات أو نظم قلب غير منتظم . إذا أفرطت بتناول الجرعة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء, توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد, لا يجوز تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة المنسية. يجب المواظبة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب. حتى إذا طراً تحسن على حالتك الصحية, لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام **يجب التحقق من المصنق والجرعة في كل مرة** تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلى.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء, قد يسبب استعمال أوكسبوريين أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع لقراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تصاب بأي واحدة منها.

يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو المستشفى عند ظهور:

- رد فعل أرجي. العلامات قد تشمل: طفح, مشاكل في البلع أو التنفس, انتفاخ الشفتين, الوجه, الحلق أو اللسان
- نزيف تحت الجلد
- قيء دموي أو دم في البراز
- حالة التي تسمى التهاب السحايا العقيم (aseptic meningitis). العلامات تشمل ألم رأس, تصلب الرقبة, ألم عيني أو قلة راحة عند التعرض لضوء ساطع

- يجب التوجه إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:**
- لديك ميل لحدوث كدمات بسهولة أكثر من المعتاد. ربما بسبب اضطراب في الدم (قلة الصفائح)
 - ارتفاع في نظم القلب أو نظم قلب سريع (تسرع القلب)
 - ألم صدر (ذبحة صدرية)
 - نظم قلب غير منتظم (خفقان)
 - تلوّثات متكررة مثل حمى، قشعريرة وخيمة، ألم حلق أو تقرحات في الفم. من الممكن أن تكون هذه علامات لمشكلة في الدم المسماة قلة كريات الدم البيضاء
 - كنت تعاني من تلوّثات أكثر من المعتاد. قد ينتج هذا عقب انخفاض عدد كريات الدم البيضاء (قلة العدلات)

أعراض جانبية إضافية

- غثيان أو تقيؤ، إسهال
- صداع، دوّار أو إغماء
- تورّد
- إهتياج، مشاكل في النوم
- مرض يحدث فيه انسداد في القنوات الصفراوية في الكبد (intrahepatic cholestasis). العلامات تشمل اليرقان، طفح او حمى ولون البول يصبح أغمق
- قلة راحة أو إنتفاخ في البطن
- طفح
- إمساك
- زيادة إفراز اللعاب بشكل غير إعتيادي

فحوصات دم

قد يغيّر أوكسوپورين مستويات إنزيمات الكبد، التي يمكن تشخيصها في فحوصات الدم. قد تدل هذه الحالة على مشاكل في وظائف الكبد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة طبيبك.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי לקב" www.health.gov.il الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة الذي يوجّه إلى الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق دخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ونظّمهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך תפוגה) الذي يظهر على ظهر العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين في مكان مظلم، تحت 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تُساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا :

Lactose monohydrate, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), macrogol 400, erythrosine aluminum lake (E127), indigo carmine aluminum lake (E132), quinoline yellow aluminum lake (E104), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

حبسولة بلون وردي، مع خط شطر في الجهتين.
أحجام العبوات المُصادق عليها: 50 أو 100 حبسولة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوّقة.

تم التقيح في شباط 2021 حسب تعليمات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 011-41-23858-00

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة, تمّ صياغة نشرة المعلومات هذه بلسان المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مخصص لأبناء كلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض., شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل