

أچيسپور® شامپو

تحتوي كل قنينة على: بيفونازول Bifonazole 1% w/w

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج الأمراض الفطرية في فروة الرأس، مثل النخالية المبرقشة - Pityriasis versicolor (فطريات الشمس) وإلتهاب الجلد الدهني (Seborrheic dermatitis).

الفصيلة العلاجية: مضاد للفطريات واسع النطاق من فصيلة الإيميدازولات.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألبرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- يجب إجراء متابعة مكثفة للمتعالجين الذين يستعملون وارفارين warfarin

قبل العلاج بـ أچيسپور أخبر الطبيب إذا

- عانيت من رد فعل تحسسي من أي مستحضر مضاد للفطريات

الأطفال والمراهقون

يتبين من تحليل المعطيات السريرية أن الإستعمال لدى الرضع والأطفال الصغار يجب أن يتم تحت إشراف طبي.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بشكل خاص إذا كنت تستعمل وارفارين المستعمل لمنع تخثر الدم ولعلاج تخثر الدم.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يجوز إستعمال الدواء في فترة الحمل أو الإرضاع بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا توجد شواهد ما قبل سريرية على حدوث ضرر في خصوبة المرأة أو الرجل.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا يوجد ما يمنع من السياقة أو تشغيل ماكينات خطيرة أثناء إستعمال الدواء.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على 33.8 غرام من مادة Sodium lauryl sulfate في كل 100 غرام من الدواء، والتي قد تسبب أعراضاً جانبية جلدية موضعية مثل الشعور بالوخز أو الحرق. قد تتفاقم حدة الأعراض الجانبية الجلدية عند ملامسة منتج آخر يُستعمل لعلاج نفس المنطقة.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو: ثلاث مرأت في الأسبوع.

في كل علاج، يجب غسل فروة الرأس مرتين. يجب خض القنينة جيداً، إستعمال كمية محددة من شامپو الشعر، وغسل وفرك الجلد المصاب بـ أچيسپور شامپو والإنتظار لمدة 5 دقائق قبل الشطف. تأكد من فرك الجلد نفسه جيداً وليس الشعر فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

مدة الإستعمال القصوى هي 4 أسابيع. إذا لم يطرأ تحسّن على حالتك، يجب التوجه إلى الطبيب مرة أخرى. للإستعمال الخارجي فقط. لا يجوز البلع. يجب الخض جيداً قبل الإستعمال. يجب تجنب ملامسة المستحضر للعينين. تجنب الإستعمال المشترك للمناشف مع أشخاص آخرين، نظراً لوجود تخوّف لإنتقال التلوث الفطري. إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفلك بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت إستعمال الدواء فلا يجوز إستعمال مقدار دوائي مضاعف. إستعمل المقدار الدوائي التالي في الوقت المعتاد وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أجيبيور شامبو قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

كما هو الحال مع إستعمال أدوية أخرى، هناك أشخاص لديهم حساسية لهذا الدواء. إذا كنت حساساً، فقد يظهر رد الفعل التحسسي بعد وقت قصير من إستعمال المستحضر. إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي، توقف عن إستعمال المستحضر فوراً وتوجه إلى الطبيب أو لعلاج طبي.

تشمل الأعراض الجانبية التحسسية:

- طفح • صعوبة في البلع أو التنفس • إنتفاخ في الشفتين، في الوجه، في الحنجرة أو اللسان
 - ضعف، دوار، إغماء • غثيان
- بعد إستعمال الدواء من الجائز أن تقاسي من الأعراض الجانبية التالية:
- تهيج طفيف أو حرقة • إحمرار • تقشر
- أعراض جانبية إضافية محتملة:

- شعور بحرقة، ألم أو حكة • طفح، إحمرار، جفاف • مظهر الجلد ناعم أو رطب • إنتفاخ، حويصلات، شرى

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ شركة باداجيس عبر العنوان التالي: Padagis.co.il

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب التخزين في مكان بارد بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.
- بعد الفتح لأول مرة يمكن الإستعمال لمدة 6 أشهر بما لا يتجاوز تاريخ إنتهاء الصلاحية
- خزّن في العلبة الأصلية.

(6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:
Sodium lauryl sulfate, Sodium laureth sulfate, Ethyl alcohol, Cocamidopropylamine oxide, Cocamide diethanolamine, Lactic acid, Jessica MOD 1, Purified water.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
- قنينة بلاستيكية تحتوي على 100 ميليلتر أجيبيور شامبو.
- اسم المنتج وصاحب الإمتياز: وكالات باداجيس إسرائيل م.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهام.
- تم إعداد هذه النشرة في شباط 2025 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 126-23-26745
- من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- أجيبيور هو علامة تجارية مسجلة بملكية باداجيس إسرائيل فارماسوتيكيا م.ض.