

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

هيمليبرا 30 ملغ/ملل

هيمليبرا 150 ملغ/ملل

محلول للحقن

التركيب:

تحتوي كل قارورة على:

(emicizumab) إيميسيزوماب

*المعلومات عن مركبات غير فعّالة، أنظر البند 6 – "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.

1) لم أعد هذا الدواء؟

هيمليبرا معدّ كعلاج روتيني لمنع حالات نزيف أو لتقليل وتيرة شيوخ حالات النزف لدى مرضى الهيموفيليا من نوع A (نقص خلقي في عامل التخثر 8) مع أو بدون مثبطات للعامل 8.

المجموعة العلاجيّة: مستحضرات مضادة للنزيف.

يحتوي هيمليبرا على المادة الفعّالة إيميسيزوماب (emicizumab). تنتمي المادة الفعّالة لمجموعة الأدوية التي تُدعى "مضادات أحادية النسيلة" (monoclonal antibodies). مضادات أحادية النسيلة هي نوع من البروتين الذي يُشخص ويرتبط بهدف في الجسم.

هيموفيليا A هي حالة خلقيّة ناتجة عن نقص في العامل 8، الذي هو مادة ضرورية ومطلوبة للدم للتخثر ولإيقاف أي نزيف.

كيف يعمل هيمليبرا:

أجسام قسم من مرضى هيموفيليا A قد تطوّر مثبطات للعامل 8 (أجسام مضادة للعامل 8) التي توقف عمل بدائل العامل 8.

يُعيد هيمليبرا عمل العامل 8 (بشكله الفعّال) الناقص الضروري لتخثر دم ناجع. بنية هيمليبرا مختلفة عن العامل 8، لذلك هيمليبرا لا يتأثر بمثبطات العامل 8.

2) قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

وُجدت لديك حساسيّة للمادّة الفعّالة إيميسيزوماب أو لأحد المركّبات الإضافيّة التي يحتويها الدواء (أنظر البند 6 – "معلومات إضافية").

إذا لم تكن متأكّداً، استشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال هيمليبرا.

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستخدام الدواء

قبل بدء استعمال هيمليبيرا، من المهم جداً التحدث مع الطبيب المُعالج بخصوص استعمال "أدوية تجاوزية" (bypassing agents) (أدوية التي تساعد الدم على التخثر لكن تعمل بصورة مختلفة عن العامل 8). وذلك لأن العلاج بـ "الأدوية التجاوزية" قد يتغير عند الحصول على هيمليبيرا. أمثلة لأدوية تجاوزية تشمل activated prothrombin complex concentrate (aPCC) والعامل 7a ماثسوب (rFVIIa). قد تحدث أعراض جانبية خطيرة وأعراض قد تكون مهددة للحياة عندما يتم استعمال aPCC للمُعالجين الذين يحصلون على هيمليبيرا أيضاً:

أعراض جانبية خطيرة محتملة عند استعمال aPCC عندما يتناولون هيمليبيرا:

- تدمر خلايا الدم الحمراء (اعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري - thrombotic microangiopathy)
 - إنها حالة خطيرة وذات احتمال أن تكون مهددة للحياة.
 - لدى المرضى مع حالة كهذه، من الممكن أن يتضرر جدار الأوعية ويمكن تطوّر جلطات دموية في أوعية الدم الصغيرة. في حالات معينة، هذا ممكن أن يُسبب ضرراً للكلية ولأعضاء أخرى.
 - انتبه، إذا كنت معرضاً لاحتمال كبير أن تحدث لك حالة كهذه (قد عانيت في السابق من حالة كهذه، أو إذا عانى أحد أفراد العائلة من ذلك)، أو إذا كنت تتناول أدوية التي يمكن أن ترفع من احتمال تطوّر حالة كهذه، مثل سيكلوسبورين، كوينين أو تاكروليموس.
 - من المهم معرفة أعراض تدمر خلايا الدم الحمراء، إذا كانت تطوّر لديك حالة كهذه (أنظر البند 4 – أعراض جانبية، لقائمة الأعراض).

أوقف استعمال هيمليبيرا و- aPCC وأخبر الطبيب فوراً إذا لاحظت أنت أو من يعالجك بأي عرض لتدمر خلايا الدم الحمراء.

- جلطات دموية (انصمام خثاري - thromboembolism)
 - في حالات نادرة، من الممكن تكوّن جلطة دموية داخل الوعاء الدموي والتسبب في انسداده، وهذا الأمر قد يشكل خطراً على الحياة.
 - من المهم معرفة أعراض الجلطات الدموية الداخلية هذه، في حال تكونت (أنظر البند 4 – أعراض جانبية، لقائمة الأعراض).

أوقف استعمال هيمليبيرا و- aPCC وأخبر الطبيب فوراً إذا لاحظت أنت أو من يعالجك بأي عرض لجلطات دموية في الأوعية الدموية.

معلومات هامة إضافية بخصوص هيمليبيرا

- تشكّل الأجسام المضادة (immunogenicity)

- قد تلاحظ أن درجة النزيف لا يتم السيطرة عليها بواسطة جرعة المستحضر الموصوفة لك. قد ينجم هذا العرض نتيجة تشكّل أجسام مضادة ضد المستحضر.
- أخبر الطبيب على الفور إذا لاحظت أنت أو معالجك زيادة في الأنزفة. من شأن طبيبك أن يغيّر العلاج في حال لم يعد المستحضر مفيداً لك.

الأطفال والمراهقون:

لا توجد معلومات بخصوص الأطفال تحت جيل السنة.

الفحوصات والمتابعة:

أخبر الطبيب المُعالج إذا كنت تستعمل هيمليبيرا قبل إجراء الفحوص المخبرية التي تقيس كيفية تخثر دمك. هذا لأن وجود هيمليبيرا في الدم قد يغيّر جزءاً من الفحوص المخبرية ويسبب نتائج غير دقيقة.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص إذا كنت تتناول:

- استعمال الأدوية التجاوزية (bypassing agents) عند استعمال هيمليبيرا
 - قبل البدء في استعمال هيمليبيرا، استشر الطبيب المُعالج وتتبع تعليماته بحذر بخصوص متى عليك استعمال الأدوية التجاوزية، وبخصوص الجرعة ووتيرة الاستعمال. يزيد هيمليبيرا قدرة دمك على التخثر. لذلك قد تكون الجرعة المطلوبة من الدواء التجاوزي أقل من الجرعة التي استعملتها قبل بدء استعمال هيمليبيرا.

- استعمال aPCC فقط إذا لم يكن ممكناً استعمال علاج آخر. إذا طُلب aPCC، استشر الطبيب المُعالج إذا كنت تعتقد بأنك بحاجة لأكثر من 50 وحدة/كغم من aPCC في المُجمل. لمعلومات إضافية بخصوص استعمال aPCC أثناء استعمال هيمليبرا، أنظر البند 2: "أعراض جانبية خطيرة محتملة عند استعمال aPCC عند الحصول على هيمليبرا".
- على الرغم من الخبرة المحدودة في إعطاء متوازي لأدوية تمنع تحلل جلطات دموية (مُضاداً حلّ الفبرين - anti-fibrinolytics) مع aPCC أو rFVIIa لدى المرضى المُتعالجين ب هيمليبرا، يجب عليك أن تعرف عن وجود احتمال لحالات تخثر في استعمال anti-fibrinolytics عند إعطائه عبر الوريد سوياً مع aPCC أو rFVIIa.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

- استعملي وسائل منع حمل ناجعة خلال فترة العلاج ب هيمليبرا ولمدة 6 أشهر بعد الحقنة الأخيرة من هيمليبرا.
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لتحمل، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هيمليبرا. سيقوم الطبيب بفحص الفائدة من تناول هيمليبرا مقابل احتمال الخطر لطفلك.

السياقة واستعمال الماكينات:

ليس من المتوقع أن يؤثر هيمليبرا على قدرتك على السياقة أو استعمال الماكينات.

(3) كيف تستعمل الدواء؟

يتم تزويد هيمليبرا بقوارير أحادية الاستعمال كمحلول جاهز للاستعمال الذي لا يحتاج إلى تخفيفه. طبيب مؤهل لعلاج المرضى الذين يعانون من هيموفيليا، سيبدأ بعلاجك ب هيمليبرا. يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

حفظ السجل

في كل مرة تستعمل فيها هيمليبرا، فم بنوثيق اسم الدواء ورقم الدفعة.

الجرعة المتبعة

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

تتعلق جرعة هيمليبرا بوزنك، وسيقوم الطبيب المُعالج بحساب الكمية (بالمليغرام) والكمية المطابقة من محلول هيمليبرا (بالميليلتر) للحقن:

- جرعة التحميل: الأسبوع 1 حتى 4: الجرعة هي 3 ميليغرام لكل كيلو غرام وزن جسم، بحقنة واحدة في الأسبوع.
- جرعة المداومة: الأسبوع 5 وما بعد: الجرعة هي 1.5 ميليغرام لكل كيلو غرام وزن جسم، بحقنة واحدة في الأسبوع أو 3 ميليغرام لكل كيلو غرام وزن جسم، بحقنة كل أسبوعين، أو 6 ميليغرام لكل كيلو غرام وزن جسم، بحقنة كل أربعة أسابيع.

القرار فيما إذا عليك استعمال جرعة مداومة تبلغ 1.5 ملغ/كغم مرة في الأسبوع، 3 ملغ/كغم كل أسبوعين أو 6 ملغ/كغم كل أربعة أسابيع يجب أن يتم اتخاذه بالتشاور مع الطبيب المُعالج، وربما أيضاً مع من يقومونك بعلاجك.

يُمنع دمج تراكيز مختلفة من هيمليبرا (30 ملغ/ملل و- 150 ملغ/ملل) بحقنة واحدة عند تحضير الحجم الكلي للحقن.

كمية محلول هيمليبرا المُعطاة في كل حقنة يجب أن لا تتجاوز 2 ملل.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة إعطاء هيمليبرا

إذا كنت تحقن هيمليبرا بنفسك أو إذا كان مُعالجك يقوم بحقن هيمليبرا لك، يجب عليك أو على مُعالجك قراءة التعليمات بتمعن واتباع الارشادات لاستعمال هيمليبرا الموجودة في كراسة المعلومات وتحتوي على تعليمات الحقن. يمكن الحصول على الكراسة عن طريق الطاقم الطبي وهي متوفرة في كل حين في قاعدة بيانات الأدوية الموجودة على موقع الإنترنت التابع لوزارة الصحة (www.health.gov.il) وعلى موقع "روش إسرائيل" (www.roche.co.il).

- يُعطى هيمليبرا عن طريق حقنة تحت الجلد.
- سيشرح ويوضح لك الطبيب المُعالج أو الممرضة كيفية حقن هيمليبرا.

- بعد أن حصلت على إرشاد، بإمكانك حقن الدواء في بيتك، بنفسك أو بمساعدة مُعالجك.
- من أجل إدخال الإبرة بصورة صحيحة تحت الجلد، قم بصنع طية جلد محررة في موضع الحقن التنظيف بواسطة يدك الحرة. قرص الجلد هو أمر مهم حتى تضمن أنك تحقن تحت الجلد (داخل نسيج دهني) لكن ليس عميقًا جدًا (داخل العضلة). الحقن في العضلة قد يُسبب شعورًا بالانزعاج.
- جهز واحقن في ظروف نظيفة وخالية من الجراثيم بمساعدة "طريقة معقمة". سيقوم الطبيب المُعالج أو الممرضة بتوفير هذه المعلومات لك بخصوص هذا الأمر.

أين تحقن هيمليبرا

- سيشرح لك الطبيب المُعالج الأماكن الملائمة في الجسم لحقن هيمليبرا.
- المناطق الموصى بها للحقن هي: الجزء الأمامي من الخصرتين (البطن السفلي)، الجزء الخارجي العلوي من الذراعين، أو في مقدمة الفخذين. احقن فقط في المناطق الموصى بها.
- استعمل في كل عملية حقن، موضعًا مختلفًا في الجسم من الذي استعملته في عملية الحقن الأخيرة.
- يُمنع الحقن في المناطق التي يكون فيها الجلد أحمر اللون، مُصابًا، حساسًا، صلبًا أو المناطق التي يوجد فيها شامات أو ندبات.
- عند استعمال هيمليبرا، يجب حقن أدوية أخرى التي يتم حقنها تحت الجلد في منطقة أخرى.

استعمال المحاقن والإبر

- يجب استعمال محقنة، إبرة نقل مع مصفاة ذات 5 ميكرومتر وإبرة حقن لسحب محلول هيمليبرا من القارورة إلى داخل المحقنة وحقنها تحت الجلد.
- محاقن، إبر للنقل مع مصفاة، وإبر للحقن ليست متوفرة في هذه العبوة. لمعلومات إضافية أنظر البند 6 "ماذا تحتاج من أجل حقن هيمليبرا وهو غير مشمول في هذه العبوة".
- تأكد من أنك تستعمل إبرة جديدة للحقن في كل حقنة وتخلص منها بعد كل استعمال واحد.
- يجب استعمال محقنة 1 ملل للحقن حتى 1 ملل محلول هيمليبرا.
- يجب استعمال محقنة 2 حتى 3 ملل لحقن أكثر من 1 ملل وحتى 2 ملل محلول هيمليبرا.

استعمال للأطفال والمراهقين

- يمكن استعمال هيمليبرا للأطفال والمراهقين في كل الأجيال.
- يستطيع الولد حقن نفسه ب هيمليبرا إذا وافق الطبيب أو ممرضة الولد وأهله أو المُعالج على ذلك.
- غير موصى بالحقن الذاتي للأطفال دون جيل 7 سنوات.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى مما يجب

إذا استعملت جرعة أعلى مما كان يجب عليك من هيمليبرا، أخبر طبيبك فوراً عن ذلك. وذلك لأنك قد تكون في خطر أعلى لتطور أعراض جانبية لديك مثل جلطات دموية. استعمل هيمليبرا دائماً حسب تعليمات الطبيب، وافحص مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا لم تكن متأكدًا.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

- إذا نسيت حقنتك المخططة، احقن الجرعة التي نسيتها بأسرع وقت ممكن قبل يوم حقنتك التالية المُخطط لها. بعد ذلك، استمر في حقن الدواء بحسب التخطيط. لا تحقن جرعتين في نفس اليوم من أجل التعويض عن الجرعة التي نسيتها.
- إذا لم تكن متأكدًا ماذا يجب عليك أن تفعل، اسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا توقف استعمال هيمليبرا دون استشارة طبيبك. إذا توقفت عن استعمال هيمليبرا، قد لا تكون محميًا من حالات النزف.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي

4) الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال هيمليبرا أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

أعراض جانبية خطيرة عند استعمال aPCC وعند الحصول على هيمليبرا

أوقف استعمال هيمليبرا و aPCC وأخبر الطبيب فورًا إذا لاحظت أنت أو مُعالجك إحدى الأعراض التالية:

- **تدمر خلايا الدم الحمراء (اعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري - thrombotic microangiopathy):**
 - ارتباك، وهن، انتفاخ الذراعين والساقين، لون أصفر في الجلد والعينين، ألم خفيف في البطن أو في الظهر، غثيان، تقيؤات أو انخفاض في التبول – هذه الأعراض قد تكون أعراضًا لتدمر خلايا الدم الحمراء.
- **جلطات دموية (thromboembolism):**
 - انتفاخ، حرارة (دفع)، ألم أو احمرار – هذه الأعراض قد تكون أعراضًا لتخثر دموي في الوريد قريبًا من سطح الجلد.
 - صداع، انعدام الإحساس في الوجه، ألم أو انتفاخ في العين، إصابة في الرؤية - هذه الأعراض قد تكون أعراضًا لتخثر دموي في الوريد خلف عينيك.
 - اسوداد الجلد - هذا العرض قد يكون عرضًا لضرر خطير في النسيج الجلدي.

أعراض جانبية إضافية عند استعمال هيمليبرا

أعراض جانبية شائعة جدًا (قد تؤثر على أكثر من مستعمل واحد من عشرة):

- رد فعل في موضع الحقن (احمرار، حكة، ألم)
- صداع
- ألم في المفاصل

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على 10-1 مستعملين من بين 100):

- سخونة
- آلام عضلات
- إسهال
- طفح حاك أو شرى (urticaria)
- طفح جلدي

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- تدمر خلايا الدم الحمراء (اعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري - thrombotic microangiopathy)
- تخثر دموي في الوريد خلف العين (cavernous sinus thrombosis)
- ضرر خطير في نسيج الجلد (skin necrosis)
- تخثر دموي في الوريد قريبًا من سطح الجلد (superficial thrombophlebitis)
- تورم الوجه، اللسان و/أو الحنجرة و/أو صعوبة في الابتلاع، أو شرى مع صعوبة في التنفس، ما يشير إلى وذمة وعائية
- قلة التأثير أو انخفاض في الاستجابة للعلاج
- رد فعل تحسسي

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة الخارجية والكارورة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب خزن الدواء في الثلاجة في درجة حرارة 2°C - 8°C . يُمنع التجميد.
- يجب خزن الدواء في العبوة الأصلية لحمايته من الضوء.
- بعد إخراجها من الثلاجة، يمكن حفظ قارورة لم يتم فتحها في درجة حرارة الغرفة (تحت درجة حرارة 30°C) حتى 7 أيام.
- بعد خزن القارورة في درجة حرارة الغرفة، يمكن إعادة القوارير التي لم يتم فتحها إلى الثلاجة. المدة الإجمالية التي يمكن فيها خزن الدواء في درجة حرارة الغرفة، يجب أن لا تتجاوز الـ 7 أيام.
- تخلص من القوارير التي تم حفظها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 7 أيام أو التي تعرضت لدرجة حرارة أعلى من 30°C .
- بعد نقله من القارورة إلى المحقنة، يجب استعمال هيمليبيرا بشكل فوري. يُمنع حفظ المحلول داخل المحقنة في الثلاجة.
- قبل استعمال الدواء، افحص المحلول لوجود جزيئات أو لتغيير في اللون. يجب أن يكون المحلول عديم اللون حتى لون مائل للأصفر. يُمنع استعمال الدواء إذا لاحظت أنه متعكر، إذا تغير لونه، أو إذا كان يحتوي على جزيئات ظاهرة للعين.
- قم برمي كل محلول بصورة ملائمة إذا لم يتم استعماله. يُمنع إلقاء الأدوية أو في سلة المهملات في البيت أو في مياه الصرف الصحي. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة لها. إن هذه الخطوات ستساعد في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

المادة الفعالة إيميسيزوماب (emicizumab). تحتوي كل قارورة من هيمليبيرا على 30 ملغ (1 ملل بتركيز 30 ملغ/ملل)، 60 ملغ (0.4 ملل بتركيز 150 ملغ/ملل)، 105 ملغ (0.7 ملل بتركيز 150 ملغ/ملل) أو 150 ملغ (1 ملل بتركيز 150 ملغ/ملل) من إيميسيزوماب*.

* قد لا يتم تسويق كل تراكيز الدواء.

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

L-arginine, L-histidine, Poloxamer 188, L-aspartic acid and Water for injection.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

هيمليبيرا هو محلول للحقن. المحلول عديم اللون حتى لون مائل للأصفر.

تحتوي كل عبوة من هيمليبيرا على قارورة زجاجية واحدة.

ماذا مطلوب من أجل حقن هيمليبيرا وهو غير مشمول في هذه العبوة

محقنة، إبرة ونقل وإبرة حقن من أجل نقل محلول هيمليبيرا من القارورة إلى المحقنة وحقنه تحت الجلد (أنظر كراسة المعلومات التي تحتوي على إرشادات لاستعمال هيمليبيرا. يمكن الحصول على الكراسة عن طريق الطاقم الطبي وهي متوفرة في كل حين في قاعدة بيانات الأدوية الموجودة على موقع الإنترنت التابع لوزارة الصحة (www.health.gov.il) وعلى موقع "روش إسرائيل" (www.roshe.co.il)).

المحاقن

- محقنة 1 ملل: شفافة، ذات تدرج 0.01 ملل، أو
- محقنة 2 أو 3 ملل: شفافة، ذات تدرج 0.1 ملل

الإبر

- إبرة نقل مع فلتر: 18 G gauge، بطول 35 ملم ($1\frac{1}{2}$ ")، تحتوي على مصفاة ذات 5 ميكرومتر ومن المفضل أن تكون ذات طرف شبه مثلوم وكذلك،
- إبرة حقن: 26 G gauge (المدى المقبول: 25-27 gauge)، مفضل بطول 9 ملم ($3/8$ ") أو حد أقصى 13 ملم ($1/2$ ")، ومن المفضل أن تشمل واقي للأمان

صاحب التسجيل وعنوانه: روش فارماتسيبتكا (إسرائيل) م.ض.، ص.ب. 6391، هود هشارون 4524079.

اسم المنتج وعنوانه: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, CH-4058 Basel,

Switzerland

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

هيمليبرا 30 ملغ/ملل: 161-18-35414-00

هيمليبرا 150 ملغ/ملل: 161-19-35415-00

تم إعداد هذه النشرة في أيار 2025.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.