

**Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами
(препараты) - 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

Корсодил ополаскиватель для полости рта 0,2% w/v

Активное вещество:

Хлоргексидин диглюконат 0.2% w/v

Chlorhexidine digluconate 0.2% w/v

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в пункте 2 под заголовком «Важная информация о некоторых ингредиентах препарата», а также в пункте 6.

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата.

Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Следует применять препарат в соответствии с указаниями в разделе «Как следует применять препарат» данной инструкции.

1. Для чего предназначен препарат?

- Для замедления образования зубного налета
- В качестве вспомогательного средства для лечения и профилактики воспаления десен (гингивита)
- В качестве вспомогательного средства для поддержания гигиены полости рта
- Способствует заживлению десен после операций или других стоматологических процедур
- Для ухода за полостью рта при наличии язв и воспалений на фоне ношения зубных протезов, а также при грибковом поражении в полости рта

Фармакологическая группа: Антисептик

2. Перед применением препарата

Противопоказания к применению препарата:

| |
|--|
| Гиперчувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому другому компоненту, содержащемуся в препарате – перечень дополнительных ингредиентов приведен в разделе 6. |
|--|

Особые предостережения относительно применения препарата:

- **Не применять детям младше 12 лет**, кроме как по рекомендации врача.
- **Препарат предназначен для использования исключительно в полости рта.** Не глотать. В случае попадания препарата в глаза или в уши следует тщательно промыть водой.
- **В случае тяжелой аллергической реакции прекратите применение препарата и немедленно обратитесь за помощью.** Смотрите раздел «Побочные явления».
- **Зубные пасты могут негативно сказаться на эффективности ополаскивателя.** После чистки зубов тщательно прополощите рот водой и подождите 5 минут, прежде чем использовать Корсодил ополаскиватель для полости рта. Можно также пользоваться ополаскивателем в другое время дня.

- **Не отбеливайте текстильные изделия**, которые были в контакте с ополаскивателем для рта.
- **Может возникнуть временное окрашивание зубов и языка.** Смотрите раздел “Побочные явления”.
- Не исключено **изменение вкусового восприятия, либо жжение, покалывание или онемение в полости рта** - см. раздел 4. – “Побочные эффекты”.

Дети и подростки

Препарат предназначен для лиц от 12 лет и старше. По поводу применения у детей младше этого возраста, следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и кормление грудью

Можно применять препарат, если Вы беременны или кормите грудью.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

Макроголглицерол гидроксистеарат может вызвать кожные реакции.

3. Как следует применять препарат?

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа применения препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Препарат пригоден к использованию при условии целостности колпачка до вскрытия.

Рекомендуемые дозы:

Применяйте два раза в день. Наполните крышку до отметки 10 мл. Тщательно прополощите рот в течение одной минуты, а затем выплюньте.

Воспаление десен: Рекомендуется применять в течение одного месяца.

Афты (язвы) во рту и грибок полости рта: Продолжайте применять в течение 2 дней после заживления.

Воспаление в ротовой полости, вызванное зубными протезами: Почистите Ваши протезы и погружайте их в ополаскиватель для рта два раза в день в течение 15 минут.

После стоматологических операций: Промывайте в соответствии с указаниями Вашего стоматолога.

Если симптомы у Вас продолжают, **обратитесь к врачу.**

Не превышать рекомендуемую дозу.

Не глотать.

В случае передозировки или случайного приема препарата внутрь ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приёмный покой больницы, взяв с собой упаковку препарата.

Не применяйте препараты в темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. В случае необходимости пользуйтесь очками.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные явления

Как и при лечении любым лекарством, применение Корсодила ополаскивателя для рта способно вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Прекратите использование ополаскивателя для полости рта и **немедленно обратитесь за медицинской помощью** при появлении следующих симптомов: **сыпь, отечность губ, языка, горла или лица, либо затрудненное дыхание**. Эти явления могут быть симптомами тяжелой аллергической реакции, которая очень редко встречается.

Прекратите применение ополаскивателя для рта и **обратитесь к врачу**, если у Вас появились **раздражение ротовой полости, болезненность или припухлость внутренней стороны щеки**.

Перечисленные явления должны пройти с прекращением применения препарата.

Другие побочные явления, которые могут возникнуть:

Временное окрашивание языка. Данное явление проходит с прекращением лечения.

Временное окрашивание зубов. Обычно это устраняется чисткой зубов. Вы можете избежать окрашивания, воздержавшись от употребления чая, кофе или красного вина – особенно в течение первого часа после применения ополаскивателя, а также ежедневной чисткой зубов зубной пастой (см. раздел “Как следует применять препарат”). Если окрашивание сохраняется, его можно устранить чисткой и полированием зубов у стоматолога или гигиениста. Ваши зубные протезы Вы можете почистить с помощью средства для чистки протезов.

Возможно, вы заметите **изменение вкусового восприятия, ощутите жжение, онемение или покалывание в языке** при первом использовании ополаскивателя.

Обычно это прекращается в ходе лечения.

Если возникло **слущивание слизистой оболочки полости рта**, разбавьте ополаскиватель для рта равным количеством воды.

В случае появления или усугубления какого-либо из побочных эффектов, либо проявления побочного эффекта, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку “Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения”, находящуюся на домашней странице сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на форму онлайн, предназначенную для отчета о побочных явлениях либо по ссылке: <http://sideeffects.health.gov.il>

5. Как хранить препарат?

Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача. Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре ниже +25°C. **Применять в течение 6 месяцев с момента открытия флакона.**

6. Дополнительная информация

В дополнение к активному веществу, препарат также содержит -

Purified water, Sorbitol liquid, Glycerol, Macrogolglycerol hydroxystearate and Optamint 291616 flavour.

Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки - прозрачный раствор, от ясного до слегка мутного, с запахом мяты. Флакон с завинчивающейся крышкой, содержащий 300 мл препарата.

Владелец лицензии и импортер: Haleon Си-Эйч ЛТД Израиль, п. я. 3256, Петах-Тиква (HALEON CH ISRAEL LTD).

Отредактировано в августе 2024 г.

Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 029-96-21599