



• אם יש לך מחלת לב, להפחתת הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים (כגון התקף לב, שבץ, ניתוח להגברת זרימת הדם בלב, או אשפוז עקב כאב בחזה).

קבוצה תרופוטיית: אוטימיב שייך לקבוצת תרופות הנקראות CAI (מעכבי ספיגת כולסטרול), אשר מעכבות את ספיגת הכולסטרול במעיים.
אטורבאסטאטין שייך לקבוצת תרופות הנקראת סטטינים, שהם מעכבי האנזים HMG-CoA דהידראט.

טורד פועל להורדת הכולסטרול שלך בשתי דרכים. הוא מפחית ספיגת כולסטרול במערכת העיכול שלך, ובנוסף מפחית את כמות הכולסטרול שהגוף שלך מייצר בעצמו. כולסטרול הוא אחד מתוך מספר חומרים שומניים הנמצאים בדם הדם. סך הכולסטרול שלך עשוי ברובו מכולסטרול HDL ו-LDL.

כולסטרול LDL נקרא לעיתים קרובות כולסטרול "רע" מכיוון שהוא יכול להצטבר בדפנות העורקים שלך וליצור רובד (פלאק). בסופו של דבר, הצטברות של רובד זה עשויה להוביל להיצרות של העורקים. היצרות זו עשויה להאט או לחסום זרימת דם לאיברים חיוניים כגון הלב והמוח. חסימה זו של זרימת דם עשויה לגרום להתקף לב או שבץ.

כולסטרול HDL נקרא לעיתים קרובות כולסטרול "טוב" מכיוון שהוא מסייע במניעת הצטברות של הכולסטרול הרע בעורקים ומגן מפני מחלת לב.

טריגליצרידים הם צורה אחרת של שומן בדם שלך אשר עשויה להגדיל את הסיכון שלך למחלת לב.

טורד אינו עוזר לך לרדת במשקל.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בטורד אם:

- הינך גריש (אלרגי) לאוטימיב, אטורבאסטאטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- יש לך או היתה לך אי פעם מחלה המשפיעה על הכבד.
- היו לך בדיקות דם חריגות בלתי מוסברות של תפקוד הכבד.
- הינך אישה המסוגלת להרות ואיך משתמשת באמצעי מניעה אמין.
- הינך בהיריון, מנסה להיכנס להיריון או הינך מניקה.
- הינך משתמש בשילוב של גלקאפרבי/פיברטאטסבר בטופול צבהתה C.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על **טורד**. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא שלך או הרוקח.
- תרופה זו רשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה.
- טורד** מיועד לטיפול במבוגרים מעל גיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

- טורד משמש**, בשילוב עם דיאטה,
- לטיפול בהיפרכולסטרולמיה ראשונית (הטרזווגינית משפחתית ולא-משפחתית) או להורדת רמות גבוהות של שומנים בדם (היפרליפידמיה משולבת) בחולים מבוגרים אשר:
 - אינם מאוזנים על ידי סטטין לבד; או
 - כבר מטופלים בסטטין ואוטימיב
- לטיפול בחולים מבוגרים עם מחלה תורשתית (היפרכולסטרולמיה משפחתית המוזיגונית). ייתכן שהטיפול ייתכן בשילוב עם טיפולים אחרים.

• אתה נוטל או נטלת במהלך 7 הימים האחרונים תרופה הנקראת חומצה פוסידית (fusidic acid) (תרופה לטיפול ביהודם זיידק) דרך הפה או בזרימה. השילוב של חומצה פוסידית ו**טורד** עלול להוביל לבעיות שרירים (רדומילויזיס).

• יש לך או היתה לך מיאסטניה (מחלה של חולשת שרירים כללית, הכוללת במקרים מסוימים שרירים המשמשים בעת נשימה), או מיאסטניה עינית (מחלה הגורמת לחולשת שריר העין) שכן סטטינים עלולים לעיתים להחמיר את המצב או להוביל להתרחשות של מיאסטניה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

פנה לרופא שלך מיד אם הינך חווה כאב לא מוסבר בשריר, רגישות או חולשה בזמן נטילת טורד. זאת מכיוון שבמקרים נדירים, בעיות בשריר עשויות להיות חמורות, כולל פירוק שריר הגורם לנזק כלליה. ידוע כי אטורבאסטאטין גורם לבעיות שרירים ודווחו גם מקרים של בעיות שרירים עם אוטימיב.

כמו כן, ספר לרופא שלך או לרוקח אם יש לך חולשת שרירים שהיא בקועה. ייתכן שדרשו בדיקות ותרופות נוספות על מנת לאבחן ולטפל בכך.

בדוק עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת **טורד**:

- אם יש לך רשלן בשימתי חמור.
- אם אחד מאלה תקף לגביך (או שאינך בטוח), דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת **טורד**, מכיוון שהרופא שלך יטען לבצע בדיקת דם לפני הטיפול ב**טורד** וייתכן שגם במהלכו, על מנת לזהות את הסיכון שלך לתופעות לוואי הקשורות לשרירים. ידוע כי הסיכון לתופעות לוואי הקשורות לשרירים, לדוגמה, פירוק שרירים (רדומילויזיס), עולה כאשר תרופות מסוימות נטילות באותו זמן (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

כאשר אתה נוטל תרופה זו, הרופא שלך שגויח אתר מצבר בקפידה אם יש לך סוכרת או שאתה בסיכון לפתח סוכרת, אתה צפוי להיות בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם שלך, הינך סובל מעודף משקל ויש לך לחץ-דם גבוה.

ספר לרופא שלך לגבי כל המצבים הרפואיים שלך כולל אלרגיות.

יש להימנע משימוש משולב ב**טורד** ופיברטים (תרופות להורדת כולסטרול) מכיוון שהשילוב של **טורד** ופיברטים לבד נחקר.

ילדים ומתבגרים

טורד אינו מיועד לילדים ולמתבגרים.

אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בטורד

לפני הטיפול בטורד, ספר לרופא שלך אם:

- היה לך שבץ קודם עם דימום מוחי, או שיש לך כיסים קטנים של נוזל במוח מאירועים מוחיים קודמים.
- יש לך בעיות בכליות.

יש לך תת-פעילות של בלוטת התירואיד (היפותרואידים), היו לך מיחמושים או כאבים חמורים בלתי מוסברים בשרירים, היסטוריה אישית או משפחתית של בעיות שרירים.

היו לך בעיות קודמות בשרירים במהלך טיפול בתרופות אחרות להורדת כולסטרול (לדוגמה, "סטטינים" אחרים או תרופות מסוג "פיברטים").

• אתה שותה באופן קבוע כמות גדולה של אלכוהול.

- ציקלופורין (תרופה המשמשת לעיתים קרובות בחולים שבערו השתלה).
- ציקלופורין (תרופה המשמשת לעיתים קרובות בחולים שבערו השתלה).
- אריתרומיצין, קלריתרומיצין, טליתרומיצין, חומצה נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת חומר זה.

- טקוקואזול, איטראקואזול, וריקואזול, פלוקואזול, פוסאקואזול (תרופות לזיהומים פטרייתיים).
- מאפיברויל, פיברטים אחרים, חומצה ניקוטינית, קולסטפול, כולסטיראמין (תרופות לזיוסות ממות שומן).
- מספר חוסמי תעלות סידן המשמשים לטיפול בתעוקת לב (אנגיה) או בלחץ-דם גבוה, לדוגמה, אמלודיפיין, דילטיאזם.
- דיגוקסין, וראפאמיל, אמידארון (תרופות לזיוסות קצב הלב שלך).

- תרופות לטיפול ב-HIV, לדוגמה, ריטונאביר, לופינאביר, אטאזנאביר, אינדונאביר, דארונאביר, השילוב של טיפראנאביר/ריטונאביר, וכו' (תרופות לטיפול באיידס).
- תרופות מסוימות לטיפול בדלקת כבד מסוג C, לדוגמה, טלפרביר, בוספרביר והשילוב של אלבסביר/גרוזופרביר.
- דפטומיצין (תרופה המשמשת לטיפול בזיהומים מסוכנים של העור ומנהה העור ובבקטרמיה).

****אם עליך ליטול חומצה פוסידית דרך הפה על מנת לטפל בזיהום חיידקי, יהיה עליך להפסיק באופן זמני את הטיפול בתרופה זו. הרופא שלך יאמר לך מתי בטוח להתחיל מחדש ליטול טורד. נטילת טורד יחד עם חומצה פוסידית עלולה לעיתים חדות להוביל לחולשה, לרגישות או לכאב שרירים (רדומילויזיס). ראה מידע נוסף אודות רדומילויזיס בסעיף 4 "תופעות לוואי."**

• תרופות אחרות הידועות באינטראקציה שלהן עם **טורד**:

- אמצעי מניעה לנטילה דרך הפה (תרופות למניעת היריון).
- סטיריפנטול (תרופה נוגדת פרכוסים לאפילפסיה).
- סימטידין (תרופה המשמשת לטיפול בצרבת ובכיבי קיבה).

• פנאון (משכך כאבים).

• נוגדי חומצה (תרופות לבעיות עיכול המכילות אלומיניום או מגנזיום).

• וארפרין, פנפרוקומון, אצנוקואמרואל או פלואינדיון (תרופות למניעת קרישי דם).

• קולכיצין (משמש לטיפול בשיגדון).

St John's wort (תרופה לטיפול בדיאון).

יש להימנע משימוש משולב ב**טורד** ופיברטים (תרופות להורדת כולסטרול) מכיוון שהשילוב של **טורד** ופיברטים לבד נחקר.

ילדים ומתבגרים

טורד אינו מיועד לילדים ולמתבגרים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ישנן תרופות שעשויות לשנות את ההשפעה של **טורד** או שההשפעה שלהן עשויה להשתנות על ידי **טורד** (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה"). אינטראקציות מסוג זה עשויה לגרום לאחת מהתרופות או לשתיהן להיות פחות יעילות. לחלופין, הדבר עלול להגביר את הסיכון או מידת החומרה של תופעות הלוואי, או שאת משתמש באמצעים אמניים למניעת היריון. אם נכנסת להיריון בזמן נטילת **טורד**, הפסיקי ליטול אותו מיד וספרי לרופא שלך.

- ציקלופורין (תרופה המשמשת לעיתים קרובות בחולים שבערו השתלה).
- אריתרומיצין, קלריתרומיצין, טליתרומיצין, חומצה נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת חומר זה.

נהיגה ושימוש במכוונת
טורד אינו צפוי להשפיע על היכולת שלך לנהוג או להפעיל מכוונת. מרות זאת, יש לקחת בחשבון שחלק מהאנשים עשויים לחשו סחרחורת לאחר נטילת **טורד**.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טורד מכיל לטעם. אם הרופא אמר לך שיש לך אי-סבילות לסוגים מסוימים של סוכר, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל תרופה זו.

טורד מכיל פחות מ-1 מ"לימול (23 מ"ג) נתון לכל טבליה, כלומר נחשב ל"נטולת נתך".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא שלך או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

הרופא שלך יחליט מהו חוקק הטבליה המתאים עבורך, בהסתמך על הטיפול הנוכחי שלך ועל סטטוס הסיכון האישי שלך.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

- לפני תחילת הטיפול ב**טורד**, עליך להיות בדיאטה להורדת הכולסטרול שלך.

- עליך להתמיד בדיאטה זו להורדת כולסטרול בזמן נטילת **טורד**.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

טבליה אחת של **טורד** דרך הפה פעם ביום.

ניתן ליטול **טורד** בכל שעה משעות היום. ניתן ליטול אותו עם או ללא מזון.

על מנת להקל על הבלעיה, ניתן, במידת הצורך, לחזות את הטבליה לשימוש מייד. יש לבלוע את שני החצאים יחד מיד לאחר החציה.

אין מידע לגבי כתישה/לועיסה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם הרופא שלך רשם לך **טורד** בשילוב עם כולסטיראמין או קושר חומצת מרה אחר (תרופות להורדת כולסטרול), עליך ליטול **טורד** לפחות שעתיים לפני זו 4 שעות אחרי נטילת קושר חומצות המרה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר של טורד

אנא צור קשר עם הרופא שלך או הרוקח. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול טורד

אין ליטול מנה נוספת; קח את הכמות הרגילה שלך של **טורד** בזמן הרגיל ביום למחרת.

עליך להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת טורד

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא שלך.

אין ליטול תרופות בשילובן יש לבדוק תזונת והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו תופה, השימוש ב**טורד** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

06A25

אם אתה חווה אי אלו מתופעות הלוואי החמורות או התסמינים הבאים, הפסק ליטול את הטבליות שלך וספר לרופא שלך מיד או גש לחדר המיון בכלבית החולים הקרוב אליך ביותר.

- תגובה אלרגית חמורה אשר גורמת להתנפחות של הפנים, הלשון והגרון, ואשר עשויה לגרום לקושי גדול בנשימה.
- מחלה חמורה עם קילוף חמור ונפיחות של העור, שלפוחיות על העור, הפה, העיניים, אברי המין וחום; פריחה בעור עם כתמים ורודים-אדומים, במיוחד על כפות הידיים או כפות הרגליים, אשר עלולים להפוך לשלפוחיות.

- חולשת שרירים, רגישות, כאב או קרע בשריר, שינוי לעצב אדום-חום בשתן ובמיחד, אם באותו זמן, אתה מרגיש לא טוב או שיש לך חום גבוה, הדבר עלול להיגרם על ידי פירוק שריר חריג אשר עשוי להיות מסכן חיים ולהוביל לבעיות בכליות.

- תסמנות דמויית מחלת זאבת (הכוללת פריחה, הפרעות במפרקים ובעיות במחלת זאבת (הדם)).

עליך להתייעץ עם הרופא שלך בהקדם האפשרי אם אתה חווה בעיות של דימום או חבלה לא צפויים או חריגים, מכיוון שהדבר עשוי לרמז על בעיה בכבד.

תופעות לוואי נוספות:

- תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10% משתמשים מתוך 100:
- שלשול
- כאבי שרירים

תופעות לוואי שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10% משתמשים מתוך 1,000:

- שפעת
- דיכאון קשיי שניה; הפרעת שניה
- סחרחורת; כאב ראש; תחושת קוצץ
- קצב לב איטי
- גלי חום
- קוצר נשימה
- כאב בטן; נפיחות בטנית; עצירות; קשיי עיכול; גזים; תנעות מעי תכופות; דלקת של הקיבה; בחילה; אי-נוחות בקיבה; בטן רגיזה
- אקנה; סרפדת
- כאבי מפרקים; כאב גב; התכווצויות ברגליים; עייפות, התכווצויות, או חולשת שרירים; כאבים בידיים וברגליים
- חום גבוה, הרופא שלך יפקח עליך בזמן שאתה נוטל תרופה זו
- עלייה בערכים בבדיקות דם מעבדתיות מסוימות של תפקוד הכבד או השריר (CK)
- עלייה במשקל

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טורף נקבעה):

- מיאסטניה גרביס (מחלה הגורמת לחולשת שרירים כללית, כולל במקרים מסוימים שרירים המשמשים בעת נשימה)
- מיאסטניה עינית (מחלה הגורמת לחולשת שריר העין) שוחח עם הרופא שלך אם אתה חווה חולשה בדרותות או ברגליים שממחירה לאחר תקופות של פעילות, ראייה כפולה או ציחית עפעפיים, קושי בבליעה או קוצר נשימה.
- בנוסף, תופעות הלוואי הבאות דווחו באנשים שנטלו טורד, או טבליות אוטימיב או טבליות אטורבאסטאטין:** תגובות אלרגיות כולל התנפחות של הפנים, שפתיים, הלשון, ו/או הגרון, אשר עשויים לגרום לקושי בנשימה או בבליעה (אשר דורשים טיפול מידי)

- פריחה אדומה מוגבהת, לעיתים עם חבורות בצורת לוח מטה
- בעיות בכבד
- שיעול
- צרבת

- ירידה בתיאיבון; אובדן תיאבון
- לחץ-דם גבוה
- פריחה בעור וגרד; תגובות אלרגיות הכוללות פריחה וסרפדת
- פגיעה בידי

- אבנים במרה או דלקת בכיס המרה (אשר עשוי לגרום לכאב בטן, בחילה, הקאות)
- דלקת בבלבל, לעיתים קרובות עם כאב בטן חמור
- ירידה בספירת תאי דם, אשר עשויה לגרום לחבלה/לדימום (תרומבוציטופניה)
- דלקת של תעלות האף; דימום מהאף
- אבניה במרה או כאב בחזה; כאב גרון
- עליית וירידות ברמות הסוכר בדם (אם יש לך סוכרת, עליך להמשיך לנטר בהירות את רמת הסוכר שלך בדם)
- סינים
- חוסר תחושה או קוצץ באצבעות ובבהונות
- ירידה בתחושת כאב או מגע
- שינוי בחוש הטעם; יובש בפה
- אובדן זיכרון
- לצלולים באוזניים; ירידה בשמיעה

- הקאות
- גירוק
- נשימה שיער
- עלייה בחום הגוף
- בדיקות שתן חיוביות לתאי דם לבנים
- טשטוש ראייה; הפרעות ראייה
- קצב לב איטי
- גינקומסטיה (הגדלת החזה בגברים ונשים)

תופעות לוואי אפשריות שדווחו בעת השימוש בתרופות אחרות מקבוצת הסטטינים:

- קשיים בתפקוד מיני
- דיכאון
- בעיות בנשימה כולל שיעול מתמשך ו/או קוצר נשימה או חום
- סוכרת. הדבר סביר יותר אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם. הינך בעודף משקל ויש לך לחץ-דם גבוה. הרופא שלך יפקח עליך בזמן שאתה נוטל תרופה זו
- עלייה בערכים בבדיקות דם מעבדתיות מסוימות של תפקוד הכבד או השריר (CK)
- עלייה במשקל

תופעות לוואי אפשריות שדווחו בעת השימוש בתרופות אחרות מקבוצת הסטטינים:

- קשיים בתפקוד מיני
- דיכאון
- בעיות בנשימה כולל שיעול מתמשך ו/או קוצר נשימה או חום
- סוכרת. הדבר סביר יותר אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם. הינך בעודף משקל ויש לך לחץ-דם גבוה. הרופא שלך יפקח עליך בזמן שאתה נוטל תרופה זו
- עלייה בערכים בבדיקות דם מעבדתיות מסוימות של תפקוד הכבד או השריר (CK)
- עלייה במשקל

תופעות לוואי אפשריות שדווחו באנשים שנטלו טורד, או טבליות אוטימיב או טבליות אטורבאסטאטין:

- תגובות אלרגיות כולל התנפחות של הפנים, שפתיים, הלשון, ו/או הגרון, אשר עשויים לגרום לקושי בנשימה או בבליעה (אשר דורשים טיפול מידי)

5. כיצד לאחסן טורד?

- מנע הרעלהו תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחף להישג ידם וטווח ארייתם של ילדים ו/או חינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש ב**טורד** לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- הנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל-25°C ובמקום מוגן מאור.

- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה מכיל טורד?

נוסף על המרכיבים הפעילים טורד מכיל גם:

טורד 10/10:

Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; Croscarmellose sodium; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Povidone 30; Magnesium stearate; Hydroxypropyl cellulose; Sodium lauryl sulfate; Polysorbate 80.

טורד 10/20:

Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; Croscarmellose sodium; Magnesium stearate; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Brown coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, talc, Macrogel/PEG 400, Iron oxide yellow, Iron oxide red, Iron oxide black); Hydroxypropyl cellulose; Povidone 30; Sodium lauryl sulfate; Polysorbate 80.

טורד 10/40:

Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; Croscarmellose sodium; Magnesium stearate; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Brown coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, talc, Macrogel/PEG 400, Iron oxide yellow, Iron oxide black); Hydroxypropyl cellulose; Povidone 30; Sodium lauryl sulfate; Polysorbate 80.

טורד 10/80:

Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; Croscarmellose sodium; Magnesium stearate; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Brown coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, talc, Macrogel/PEG 400, Iron oxide yellow, Iron oxide red, Iron oxide black); Povidone 30; Sodium lauryl sulfate; Polysorbate 80; Sodium lauryl sulfate.

טורד 10/10:

Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Magnesium stearate; Croscarmellose sodium; Hydroxypropyl cellulose; Polysorbate 80; Povidone 30; Sodium lauryl sulfate.

ההצפיה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ