

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## **סיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/ג 850 מ"ג** **טבליות מצופות**

כל טבליה מצופה מכילה:

Sitagliptin (as hydrochloride monohydrate) 50 mg, סיטגליפטין (כהידרוכלוריד מונוהידראט) 50 מ"ג  
Metformin Hydrochloride 850 mg, מטפורמין הידרוכלוריד 850 מ"ג

## **סיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/ג 1000 מ"ג** **טבליות מצופות**

כל טבליה מצופה מכילה:

Sitagliptin (as hydrochloride monohydrate) 50 mg, סיטגליפטין (כהידרוכלוריד מונוהידראט) 50 מ"ג  
Metformin Hydrochloride 1000 mg, מטפורמין הידרוכלוריד 1000 מ"ג

לרשימה של חומרים בלתי פעילים יש לפנות לסעיף 6 "מידע נוסף". ראה גם סעיף 2.7 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון עלון זה עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה. תרופה זו אינה מיועדת למתן בילדים מתחת לגיל 18 שנים.

### **1. למה מיועדת סיטפורמין ויטאמד?**

#### **1.1 מהי סיטפורמין ויטאמד?**

קבוצה תרפויטית: סיטגליפטין; מעכב האנזים DPP-4. מטפורמין; ביגואניד.

#### **1.2 למה משמשת סיטפורמין ויטאמד?**

**סיטפורמין ויטאמד** הינה טבליה המכילה 2 תרופות מרשם, סיטגליפטין ומטפורמין, אשר מורידות את הסוכר בדם. סיטגליפטין, הממתייך לקבוצת תרופות הנקראת מעכבי DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors), ומטפורמין, הממתייך לקבוצת התרופות ביגואנידים, פועלים יחד כדי לשלוט ברמות הסוכר בדם בחולים עם סוכרת מסוג 2, להם מתאים שילוב זה. **סיטפורמין ויטאמד** בשילוב עם דיאטה מומלצת ותוכנית אימון גופני, מיועדת להורדת רמות הסוכר בדם בחולים עם סוכרת מסוג 2.

### **2. לפני השימוש בתרופה**

#### **2.1 אין להשתמש בתרופה אם:**

- יש לך סוכרת מסוג 1.
- יש לך תפקוד כלייתי ירוד באופן חמור (הרופא שלך יגדיר מהי רמת הפגיעה בתפקוד הכלייתי שלך).
- יש לך קטואצידוזיס סוכרתי (רמות מוגברות של קטונים בדם או בשתן שלך: סיבוך של סוכרת הכולל רמות סוכר גבוהות בדם, איבוד מהיר של משקל, בחילות או הקאות).
- הינך אלרגי לכל אחד מהמרכיבים ב**סיטפורמין ויטאמד** (ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). תסמינים של תגובה אלרגית חמורה ל**סיטפורמין ויטאמד** עלולים לכלול: פריחה, כתמים בולטים אדומים על העור שלך (סרפדת) או נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון והגרון אשר עלולה לגרום לקושי בנשימה או בבליעה.

#### **2.2 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה**

**לפני תחילת הטיפול בסיטפורמין ויטאמד, ספר לרופא שלך על כל הבעיות הרפואיות שלך, כולל אם:**

- יש לך או היתה לך דלקת של הלב (פנקראטיטיס). אם היה לך פנקראטיטיס בעבר, לא ידוע אם יש לך סיכוי גבוה יותר ללקות בפנקראטיטיס בזמן נטילת **סיטפורמין ויטאמד** (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי")
- יש לך בעיות בכליה
- יש לך בעיות בכבד

- יש לך או היו אבנים בכיס המרה
  - יש לך רמות גבוהות של טריגליצרידים בדם
  - יש לך אי ספיקת לב
  - הינך שותה אלכוהול לעיתים קרובות מאד, או שותה הרבה אלכוהול תוך זמן קצר. אם הינך או היית מכור לאלכוהול
  - הינך עומד לקבל זריקת צבע או חומרי ניגוד לצורך צילום רנטגן. ייתכן ויהיה צורך להפסיק נטילת **סיטפורמין ויטאמד** לזמן קצר. היוועץ ברופא שלך מתי עליך להפסיק ליטול **סיטפורמין ויטאמד** ומתי עליך להתחיל ליטול **סיטפורמין ויטאמד** שוב. (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי")
  - יש לך רמות נמוכות של ויטמין B<sub>12</sub> בדם
  - הינך בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון (ראי סעיף 2.6 "היריון, הנקה ופוריות")
  - הינך מניקה או מתכננת להניק (ראי סעיף 2.6 "היריון, הנקה ופוריות")
  - הינך אישה שלא עברה את גיל המעבר (טרומ גיל המעבר) שאין לה וסת סדירה או כלל (ראי סעיף 2.6 "היריון, הנקה ופוריות")
- הפסק ליטול **סיטפורמין ויטאמד** וצור קשר עם הרופא שלך מיד אם יש לך כאב באיזור הבטן שלך שהינו חמור ושאינו חולף. ייתכן ותרגיש את הכאב עובר מהבטן עד הגב שלך. הכאב יכול להופיע עם או ללא הקאה. אלה עלולים להיות תסמינים של דלקת בבלב.

### 2.3 בדיקות ומעקב

- בדוק את הסוכר שלך בדם כפי שהורה לך הרופא.
- הרופא שלך ינטר את הסוכרת שלך על ידי בדיקות דם סדירות, הכוללות בדיקת רמות הסוכר שלך בדם וההמוגלובין A1C שלך.
- הרופא שלך עלול לעשות לך בדיקות דם כדי לבדוק את רמות ויטמין B<sub>12</sub>.

### 2.4 תגובות בין תרופתיות

- אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:
  - טופירמט (לטיפול בפרכוסים ומיגרנות)
  - אצטאזולאמיד (לטיפול בבצקת, גלאוקומה ומחלת ים)
  - דולוטגראביר (לטיפול בזיהום של HIV)
  - סימטידין (לטיפול באולקוס)
  - ראנולזין
  - ואנדטניב

- **סיטפורמין ויטאמד** עלולה להשפיע על אופן פעולתן של תרופות אחרות, ותרופות אחרות עלולות להשפיע על אופן פעולתה של **סיטפורמין ויטאמד**.
- הכר את התרופות שהינך נוטל. שמור רשימה של התרופות שלך והראה אותה לרופא שלך ולרוקח כשהינך מקבל תרופה חדשה.

### 2.5 שימוש בתרופה ומזון

- יש ליטול **סיטפורמין ויטאמד** עם הארוחות על מנת לסייע בהפחתת הסיכוי שלך לסבול מהפרעות במערכת העיכול.

### 2.6 היריון, הנקה ופוריות

- אם הינך בהיריון או מתכננת להרות: לא ידוע אם **סיטפורמין ויטאמד** תפגע בעובר שלך. אם הינך בהיריון, דברי עם הרופא שלך בנוגע לדרך הטובה ביותר לשלוט ברמות הסוכר שלך בדם בזמן ההיריון
- אם הינך מניקה או מתכננת להניק: לא ידוע אם **סיטפורמין ויטאמד** תעבור לחלב האם שלך. דברי עם הרופא שלך על הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך אם הינך נוטלת **סיטפורמין ויטאמד**
- אם הינך אישה שלא עברה את גיל המעבר (טרומ גיל המעבר) שאין לה וסת סדירה או כלל: **סיטפורמין ויטאמד** יכולה לגרום אצל אישה לשחרור ביצית מהשחלה (ביוץ). זה יכול להגדיל את הסיכוי שלך להיכנס להיריון. ספרי לרופא שלך מיד אם הינך נכנסת להיריון בעת נטילת **סיטפורמין ויטאמד**.

### 2.7 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- **סיטפורמין ויטאמד** מכילה נתרן. תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בטבליה, כלומר היא למעשה 'נטולת נתרן'.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

- יש להשתמש ב**סיטפורמין ויטאמד** תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
- הרופא שלך יאמר לך כמה טבליות **סיטפורמין ויטאמד** ליטול ומתי עליך ליטול אותן.
- **אין לעבור על המנה המומלצת.**
- הרופא שלך עשוי לשנות את המינון של **סיטפורמין ויטאמד** במידת הצורך.

יש ליטול **סיטפורמין ויטאמד** עם הארוחות על מנת לסייע בהפחתת הסיכוי שלך לסבול מהפרעות במערכת העיכול. הרופא שלך עשוי לומר לך ליטול **סיטפורמין ויטאמד** יחד עם תרופות מסויימות אחרות לסוכרת. סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה) עלול לקרות לעיתים קרובות יותר כאשר נוטלים **סיטפורמין ויטאמד** עם תרופות מסויימות אחרות לסוכרת (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

תרופה זו אינה מיועדת למתן בילדים מתחת לגיל 18 שנים. אין מידע לגבי כתישה, חציה, או לעיסה של טבליות אלה. ספר לרופא שלך אם אינך יכול לבלוע את טבליות **סיטפורמין ויטאמד** בשלמותן.

במידה ויש לך ירידה בתפקודי כליות, ייתכן והרופא ירשום לך מינון נמוך יותר.

- אם נטלת יותר מדי **סיטפורמין ויטאמד**, דבר עם הרופא שלך מיד.
- אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים ולהביא אריזת התרופה איתך.
- אם החמצת נטילת מנה, קח אותה ברגע שנזכרת. אם לא נזכרת עד שהגיע הזמן ליטול את המנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה וחזור ללוח זמני הנטילה הרגיל. אין ליטול 2 מנות של **סיטפורמין ויטאמד** באותו זמן.

ייתכן ותצטרך להפסיק ליטול **סיטפורמין ויטאמד** לזמן קצר. צור קשר עם הרופא שלך לקבלת הוראות אם הינך:

- מיושב (איבדת יותר מדי נוזלי גוף). התייבשות יכולה לקרות אם הינך חולה וסובל מהקאות חמורות, שלשולים או חום, או אם הינך שותה הרבה פחות נוזלים מהרגיל.
- מתכנן לעבור ניתוח.
- עומד לקבל זריקת צבע או חומר ניגוד לצורך צילום רנטגן (ראה סעיף 2.2 "אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה" וסעיף 4 "תופעות לוואי").

כאשר הגוף שלך נמצא תחת סוגים שונים של לחץ כגון חום, טראומה (כגון תאונת דרכים), זיהום או ניתוח, כמות התרופה לסוכרת שהינך זקוק לה עשויה להשתנות. ספר לרופא שלך מיד אם יש לך כל אחד מהמצבים הללו ופעל לפי הוראות הרופא שלך.

המשך בדיאטה שנרשמה לך ובתכנית הפעילות הגופנית בזמן נטילת **סיטפורמין ויטאמד**. דבר עם הרופא שלך כיצד ניתן למנוע, לזהות ולטפל בסוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה), בסוכר גבוה בדם (היפרגליקמיה), ובבעיות שיש לך בגלל הסוכרת שלך.

המשך ליטול **סיטפורמין ויטאמד** כל עוד הרופא שלך אומר לך לעשות זאת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא שלך.

**אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש במוצר זה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**סיטפורמין ויטאמד** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**סיטפורמין ויטאמד** עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל:

**4.1 חמצת לקטית. מטפורמין, אחת התרופות ב**סיטפורמין ויטאמד**, עלולה לגרום למצב נדיר (יכולה להופיע בעד 1 מתוך 10000 משתמשים) אך חמור הנקרא חמצת לקטית (lactic acidosis) (הצטברות של חומצה בדם), אשר עלול לגרום למוות. חמצת לקטית הינה מצב חירום רפואי המחייב טיפול בבית חולים.**

הפסק ליטול את **סיטפורמין ויטאמד** ודבר עם הרופא שלך מיד, אם יש לך כל אחד מהתסמינים הבאים, אשר עלולים להיות סימנים של חמצת לקטית (lactic acidosis):

- הינך מרגיש קור בידים או בכפות הרגליים שלך
- הינך מרגיש סחרחורת או מסוחרר
- יש לך דופק איטי או לא סדיר
- הינך מרגיש מאד חלש או עייף
- יש לך כאבי שרירים לא רגילים (חריגים)
- יש לך קשיי נשימה
- הינך מרגיש ישנוני או מנומנם
- יש לך כאבים בבטן, בחילות או הקאות

מרבית האנשים שהיתה להם חמצת לקטית עם מטפורמין סובלים מדברים אחרים, אשר בשילוב עם מטפורמין הובילו לחמצת לקטית. ספר לרופא שלך אם יש לך כל אחד מהבאים, מכיוון שיש לך סיכוי גבוה יותר לפתח חמצת לקטית (lactic acidosis) עם **סיטפורמין ויטאמד** אם אתה:

- סובל מבעיות חמורות בכליה או שהכליות שלך מושפעות מבדיקות רנטגן מסויימות שנעשה בהן שימוש בחומר צבע בהזרקה

- סובל מבעיות בכבד
- שותה אלכוהול לעיתים קרובות מאד או שותה כמות אלכוהול גדולה תוך זמן קצר
- סובל מהתייבשות (איבודת כמות גדולה של נוזלי גוף). הדבר עלול לקרות אם הינך חולה עם חום, הקאות או שלשולים. התייבשות יכולה לקרות גם אם אתה מזיע הרבה במהלך פעילות או פעילות גופנית ואינך שותה מספיק נוזלים
- עובר ניתוח
- סובל מהתקף לב, זיהום חמור או שבץ
- בן 65 שנים או יותר

הדרך הטובה ביותר להימנע מבעיה של חמצת לקטית ממטפורמין היא לספר לרופא שלך אם יש לך כל אחת מהבעיות ברשימה למעלה. ייתכן והרופא שלך יחליט להפסיק לך את **סיטפורמין ויטאמד** לזמן מה אם יש לך כל אחד מהדברים הללו.

#### 4.2 פנקראטיטיס (דלקת של הבלב) אשר עלולה להיות חמורה ולהוביל למוות.

בעיות רפואיות מסויימות מעלות את הסיכוי שלך לחלות בפנקראטיטיס. הפסק ליטול **סיטפורמין ויטאמד** וצור קשר עם הרופא שלך מיד אם יש לך כאב באיזור הבטן שלך שהינו חמור ושאינו חולף. ייתכן ותרגיש את הכאב עובר מהבטן עד הגב שלך. הכאב יכול להופיע עם או ללא הקאה. אלה יכולים להיות תסמינים של דלקת בבלב.

#### 4.3 אי ספיקת לב. אי ספיקת לב פירושו שליבך אינו שואב דם בצורה טובה דיה.

**לפני שהינך מתחיל ליטול סיטפורמין ויטאמד**, ספר לרופא שלך אם אי פעם היה לך אי ספיקת לב או יש לך בעיות עם הכליות שלך.

צור קשר עם הרופא שלך באופן מיידי אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים:

- קוצר נשימה מתגבר או בעיה לנשום, במיוחד כאשר אתה שוכב
  - נפיחות או אגירת נוזלים, בעיקר בכפות הרגליים, קרסוליים או רגליים
  - עליה מהירה במיוחד במשקל
  - עייפות לא רגילה
- אלו עלולים להיות תסמינים של אי ספיקת לב

#### 4.4 בעיות בכליות (שכיחות אינה ידועה), המצריכות לפעמים דיאליזה.

**4.5 ויטמין B<sub>12</sub> נמוך (מחסור בויטמין B<sub>12</sub>)**. שימוש במטפורמין לפרקי זמן ארוכים עלול לגרום לירידה בכמות ויטמין B<sub>12</sub> בדם שלך, במיוחד אם היו לך בעבר רמות נמוכות של ויטמין B<sub>12</sub>.

**4.6 סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה)**. שכיח (יכול להופיע בעד 1 מתוך 10 אנשים). אם הינך נוטל **סיטפורמין ויטאמד** עם תרופה נוספת אשר עלולה לגרום לסוכר נמוך בדם, כגון סולפונילאוריאה או אינסולין, הסיכון שלך לסבול מסוכר נמוך בדם הוא גבוה יותר. ייתכן ויהיה צורך להוריד את המנה של התרופה מסוג סולפונילאוריאה או אינסולין בזמן נטילת **סיטפורמין ויטאמד**. סימנים ותסמינים של סוכר נמוך בדם עלולים לכלול: כאב ראש, נמנום, חולשה, סחרחורת, בלבול, רגזנות, רעב, דופק מהיר, הזעה, תחושת עצבנות.

**4.7 תגובות אלרגיות חמורות (שכיחות אינה ידועה)** יכולות לקרות עם **סיטפורמין ויטאמד** או סיטגליפטין, אחת התרופות הנכללות ב**סיטפורמין ויטאמד**. תסמינים של תגובה אלרגית חמורה ל**סיטפורמין ויטאמד** עלולים לכלול: פריחה, כתמים בולטים אדומים על העור שלך (סרפדת) או נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון והגרון אשר עלולה לגרום קושי בנשימה או בבליעה. אם יש לך תסמינים כלשהם של תגובה אלרגית חמורה, הפסק ליטול **סיטפורמין ויטאמד** ודבר עם הרופא שלך מיד או גש לקבל עזרה רפואית דחופה. ייתכן והרופא ירשום לך תרופה לתגובה האלרגית שלך, וירשום תרופה אחרת לסוכרת שלך.

**4.8 כאב מפרקים (שכיחות אינה ידועה)**. אנשים מסויימים הנוטלים תרופות הנקראות מעכבי DPP-4, אחת מהתרופות ב**סיטפורמין ויטאמד**, עלולים לפתח כאב מפרקים אשר יכול להיות חמור. צור קשר עם הרופא שלך אם הנך סובל מכאב חמור במפרקים.

**4.9 תגובות עוריות (שכיחות אינה ידועה)**. חלק מהאנשים הנוטלים תרופות הנקראות מעכבי DPP-4, אחת מהתרופות ב**סיטפורמין ויטאמד**, עלולים לפתח תגובה עורית שנקראת bullous pemphigoid שבה ייתכן ויהיה צורך בטיפול בבית חולים. ספר לרופא שלך מיד אם אתה מפתח שלפוחיות או פציעה של השכבה החיצונית של העור שלך (שחיקה). ייתכן והרופא שלך יגיד לך להפסיק לקחת **סיטפורמין ויטאמד**.

תופעות הלוואי השכיחות ביותר (יכולות להופיע ביותר מאדם אחד מתוך 10) של **סיטפורמין ויטאמד** כוללות:

- אף סתום או נוזל וכאבים בגרון
- דלקת בדרכי הנשימה העליונות
- שלשולים

- בחילות והקאות
- גזים, אי-נוחות בבטן, בעיות בעיכול
- חולשה
- כאב ראש
- סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה) כאשר משתמשים בשילוב עם תרופות מסוימות, כגון סולפונילאוריאה או אינסולין

נטילת **סיטפורמין ויטאמד** עם הארוחות יכולה לעזור בהפחתת תופעות הלוואי הבטניות הנפוצות של מטפורמין, אשר קורות בדרך כלל בתחילת הטיפול. אם הינך סובל מבעיות חריגות או פתאומיות בבטן, דבר עם הרופא שלך. בעיות בבטן אשר מתחילות בשלב מאוחר יותר של הטיפול עלולות להיות סימן למשהו חמור יותר.

#### לסיטפורמין ויטאמד עלולות להיות תופעות לוואי אחרות כולל:

- **נפיחות של הידיים או הרגליים.** נפיחות של הידיים והרגליים עלולה לקרות אם הינך נוטל **סיטפורמין ויטאמד** בשילוב עם רוזיגליטאזון. רוזיגליטאזון הינה תרופה מסוג אחר לסוכרת.
- כאבי מפרקים
- כאבי שרירים
- כאב בזרוע או ברגל
- כאב גב
- גרוד
- שלפוחיות

אלה אינן כל תופעות הלוואי האפשריות של **סיטפורמין ויטאמד**. למידע נוסף, שאל את הרופא שלך. ספר לרופא שלך אם יש לך תופעת לוואי כלשהי המטרידה אותך, או שאינה חולפת.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא שלך.**

#### דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי", שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffect.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
- אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצויין על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

#### 6. מידע נוסף

##### 6.1 מה מכילה סיטפורמין ויטאמד?

חומרים פעילים: sitagliptin ו- metformin. בנוסף למרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם: Microcrystalline cellulose, crospovidone kollidon, povidone k29/32, sodium stearyl fumarate.

ציפוי הטבליה מכיל את המרכיבים הבלתי פעילים הבאים:

Polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 3350 / PEG E1521, talc, iron oxide yellow

(בסיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/850 מ"ג) iron oxide red, iron oxide black.

##### 6.2 כיצד נראית סיטפורמין ויטאמד ותכולת האריזה

**סיטפורמין ויטאמד** טבליות מצופות זמינות בשני חוזקים:

**סיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/850 מ"ג** הינן טבליות מצופות, בצבע ורוד, בצורה אובאלית מוארכת, עם קו חצייה מצידן האחד והכיתוב 'SA' מצידן השני.

**סיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/1000 מ"ג** הינן טבליות מצופות, בצבע אדום עד חום, בצורה אובאלית מוארכת, עם קו חצייה בין האותיות 'S' ו 'B' מצידן האחד, ועם קו חצייה נוסף מצידן השני.

גודל אריזות:

**סיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/ג 850 מ"ג:** כל אריזה מכילה 56 טבליות מצופות.  
**סיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/ג 1000 מ"ג:** כל אריזה מכילה 56 טבליות מצופות.

**בעל הרישום והיבואן:** ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, רח' הטחנה 6, בנימינה.

נערך ביולי 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

**סיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/ג 850 מ"ג:** 179-11-37193-99

**סיטפורמין ויטאמד 50 מ"ג/ג 1000 מ"ג:** 179-12-37194-99

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.