

**Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами**  
**(препараты) – 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

**Адвил Ликви-Джелс 200 мг**

**Адвил Форте 400 мг**

Капсулы, наполненные жидкостью

**Активное вещество:** Каждая капсула Адвил Ликви-Джелс 200

содержит: Ибупрофен 200 мг

Ibuprofen 200 mg

Каждая капсула Адвил Форте 400 мг

содержит: Ибупрофен 400 мг

Ibuprofen 400 mg

Неактивные вещества и аллергены: см. раздел 6 «Дополнительная информация», а также раздел 2 «Перед применением препарата», пункт «Важная информация о некоторых ингредиентах препарата».

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед применением препарата.** Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Необходимо принимать препарат согласно указаниям в разделе «Дозировка» данной инструкции. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. Следует обратиться к врачу, если признаки (симптомы) заболевания усугубились или если не наступило улучшение в течение 10 дней у взрослых или 3 дней у подростков (12-18 лет).

## 1. Показания к применению

- Для облегчения болей от легкой до средней степени, включая головные боли, зубные боли, боли в спине, боли в мышцах и менструальные боли
- В качестве жаропонижающего средства
- Противовоспалительное средство при ревматических заболеваниях
- Для терапии болей, связанных с мигренью.

**Терапевтическая группа:** Ибупрофен относится к группе лекарственных препаратов под названием нестероидные противовоспалительные препараты (NSAIDs - НПВП), которые оказывают болеутоляющее, противовоспалительное и жаропонижающее действие, а также способствуют уменьшению отечности.

## 2. Перед применением препарата

**Противопоказания к приему препарата:**

- гиперчувствительность (аллергия) к ибупрофену или к любому из дополнительных компонентов, содержащихся в данном препарате (см. раздел 6);
- гиперчувствительность (аллергия) к аспирину, либо сужение дыхательных путей, астма, воспаление носовой полости, ангионевротический отёк (отёк Квинке) или крапивница на фоне приема лекарств из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);
- язва желудка / желудочные кровотечения в настоящее время, либо в прошлом - если имело место два эпизода или более;
- история кишечного кровотечения или перфорации кишечника на фоне терапии препаратами из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);
- кровоизлияния в мозг, иные активные кровотечения или заболевания крови;
- выраженная печеночная, почечная или сердечная недостаточность;
- последний триместр беременности.

## **Особые предостережения относительно использования препарата**

### **Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом если вы:**

- астматик, либо страдаете сенной лихорадкой
- страдаете печеночными или почечными нарушениями
- страдаете аутоиммунными заболеваниями, включая системную красную волчанку (SLE) – состояние иммунной системы, влияющее на соединительную ткань и вызывающее боли в суставах, изменения кожного покрова и поражение других органов
- страдаете или страдали в прошлом нарушениями пищеварительной системы, такими как язвенное воспаление кишечника (язвенный колит) или болезнь Крона, поскольку ибупрофен и подобные ему препараты могут усугубить данные состояния
- беременны на сроке до 6 месяцев
- страдаете сердечными заболеваниями, включая сердечную недостаточность, стенокардию (боли в грудной клетке), либо перенесли инфаркт миокарда, операцию аортокоронарного шунтирования, страдаете заболеваниями периферийных сосудов (нарушения кровообращения в сосудах ног или стоп вследствие сужения или закупорки артерий) или перенесли любой вид инсульта (включая «микроинсульт» или транзиторную ишемическую атаку – «ТИА»)
- страдаете повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, высоким холестерином, если в семье были случаи сердечных заболеваний либо инсульта, или если вы курите
- страдаете инфекцией – см. пункт «Инфекции» данного раздела.

**Немедленно прекратите лечение препаратом Адвил Ликви-Джелс 200 и Адвил Форте 400 и немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы, если вы заметили симптомы аллергической реакции. В числе возможных симптомов: нарушения дыхания; отечность лица и шеи (ангионевротический отёк); боли в груди (см. раздел 4).**

**Кожные реакции** - Серьезные кожные реакции, в частности: дерматит, проявляющийся в шелушении на обширных участках кожи, полиморфная эритема (erythema multiforme), синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (toxic epidermal necrolysis), медикаментозно-индуцированная реакция, сопровождающаяся эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP). Имеются сведения о связи вышеперечисленных кожных реакций с приемом Адвил Ликви-Джелс 200 и Адвил Форте 400. Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской консультацией, если развивается любой тип кожных высыпаний, язв на слизистых оболочках или волдырей, поскольку они могут быть связаны с упомянутыми кожными реакциями.

Препараты, подобные Адвил Ликви-Джелс 200 и Адвил Форте 400, могут ассоциироваться с незначительным повышением риска сердечного приступа (инфаркта миокарда) или инсульта. Степень риска повышается при высоких дозировках и продолжительном применении. Не следует превышать рекомендуемую дозировку или продолжительность курса лечения. См. раздел 3.

**Инфекции** - Адвил Ликви-Джелс 200 и Адвил Форте 400 могут замаскировать признаки инфекции, такие как жар и боли. Поэтому прием данных препаратов может привести к несвоевременному началу необходимого лечения инфекций и, как следствие, к повышенному риску осложнений. Подобные случаи наблюдались при воспалениях легких бактериального происхождения, а также при кожных инфекциях бактериального происхождения на фоне ветряной оспы. Если вы принимаете данный препарат в то

время, когда у вас имеется какая-либо инфекция, и симптомы данной инфекции сохраняются либо усугубляются, следует немедленно обратиться за получением медицинской консультации.

### **Дети и подростки**

- Не следует давать данный препарат детям до 12 лет, если только речь не идет о четком предписании врача.
- При недостаточном приеме жидкости ребенком или подростком в возрасте 12-18 лет, равно как и при потере жидкости вследствие продолжительной рвоты или диареи, необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата, поскольку в этом случае есть риск поражения почек.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

**Не следует принимать данный препарат, если вы принимаете аспирин/ацетилсалициловую кислоту в дозировке свыше 75 мг в сутки, либо другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).**

**Если вы принимаете, либо недавно принимали другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. Это в особенности важно, если вы принимаете:**

- антикоагулянты (то есть препараты, разжижающие кровь/снижающие свертываемость крови, такие как аспирин/ацетилсалициловая кислота, Варфарин, Тиклопидин); мочегонные средства (увеличивают количество мочи, выделяемой организмом);
- препараты для снижения артериального давления (ингибиторы АСЕ, такие как Каптоприл; бета-блокаторы, такие как Атенолол; блокаторы рецепторов ангиотензина II, такие как Лозартан) или иные препараты, поскольку их действие влияет на эффект терапии ибупрофеном, либо, наоборот, подвержено влиянию ибупрофена;
- другие препараты, в том числе кортикостероиды (которые используют для контроля астмы, лечения кожных заболеваний и ряда других); ингибиторы агрегации тромбоцитов (как правило, применяются для профилактики инсульта или сердечных заболеваний); сердечные гликозиды (назначаются пациентам с сердечными патологиями); селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС - SSRIs) (применяются для лечения депрессии) или препараты лития (применяются для лечения маниакально-депрессивного расстройства); Метотрексат (используется в терапии некоторых видов рака, а также псориаза и ревматоидного артрита); Циклоспорин или Такролимус (назначаются пациентам, проходящим трансплантацию органов, а также применяются при некоторых кожных патологиях); Зидовудин (используется в терапии ВИЧ-инфекции); антибиотики из группы хинолонов (применяются при лечении определенных инфекций); Фенитоин (применяется в терапии эпилепсии) или антациды (используются для лечения некоторых нарушений пищеварения).

Некоторые другие препараты также могут влиять на действие Адвил Ликви-Джелс 200 и Адвил Форте 400, либо, наоборот, прием Адвил Ликви-Джелс 200/Адвил Форте 400 может влиять на действие этих препаратов. По этой причине всегда следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Адвил Ликви-Джелс 200 или Адвил Форте 400 одновременно с другими препаратами.

### **Фертильность, беременность и грудное вскармливание**

Не использовать Адвил Ликви-Джелс 200 или Адвил Форте 400 в третьем триместре беременности. Применение данного препарата может привести к поражению почек и сердца плода. Данный препарат может повлиять на предрасположенность к кровотечениям как у матери, так и у плода, привести к перенашиванию и запоздалым родам, либо к затяжным родам. **Не следует принимать Адвил Ликви-Джелс 200 или Адвил Форте 400 также и во время первых 6 месяцев беременности, если только врач не сочтет это необходимым и не даст соответствующую рекомендацию.** При приеме курсом более нескольких дней на сроке беременности от 20-й недели препараты Адвил Ликви-Джелс 200 и Адвил Форте 400 могут вызвать нарушения в почках плода, что чревато маловодием или сужением сосуда сердца у плода. Если вам требуется лечение, длительность которого превышает несколько дней, возможно, врач порекомендует вам дополнительное наблюдение.

Ибупрофен может проникнуть в грудное молоко в очень низкой концентрации, однако маловероятно, чтобы препарат отрицательно повлиял на грудного ребенка.

Ибупрофен относится к группе препаратов NSAIDs, которые могут привести к нарушению репродуктивной функции у женщин. Данный эффект обратим, нарушение проходит после прекращения приема препарата. Нет оснований полагать, что периодический прием ибупрофена как-либо повлияет на ваши шансы забеременеть. Вместе с тем, если вам не удастся забеременеть, либо если вы пытаетесь забеременеть, перед использованием препарата проконсультируйтесь с врачом. Если вы кормите грудью, беременны, допускаете возможность беременности или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед началом применения препарата.

### **Важная информация о некоторых ингредиентах препарата**

Адвил Ликви-Джелс 200 содержит 50,1 мг сорбитола в каждой капсуле, наполненной жидкостью.

Адвил Форте 400 содержит 79,9 мг сорбитола в каждой капсуле.

Сорбитол является источником фруктозы. Если вам известно со слов вашего врача, что у вас (или у ребенка) непереносимость определенных сахаров, либо если диагностирована наследственная непереносимость фруктозы (мальабсорбция фруктозы, HFI) – редкое генетическое расстройство, при котором организм не в состоянии расщеплять фруктозу – проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать (или давать ребенку) данный препарат.

Капсулы Адвил Ликви-Джелс 200 и Адвил Форте 400 содержат соевый лецитин. Если вы страдаете аллергией на арахис или сою, вам не следует использовать данный препарат.

### **3. Указания по применению**

Данный препарат предназначен только для краткосрочного применения. Следует стремиться свести как дозу препарата, так и период приема к минимуму, необходимому для облегчения симптомов. Если в период приема препарата на фоне имеющейся инфекции симптомы (такие как жар или боли) не прекращаются или усугубляются, незамедлительно проконсультируйтесь с врачом. Если пациенту в возрасте от 12 до 18 лет препарат требуется на срок более 3 дней, либо если симптомы усугубились, необходимо обратиться к врачу. Пациентам в возрасте от 18 лет и старше не следует принимать данный препарат на протяжении 10 дней и более -

за исключением курса лечения по указанию врача. Если симптомы не прекращаются или усугубляются, проконсультируйтесь с вашим врачом.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если вы не уверены в дозировке и способе применения препарата.

#### **Принятая дозировка, как правило**

##### **Адвил Ликви-Джелс 200**

Для взрослых, в т.ч. пожилых, а также для детей и подростков в возрасте 12-18 лет: **одна или две** капсулы до 3 раз в день по необходимости. Рекомендуемый интервал между приемами препарата составляет приблизительно от 6 до 8 часов; в любом случае перерыв между приемами должен быть не менее 4 часов. **Суточная доза не должна превышать 6 капсул** (1,200 мг ибупрофена) - в течение любого произвольно взятого промежутка времени в 24 часа.

##### **Адвил Форте 400**

Для взрослых, в т.ч. пожилых, а также для детей и подростков в возрасте 12-18 лет: **Одна** капсула до 3 раз в день, по необходимости. Рекомендуемый интервал между приемами препарата составляет приблизительно от 6 до 8 часов; в любом случае перерыв между приемами должен быть не менее 4 часов. **Суточная доза не должна превышать 3 капсулы** (1,200 мг ибупрофена) - в течение любого произвольно взятого промежутка времени в 24 часа.

● Капсулы следует проглотить, запивая водой ● Не следует разламывать, измельчать или разжевывать капсулы. **Капсулу необходимо проглатывать целиком**, поскольку она содержит жидкость.

**Не превышать рекомендуемую дозу.**

**В случае передозировки препаратов Адвил Ликви-Джелс 200 или Адвил Форте 400**, а также в случае случайного проглатывания капсулы ребенком, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы, чтобы получить заключение о существующем риске, а также консультацию по поводу необходимых мер. Принесите с собой упаковку препарата, содержащую оставшиеся капсулы, чтобы показать их врачу.

Возможные симптомы: тошнота, боли в животе, рвота (может содержать кровяные вкрапления), головная боль, звон в ушах; спутанность сознания и нистагм (дрожание глазных яблок). При приеме препарата в высоких дозах сообщалось о следующих явлениях: сонливость, боли в груди, сердцебиение, потеря сознания, судороги (особенно у детей), слабость и головокружение, кровь в моче, ощущение холода в теле и нарушения дыхания.

**Если вы забыли принять Адвил Ликви-Джелс 200 или Адвил Форте 400**, не следует принимать двойную дозу в целях компенсации забытой дозы.

**Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом приёме препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки. Если у вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.**

#### **4. Побочные эффекты**

Как и при применении любого лекарственного препарата, прием Адвил Ликви-Джелс 200 и Адвил Форте 400 может привести к побочным эффектам у некоторых потребителей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Следующие побочные эффекты встречаются крайне редко (**very rare**) – проявляются у менее 1 человека из 10 000; однако если вы испытываете какой-либо из них, **прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу.**

- Язва или перфорация желудка. Возможные симптомы: сильная боль в животе, кровавая рвота (или жидкость, напоминающая гранулированный кофе), кровь в кале или черный кал.
- Воспаление мозговых оболочек (менингит). Возможные симптомы: скованность мышц шеи, головная боль, тошнота, рвота, жар или дезориентированность.
- Серьезные аллергические реакции (потенциально опасные для жизни). Возможные симптомы – внезапные симптомы аллергической реакции: сыпь, зуд или крапивница на коже, обморок, снижение артериального давления, учащенный пульс, отек лица, языка и горла, одышка, хрипы или затрудненное дыхание.
- Астма/усугубление астмы, а также иные нарушения дыхания.
- Нарушения функции печени. Возможные симптомы: желтушность кожи или белков глаз.
- Боли в груди, которые могут быть признаком тяжелой аллергической реакции, так называемого синдрома Коуниса (Kounis syndrome).
- Симптомы со стороны кожи, такие как покраснение без отечности кожи, поражения кожи на туловище, имеющие форму «мишеней», либо круглую форму, иногда с волдырем в центре, шелушение кожи, язвы во рту, в горле, в носу, на гениталиях и в глазах. Описанные выраженные высыпания на коже могут сопровождаться лихорадкой и гриппоподобными симптомами (эксфолиативный дерматит [exfoliative dermatitis], полиморфная эритема [erythema multiforme], синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз [toxic epidermal necrolysis]).
- Распространенная сыпь, высокая температура тела и увеличенные лимфатические узлы (DRESS-синдром).
- Красная сыпь с шелушением, подкожные узлы и волдыри, сопровождаемые лихорадкой. Симптомы проявляются, как правило, в начале курса лечения AGEP – острый генерализованный экзантематозный пустулез).

**Подобные ибупрофену препараты ассоциируются с незначительным повышением риска инфаркта миокарда (сердечного приступа) или инсульта.**

**Другие побочные эффекты**

**Нечасто встречающиеся побочные эффекты (uncommon) – проявляются у 1-10 человек из 1 000**

- Аллергические реакции, такие как крапивница, сыпь и кожный зуд (либо системная красная волчанка - СКВ, SLE)
- Боли в животе, нарушения пищеварения, изжога и тошнота
- Головная боль или головокружение.

**Редко встречающиеся побочные эффекты (rare) – проявляются у 1-10 человек из 10 000**

- Диарея, метеоризм, запоры и рвота.

**Очень редкие побочные эффекты (very rare) – проявляются у менее одного человека из 10 000**

- Уменьшение количества кровяных клеток, что может проявляться в бледности или желтизне кожных покровов, повышении температуры тела, боли в горле, поверхностных язвах в ротовой полости, гриппоподобных симптомах, утомлении или слабости, склонности к образованию кровоподтеков, в кожных кровоизлияниях или носовом кровотечении
- Повышенное артериальное давление, сердечная

недостаточность или боли в груди • Раздражительность, нарушения зрения, звон в ушах и головокружение • Нарушения функции почек. Возможные симптомы: отек лодыжек • Серьезные кожные реакции. Возможные симптомы: волдыри • Гематурия либо пенная консистенция мочи.

#### **Побочные эффекты неизвестной частоты (эффекты, частота которых до сих пор не установлена)**

• Усугубление симптомов воспаления толстой кишки и болезни Крона • Повышенная чувствительность кожи к свету • Может проявиться серьезная кожная реакция, известная как DRESS-синдром. Симптомы DRESS-синдрома: кожная сыпь, жар, отек лимфоузлов и повышение количества эозинофилов (вид лейкоцитов) • Обширные чешуйчатые высыпания красного цвета с подкожными узлами и волдырями, расположенными главным образом в складках кожи, на туловище и верхних конечностях, сопровождающиеся лихорадкой. Проявляются в начале курса лечения. Прекратите прием препарата, если у вас развиваются данные симптомы, и незамедлительно обратитесь к врачу (см. раздел 2).

**В случае появления или обострения какого-либо из побочных эффектов, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.**

#### **Извещение о побочных эффектах**

Сообщить о побочных эффектах в министерство здравоохранения можно, заполнив форму отчета о побочных эффектах по ссылке «Отчет о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)), либо по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. Как хранить препарат?**

Не допустите отравления! Во избежание отравлений данное лекарство, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев, и находящемся вне их поля зрения. Не следует вызывать рвоту, не получив на то прямого указания от врача • Недопустимо использовать препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности препарата относится к последнему дню месяца • Хранить при температуре ниже 25°C • Не следует выбрасывать лекарства в канализацию или с бытовым мусором.

Проконсультируйтесь у фармацевта о порядке утилизации лекарств, которые больше не нужны. Данные меры важны для охраны окружающей среды.

## **6. Дополнительная информация**

**Помимо активных ингредиентов препарат также содержит:**

**Адвил Ликви-Джелс 200:** Polyethylene glycol 600, Gelatin (Type 150), Sorbitan Sorbitol Solution (contains purified water, Sorbitan, D-sorbitol), Potassium hydroxide, Purified water, FD&C Green no.3, Ink [White Opacode (WB): Ammonium Hydroxide, Isopropyl alcohol, Purified water, Polyvinyl acetate phthalate, Propylene glycol, SDA 35A alcohol, Macrogol 400, Titanium dioxide], Lecithin blend/fractionated coconut oil.

**Адвил Форте 400:** Macrogol 600, Gelatin, Purified Water, Sorbitol, Potassium Hydroxide, Opacode Black Ink, Phosal in Ethanol solution, Lecithin in triglycerides (medium chain), Triglycerides.

**Внешний вид препарата и содержимое упаковки:**

**Адвил Ликви-Джелс 200:** Зеленая мягкая желатиновая капсула эллиптической формы. Слово Advil напечатано белыми чернилами на одной стороне капсулы.

Капсулы Адвил Ликви-Джелс 200 упакованы в белые круглые герметичные контейнеры с расфасовкой по 16, 20, 40, 80 капсул. Возможно, не все размеры упаковок поступят в продажу.

**Адвил Форте 400:** Бесцветная капсула эллиптической формы из полупрозрачного желатина, на которой черными чернилами отпечатано «400». Содержит прозрачную жидкость. Капсулы упакованы в лоток с алюминиевым покрытием, лоток помещен в коробку. Выпускаются в расфасовках по 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32, 36, 48, 50, 60, 96 и 100 капсул. Возможно, не все размеры упаковок поступят в продажу.

**Владелец регистрационного удостоверения и импортер:** Haeon Си-Эйч ЛТД  
Израиль, п. я. 3256, Петах-Тиква (HALEON CH ISRAEL LTD).

**Регистрационный номер препарата в Государственном реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения:**

**Адвил Ликви-Джелс 200:** 115-33-29761-21      **Адвил Форте 400:** 145-20-32014-00

Составлено в июне 2024 г.

AdvLG PTv1