

## עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

### 1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה:

אנג'מיצין ספריי וטרינרי  
ספריי לשימוש על העור

### 2.

#### חומרים פעילים

Oxytetracycline hydrochloride (equivalent to oxytetracycline)	25.00 mg/ml 23.15 mg/ml
--	----------------------------

#### חומרים בלתי פעילים

Patent blue V (E131)	1.25 mg/ml
----------------------	------------

רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת בסעיף "מידע נוסף".

### 3. למה מיועדת התרופה:

לטיפול בזיהומים הבאים הנגרמים על ידי או הקשורים לאורגניזמים הרגישים  
לאוקסיטטריציקלין בבקר, כבשים וחזירים:

- זיהומים ברגל הנגרמים בייחוד על ידי: *Dichelobacter nodosus*,  
*Fusobacterium necrophorum*, ו- *Fusobacterium* spp.
- כטיפול תומך בזיהומי פצעים שטחיים לאחר ניתוח או פציעה גופנית, למשל, נשיכת  
זנב בחזירים, שריטות ופצעים.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת טטראציקלינים לשימוש חיצוני.

### 4. התוויות נגד:

אין להשתמש לטיפול בעטינים, על מנת למנוע מהתכשיר הווטרינרי הרפואי לחדור לחלב.  
אין להשתמש בחיות במקרים של רגישות יתר לאוקסיטטריציקלין או לאחד מהמרכיבים  
הבלתי פעילים.

### 5. תופעות לוואי:

אין.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על  
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות  
([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,  
או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

**6. חיות מטרה:**  
בקר, כבשים וחזירים.

**7. אופן המתן ומינון:**  
תרחיף בצורת תרסיס לעור.  
לשימוש חיצוני בלבד.

**8. אופן השימוש בתכשיר:**

נער היטב לפני השימוש. מכל התרסיס מותאם לשימוש במצב עומד והפוך.  
יש לנקות את האזור המטופל היטב טרם הריסוס, רסס את המוצר למשך 1-2 שניות,  
במרחק של 15-20 סנטימטר, עד שהאזור יהיה בצבע אחיד. חזור על הטיפול כל 12 שעות  
למשך 1 עד 3 ימים, בתלות בתהליך ההחלמה.

כדי לקבל את התוצאות המיטביות במקרה של פצעים בכפות הרגליים מומלץ לעקוב אחרי  
ההוראות הבאות:

- נקה באופן מלא את אזור הרגל, הסר את כל החומר הזר, הפרשות ואזורים נמקים.
- שמור את החיות על אדמה יבשה במשך 12 שעות לאחר השמה.

**9. זמן המתנה:**

**בקר, כבשים:**

בשר: 0 ימים

חלב: 0 ימים

**חזירים:**

בשר: 0 ימים

יש להסיר חלקים מוכתמים של עור החזיר לפני ששאר החיה תשמש לצריכת אדם.

**10. אזהרות:**

• אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בחיית המטרה

יש לטפל בחיות באזור מאוורר היטב.  
אין לרסס בתוך או ליד העיניים.  
השימוש בתכשיר הווטרינרי הרפואי צריך להיות מבוסס על מבחני רגישות לחיידקים  
המבודדים מהחיה. במקרה והדבר אינו אפשרי הטיפול צריך להתבסס על מידע מקומי  
(אזורי, ברמת החווה) אפידמיולוגי על רגישות לחיידק המטרה.

• אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

עקב סיכון לרגישות ודלקת עור במגע (דרמטיטיס), המשתמש צריך להימנע ממגע עם  
העור. יש להשתמש בכפפות לא חדירות מתאימות בעת השימוש בתכשיר הווטרינרי  
הרפואי.

עקב סיכון לגירוי העיניים, יש להימנע ממגע בעיניים.

יש להגן על העיניים והפנים.

אין לרסס לעבר להבה גלויה או כל חומר לזהט.

אין לנקב או לשרוף את המכל גם לאחר סיום השימוש.

יש להימנע משאיפת אדים.  
יש השתמש בתכשיר הוטרנירי הרפואי באוויר הפתוח או באזור מאוורר היטב.  
יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש.  
אין לאכול או לעשן בעת מתן התכשיר הוטרנירי הרפואי.  
במקרים של בליעה בטעות או במקרה של מגע עם העיניים, יש לפנות לטיפול רפואי מיד ולהציג לרופא את העלון/האריזה של התכשיר.

• הריון והנקה של בעל החיים המטופל

ניתן להשתמש במהלך הריון והנקה.

• חוסר תאימות (incompatibility)

לא ידוע.

**11. הוראות אחסון:**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/בקבוק.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- שמור הרחק ממקור אש ומקורות הצתה - אין לעשן.

**12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש:**

כל שארית של תכשיר ווטרנירי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרנירי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.  
כלים אלו צריכים לעזור להגן על הסביבה.  
שאל את הוטרניר או הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בהן יותר צורך.

**13. מידע נוסף:**

- נוסף על החומר(ים) הפעיל(ים) התרופה מכילה גם:

Isopropyl alcohol  
Patent Blue V (E131)  
Polysorbate 80  
Mixture of hydrocarbons on butane basis (LPG), with denaturant

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

מכל תרסיס לחץ אלומיניום המכיל 200 מ"ל מוצר, 5 גר' אוקסיטרציקלין הידרוכלוריד  
וצבען כחול. תרחיף בצבע ירוק עד ירוק-כחול.  
שסתום התרסיס מאפשר לו לעבוד במצב עומד והפוך.

• גודל האריזה:

מכל המכיל 200 מ"ל.

• **בעל הרישום וכתובתו:**

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.

• **שם היצרן וכתובתו:**

Intervet Productions SRL, Via Nettunense Km.20.300, Aprilla (LT) Italy.

נערך ביוני 2025.

• **מספר רישום התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:**

157-22-34471-00