

Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986
Препарат отпускается без рецепта врача

Йодифлор Раствор

Активный ингредиент и его концентрация:

Повидон Йод Povidone Iodine 10% w/w (эквивалентно 1% w/w йода Iodine)

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в разделе 6 («Дополнительная информация»).

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед применением препарата.

Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Способ применения препарата изложен в разделе «Способ применения и дозы» данной инструкции. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. При обострении признаков заболевания (симптомов) или отсутствии улучшения в течение 7 дней следует обратиться к врачу.

1. Показания к применению:

Данное лекарство предназначено для оказания первой помощи при ранах, царапинах и легких ожогах. Для дезинфекции ран и легких ожогов, а также для обработки кожи при кожных инфекциях.

Терапевтическая группа: Антисептики (дезинфицирующие средства).

2. Перед применением препарата: Противопоказания к применению препарата:

- Гиперчувствительность (аллергия) к какому-либо из ингредиентов препарата или к йоду.

До начала применения препарата следует сообщить врачу о повышенной чувствительности к какому бы то ни было продукту питания или лекарственному препарату.

Особые предостережения относительно использования препарата:

- Следует избегать нанесения на обширные участки кожи.

Перед обработкой препаратом Йодифлор Раствор

- Следует проконсультироваться с врачом, прежде чем обрабатывать глубокие раны.
- Не использовать препарат без предварительной консультации с врачом, если вы страдаете или ранее страдали дисфункцией щитовидной железы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Если вы принимаете другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили курс лечения другим лекарственным препаратом, следует сообщить об этом врачу или фармацевту во избежание рисков или неэффективности в результате межлекарственного взаимодействия.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность:

Если вы беременны или кормите грудью, следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед применением препарата.

3. Способ применения и дозы

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа приема препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Внимание! Не глотать! Данный препарат предназначен исключительно для наружного использования.

Способ применения препарата - общие указания

- Можно наносить капли раствора Йодифлор непосредственно на кожу и на рану и дать препарату высохнуть на коже (при этом образуется защитный слой). Можно смочить раствором марлю, наложить на рану и забинтовать.
- Первая помощь: для обработки ран – наносить раствор Йодифлор 2-4 раза в день, пока рана не заживет. При кожных инфекциях – смазывать раствором

Йодифлор с той же периодичностью до полного заживления, либо в соответствии с указаниями врача.

- Если нет улучшения состояния после недели применения, следует обратиться к врачу.
- Пятна на теле или на хлопковых тканях можно удалить, промыв водой.

Не превышать рекомендуемую дозу. В случае передозировки или случайного проглатывания препарата ребенком немедленно обратитесь в приемное отделение больницы; возьмите с собой упаковку препарата.

Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом применении препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты:

Как и при использовании любого лекарства, применение препарата Йодифлор раствор может привести к побочным эффектам у некоторых людей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Наряду с желаемым действием лекарства в период его использования могут появиться и побочные явления, такие как длительно сохраняющаяся сыпь, раздражение или отечность.

В случае появления или усугубления какого-либо из побочных эффектов, либо проявления побочного эффекта, либо проявления побочного эффекта, не упомянутого в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

Извещение о побочных эффектах

Сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения можно, заполнив формуляр по ссылке «Уведомление о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), либо по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. Условия хранения препарата Не допустите отравления! Во избежание отравлений данный препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.

Йодифлор раствор можно использовать после первичного вскрытия флакона до окончания срока годности.

Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Хранить в прохладном месте, при температуре ниже 25°C.

6. Дополнительная информация: Помимо действующего вещества, препарат содержит также:

Disodium Hydrogen Phosphate, Citric Acid, Purified Water.

Внешний вид препарата и содержимое упаковки

Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета.

Содержимое упаковки: 20, 50, 100, 300 и 1000 мл. В продаже могут быть представлены не все выпускаемые расфасовки.

Производитель и держатель лицензии: Бен Шимон Флорис ЛТД. Индустриальный парк Мисгав. Почтовый ящик Мисгав 2017400.

Отредактировано в августе 2025 г. в соответствии с предписаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре Министерства здравоохранения: 061-40-27622-00