

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

יודיפלור

משחה

החומר הפעיל וריכוזו:

פובידון יודין **Povidone Iodine 10% w/w** (השווה ל-1% יודין Iodine)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו מיועדת לחיטוי פצעים וכוויות קלות ולטיפול בזיהומי עור. **קבוצה תרפויטית:** חומרים אנטיספטיים (מחטאים).

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאחד ממרכיבי התכשיר או ליוד.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתכשיר.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- יש להימנע משימוש על אזורים נרחבים של העור.

לפני הטיפול ביודיפלור משחה:

- יש להיוועץ ברופא לפני הטיפול בפצעים עמוקים.
- אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם הנך לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

הריון, הנקה ופוריות:

אם הנך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתכשיר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר. **שים לב: לא לבלוע!** תכשיר זה מיועד לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש בתכשיר – הוראות כלליות:

- למרוח על פצע או האזור המטופל 2-4 פעמים ביום.
- ניתן למרוח גם על גזה ולכסות בתחבושת.
- אם לא חל שיפור במצב תוך שבוע ימים יש לפנות לרופא.
- כתמים על הגוף או על בד כותנה ניתן לנקות על-ידי שטיפה במים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש ביודיפלור משחה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: פריחה, גירוי או נפיחות מתמשכים. **אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. ניתן להשתמש בתרופה עד 12 חודשים לאחר פתיחת האריזה לראשונה. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

6. מידע נוסף:

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

PEG 400, PEG 4000, Purified Water, Trisodium Phosphate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

משחה בצבע חום כהה, בעלת ריח אופייני של יוד.

תכולת האריזה: 15 גרם, 50 גרם, 250 גרם. ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

יצרן ובעל רישום: בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.נ משגב 2017400.

נערך ב-08/2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 141-02-31802-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.