

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

# أوباجيو

## أقراص مطلية

### التركيب

يحتوي كل قرص على:

المادة الفعالة وكميتها: تيريفلونوميدي/Teriflunomide 14 ملغ

يحتوي كل قرص أيضاً على 76 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية: أنظر الفقرة 2 ("معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء") والفقرة 6 ("معلومات إضافية").

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.**

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجليك فقط، لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر أوباجيو بطاقة معلومات حول الأمان للمعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وخلال فترة العلاج بـ أوباجيو والتصرف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية عند الحاجة.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

أوباجيو مخصص لمعالجة التصلب المتعدد الناكس المتردد لدى الكبار، من أجل تقليل نسبة النوبات وإبطاء تقدم العجز.

**الفصيلة العلاجية:** من الأدوية المثبطة لجهاز المناعة (Immunosuppressant)، من مثبطات الإنزيم ديهيدروأورونات ديهيدروجيناز (Dihydroorotate dehydrogenase). يحتوي أوباجيو على المادة الفعالة تيريفلونوميدي، مادة تعمل على الجهاز المناعي من أجل الحد من مهاجمته للجهاز العصبي.

### ما هو التصلب المتعدد

التصلب المتعدد (MS) هو مرض مزمن الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي (CNS). الجهاز العصبي المركزي مكوّن من الدماغ والحبل الشوكي.

في التصلب المتعدد، يُتلف الإلتهاب الغلاف الواقي (المسمى "ميالين") حول ألياف العصب في الجهاز العصبي المركزي. فقدان الميالين يدعى إزالة الميالين (demyelination) ويعيق العمل السليم للأعصاب.

إن الأشخاص الذين يعانون من التصلب المتعدد الناكس تحدث لديهم نوبات متكررة لأعراض جسدية الناجمة عن عدم عمل الأعصاب كما يجب.

تتغير هذه الأعراض من مريض لمريض لكن تكون عادة منوطه بـ:

• صعوبة في المشي

• مشاكل في الرؤية

• مشاكل في التوازن

من شأن الأعراض أن تختفي تماماً بعد إنتهاء النوبة، لكن مع مرور الوقت، قد تبقى بعض المشاكل بين النوبات، هذا الأمر قد يسبب إعاقة جسدية التي قد تعيق من نشاطاتك اليومية.

### كيف يعمل أوباجيو

أوباجيو يساهم بحماية الجهاز العصبي المركزي من مهاجمة جهاز المناعة له بواسطة الحد من إرتفاع نسب بعض خلايا الدم البيضاء (المفويات). هذا الأمر يقلص من الإلتهاب الذي يسبب ضرر عصبي في التصلب المتعدد.

### 2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة تيريفلونوميدي أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- تطور لديك في الماضي طفح جلدي شديد أو تقشر في الجلد، حويصلات و/أو تقرحات في الفم بعد تناول تيريفلونوميدي أو ليفلونوميدي.
- لديك مشاكل خطيرة في الكبد.
- كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنك حامل أو مرضعة.
- كنت تعاني من مشكلة جديّة التي تؤثر على جهازك المناعي، مثلاً متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
- لديك مشكلة جديّة في نخاع العظم الخاص بك، أو إذا وُجد لديك إنخفاض ملحوظ بنسب خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو إنخفاض بنسبة الصفائح الدموية.
- كنت تعاني من تلوث جدي.
- لديك مشاكل خطيرة في الكلية التي تتطلب الديليزة (غسيل كلى).
- لديك نسب منخفضة جداً من البروتينات في الدم (نقص بروتين الدم).

إذا لم تكن واثقاً، أو إذا توفرت لديك أسئلة حول إستعمال هذا الدواء، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ أوباجيو، أخبر الطبيب إذا:

- لديك مشاكل في الكبد و/أو إذا كنت معتاد على شرب كميات كبيرة من الكحول؛ يقوم طبيبك بإجراء فحوص الدم قبل وخلال العلاج لكي يفحص الأداء الوظيفي للكبد. إذا أظهرت نتائج فحصك بأن هناك مشكلة في كبدك، فمن شأن طبيبك أن يوقف العلاج بـ أوباجيو. الرجاء إقرأ الفقرة 4.
- لديك ضغط دم مرتفع (إرتفاع ضغط الدم) سواء كان تحت السيطرة بواسطة أدوية أو لم يكن. قد يؤدي أوباجيو إلى إرتفاع ضغط الدم. يفحص طبيبك ضغط دمك قبل بدء العلاج وبشكل منتظم خلال فترة العلاج. الرجاء إقرأ الفقرة 4.

• لديك تلوث. قبل أن تتناول أوباجيو، سيتأكد طبيبك بأن لديك ما يكفي من خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية في الدم. بما أن أوباجيو يقلل من عدد خلايا الدم البيضاء، فمن شأن هذا الأمر أن يؤثر على قدرتك على محاربة التلوث. بإمكان طبيبك أن يرشدك بإجراء فحوص دم لفحص نسبة خلايا الدم البيضاء، إذا كنت تعتقد بأنك تعاني من أي تلوث. تلوثات بفيروس الهربس، بما في ذلك هرپس جوف الفم أو الهربس النطاقي (herpes zoster)، قد تحدث خلال فترة العلاج بـ تيريفلونوميدي. حصلت في حالات معينة إختلاطات جديّة. عليك إبلاغ طبيبك فوراً إذا كان لديك شك بوجود أية أعراض لتلوثات بفيروس الهربس. الرجاء إقرأ الفقرة 4.

• وُجدت لديك ردود فعل جلدية خطيرة.

• وُجدت لديك أعراض تنفسية.

• كنت تشعر بضعف عام، خدر وألم في اليدين وفي راحتي القدمين.

• كنت مقدماً على تلقي لقاح.

• كنت تستعمل ليفلونوميدي سوية مع أوباجيو.

• كنت تنتقل إلى العلاج بـ أوباجيو أو من علاج بـ أوباجيو.

• كنت مقدماً على إجتياز فحص دم معين (نسبة الكالسيوم). نتائج الفحص قد تدل بشكل خاطئ على نسب منخفضة من الكالسيوم.

### ردود فعل في الجهاز التنفسي

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من سعال أو ضيق في التنفس غير مشخصين. من الجائز أن يجري طبيبك فحوص إضافية.

### الأطفال والمراهقون

أوباجيو غير مخصص للأطفال ولمراهقين دون عمر 18 سنة.

### الفحوص والمتابعة

قبل بدء إستعمال الدواء يوجهك الطبيب لإجراء فحوص دم وفحص حمل لدى النساء.

### التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول إحدى الأدوية المفصلة أدناه:

• ليفلونوميدي، ميتوتريكسات وأدوية أخرى التي تؤثر على جهاز المناعة (تدعى على الأغلب مثبطات جهاز المناعة أو منظمات جهاز المناعة).

• ريفامبيسين (دواء يُستعمل لعلاج السل وتلوثات أخرى).

• كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينيتوين، لعلاج الصرع.

• العرن المثقوب (St. John's wort) - عشبة طبية لعلاج الإكتئاب.

• رپاجلينيد، بيوجليتازون، ناتيچلينيد، أو روزيچليتازون، لعلاج السكري.

• داونوروبيسين، دوكسوروبيسين، باكليتاكسيل، أو توبوتيكان، لعلاج السرطان.

• دولوكستين لعلاج الإكتئاب، عدم التحكم بالتبول أو مرض الكلية لدى مرضى السكري.

• ألوستيرون لعلاج الإسهال الحاد.

• تيوفيللين للربو.

• تيزانيدين، مُرخي عضلات.

• وارفارين، مستحضر مضاد للتخثر يستعمل لتميع الدم (بحيث يصبح أكثر سيولة) لمنع الخثرات الدموية.

• أقراص منع الحمل (التي تحتوي على إيتينيل إستراديول وليفونورجيستريل).

• سيفاكلور، بينزيلبينيسيلين (بينيسيلين G)، سيبروفلوكساسين للتلوثات.

• إندوميثاسين، كيتوكونازول للالام والإلتهاب.

• فوروسيميد لمرض القلب.

• سيميبتيدين لتقليل الحموضة في المعدة.

• زيدوفودين لتلوث HIV.

• روزوفاستاتين، سيمفاستاتين، أتورفاستاتين، پرافاستاتين لفرط الكولسترول في الدم (إرتفاع الكولسترول).

• سولفاسالازين لمرض الأمعاء الإلتهابي أو لإلتهاب المفاصل.

• كوليستيرامين لإرتفاع الكولسترول أو للتخفيف من الحكة بمرض الكبد.

• الفحم الفعال لتقليل إمتصاص الأدوية أو المواد الأخرى.

### إستعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يجوز تناول أوباجيو إذا كنت في فترة الحمل أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملًا. إذا كنت في فترة الحمل أو أصبحت حامل خلال فترة تناول أوباجيو، فإن الخطورة بأن يكون لديك طفل مع عيوب خلقية تزداد. ممنوع على النساء في سن الخصوبة تناول هذا الدواء بدون إستعمال وسائل منع حمل موثوقة.

توجهي إلى الطبيب إذا كنت تخططين للحمل بعد التوقف عن العلاج بـ أوباجيو، لأن عليك التأكد بأن معظم المادة الفعالة في هذا الدواء طرحت من الجسم قبل محاولتك الحمل. إن طرح المادة الفعالة من الجسم بشكل طبيعي قد يستغرق سنتين. يمكن تقصير هذه المدة الزمنية لعدة أسابيع عن طريق تناول أدوية معينة التي تُسرّع من طرح أوباجيو من الجسم. على أي حال يجب المصادقة بواسطة فحص دم بأن كمية كافية من المادة الفعالة طرحت من جسمك وأن تحصيلي على موافقة من طبيبك المعالج بأن نسبة أوباجيو في الدم منخفضة بما يكفي للسماح لك بالحمل.

لمعلومات إضافية بخصوص الفحوص المخبرية توجهي إلى طبيبك.

إذا كنت تشكين بأنك حامل خلال فترة تناولك لـ أوباجيو أو خلال السنتين بعد التوقف عن العلاج، فتوقفي عن تناول أوباجيو وتوجهي فوراً لطبيبك لإجراء فحص حمل. إذا أكد الفحص بأنك حامل، فمن شأن طبيبك أن يقترح علاجاً بأدوية معينة لطرّح أوباجيو من جسمك بسرعة وبشكل كاف، لأن ذلك قد يقلل من الخطورة على طفلك.

### وسائل منع الحمل

أنت ملزمة بإستعمال وسائل منع حمل ناجعة خلال فترة العلاج بـ أوباجيو وبعدها. تيريفلونوميدي يبقى في دمك لفترة زمنية طويلة بعد توقفك عن تناول الدواء. إستمري باستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل بعد التوقف عن العلاج.

- نفذي ذلك إلى أن تصبح نسب أوباجيو في دمك منخفضة بما يكفي - يقوم طبيبك بفحص ذلك.
- إستشيرى الطبيب بخصوص وسيلة منع الحمل الأفضل لأجلك وعن أي حاجة محتملة لتغيير وسيلة منع الحمل.
- الإرضاع
- لا يجوز تناول أوباجيو في فترة الرضاعة، نظراً لأن تيريفلونوميدي ينتقل إلى حليب الأم.
- السياقة وإستعمال الماكينات

قد يسبب لك أوباجيو الشعور بدوار الذي قد يضعف من قدرتك على التركيز ورد الفعل. لذلك إذا كنت تشعر بدوار فلا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات خلال العلاج.

#### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

**أوباجيو يحتوي على لكتوز (نوع من السكر).** إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إستشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء.  
يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليومول (23 ملغ) صوديوم للقرص، أي أنه يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

#### 3 كيفية إستعمال الدواء؟

العلاج بد أوباجيو يتم تحت إشراف طبيب خبير في علاج التصلب المتعدد. يجب دائماً إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

#### الجرعة الدوائية

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة قرص مطلي واحد (14 ملغ) في اليوم. لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

#### طريقة الاستعمال

أوباجيو هو دواء للتناول عن طريق الفم، قرص واحد مرة في اليوم، في أي ساعة من اليوم. لا يجوز المضغ! يجب بلع القرص بشكله الكامل مع الماء. بالإمكان تناول أوباجيو مع أو بدون طعام.

#### إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى طبيبك أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخضرك معك علبة الدواء. قد تشعر بأعراض جانبية شبيهة لما هو موصوف في الفقرة 4.

#### إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، فلا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

#### في حال توقفك عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول أوباجيو أو تغيير الجرعة الدوائية بدون إستشارة طبيبك أولاً. لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أوباجيو قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

#### أعراض جانبية خطيرة

أعراض جانبية معينة من شأنها أن تكون أو تصبح خطيرة، إذا لاحظت واحد منها، توجه فوراً لطبيبك

غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

- التهاب البنكرياس الذي من شأنه أن يشمل أعراضاً ألم في منطقة البطن، غثيان، أو تقيؤ
- ردود فعل تحسسية التي يمكن أن تشمل أعراض طفح، شرى، إنتفاخ الشفتين، اللسان أو الوجه، أو صعوبة مفاحة في التنفس
- ردود فعل جلدية خطيرة التي يمكن أن تشمل أعراض لطفح جلدي، حويصلات، سخونة، أو تقرحات في الفم
- تلوّثات خطيرة أو إنتان الدم (sepsis - نوع تلوّث الذي قد يشكل خطراً على الحياة) التي قد تشمل أعراض لسخونة مرتفعة، رجفان، قشعريرة، إنخفاض في تدفق البول، أو إرتباك
- التهاب الرئتين الذي يمكن أن يشمل أعراض ضيق في التنفس أو سعال متواصل

غير معروفة (لا يمكن تقييم الشيع من المعطيات المتوفرة):

- مرض كبدي خطير الذي يمكن أن يشمل أعراض لإصفرار الجلد أو لإصفرار بياض العينين، بول داكن أكثر من المعتاد، غثيان وتقيؤ غير مشخصين أو ألم في البطن

أعراض جانبية إضافية يمكن أن تحدث بالشيع التالي:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

- صداع
- إسهال، غثيان
- إرتفاع قيم ALT (إرتفاع نسب إنزيمات كبد معينة في الدم) الذي يظهر في فحوصات الدم
- إنخفاض في كثافة الشعر

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- إنفلونزا، تلوّث في الطرق التنفسية العلوية، تلوّث في المسالك البولية، التهاب القصبات الهوائية، التهاب الجيوب الأنفية، ألم في الحنجرة وإنزعاج أثناء البلع، التهاب المثانة البولية، التهاب فيروسى في المعدة وفي الأمعاء، تلوّث في السن، التهاب الحنجرة، تلوّث فطري في الرجل

- تلوّثات بفيروس الهريس، بما في ذلك هريس جوف الفم والهريس النطاقي (herpes zoster)، مع أعراض مثل حويصلات، شعور بحرقة، حكة، خدر أو ألم في الجلد، عادة في جانب واحد من الجزء العلوي من الجسم أو الوجه، وأعراض أخرى، مثل سخونة وضعف
- قيم مخبرية: لوحظ إنخفاض في تعداد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تغيرات في نتائج فحوص وظائف الكبد وتعداد خلايا الدم البيضاء (أنظر الفقرة 2)، كذلك إرتفاع في إنزيم العضل (كرياتين فوسفوكيناز)
- ردود فعل تحسسية معتدلة
- شعور بالقلق

- الشعور بتنمل (كوخز الإبر)، شعور بالضعف، خدر، وخز أو ألم في أسفل الظهر أو في الرجل؛ خدر، حرقة، وخز أو ألم في راحتي اليدين وفي الأصابع (متلازمة النفق الرُسغي)

- الشعور بنبضات القلب
- إرتفاع ضغط الدم
- غثيان (تقيؤات)، آلام في الأسنان، ألم في أعلى البطن
- طفح، حب الشباب
- ألم في الأوتار، المفاصل، العظام، آلام عضلية (آلام عضلية وهيكلية)
- الحاجة للتبول في أوقات أكثر تقارباً من المعتاد
- دورات طمثية تترافق بنزف شديد
- ألم
- قلة حيوية أو الشعور بضعف عام
- إنخفاض الوزن

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

- إنخفاض في عدد الصفائح الدموية (قلة الصفائح الدموية)
- فرط الشعور أو حساسية زائدة، خاصة في الجلد، وخز أو ألم نابض على طول مسار عصب واحد أو أكثر، مشاكل في أعصاب الذراعين أو الرجلين (إعتلال عصبي محيطي)
- مشاكل في الأظافر، أعراض جلدية خطيرة
- ألم بعد رضّة (Post-traumatic)
- مرض الصدفية
- التهاب الفم أو الشفتين
- نسب غير إعتيادية للشحوم (lipids) في الدم
- التهاب في الأمعاء (colitis)
- أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص):
- التهاب أو تضرر الكبد

غير معروف (لا يمكن تقييم الشيع من المعطيات المتوفرة):

- فرط ضغط الدم الرئوي

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

#### 5 كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### شروط التخزين

خزّن في العلبة الأصلية. خزّن بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية.

لا ترم أي دواء عن طريق المجاري أو النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الإستعمال. هذه الإجراءات تساهم في الحفاظ على جودة البيئة.

#### 6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Lactose monohydrate, maize starch (corn starch), microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (Type A), hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171), talc, macrogol (polyethylene glycol), indigo carmine aluminum lake (E132).

كيف يبدو الدواء وما محتوى العلبة:

أقراص مطلية بلون أزرق فاتح، خماسية الشكل، مع الطباعة ("14") على جانب واحد وشعار الشركة منحوت بالجانب الثاني.

العلبة: 5 أو 28 قرصاً مطلياً. من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي إسرائيل م.ص.، مَجْمَعُ چرينوروك، ص.ب. 47 ياكوم.

لا تحوي هذه النشرة كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفر لديك أي سؤال أو إذا كنت غير واثق من أمر ما، الرجاء التوجه للطبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 151-36-33946

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في آذار 2025.