

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986**  
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

**جيوتريف 20 ملغ**  
**جيوتريف 30 ملغ**  
**جيوتريف 40 ملغ**  
**أقراص مغلفة**

كل قرص مغلف من جيوتريف 20 ملغ يحتوي على 20 ملغ أفاتينيب (ك ديمالات) (afatinib (as dimaleate)).  
كل قرص مغلف من جيوتريف 30 ملغ يحتوي على 30 ملغ أفاتينيب (ك ديمالات) (afatinib (as dimaleate)).  
كل قرص مغلف من جيوتريف 40 ملغ يحتوي على 40 ملغ أفاتينيب (ك ديمالات) (afatinib (as dimaleate)).

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر - انظر البند 2 "قبل استعمال الدواء" تحت العنوان "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها، وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

احتفظ بالنشرة. قد تحتاج إلى قرائتها مرّة أخرى.

هذا الدواء وصف لك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.

**1. لم أعد هذا الدواء؟**

يُستعمل جيوتريف كعلاج وحيد (معالجة أحادية الدواء) لعلاج:

- مرضى بالعمون الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، التي تتميز بتغيّر (طفرة) في الجين في EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)، الذين مرضهم موجود في مرحلة متقدمة موضعية أو نقيلية، والذين لم يتم علاجهم بعد بمثبطات تيروسين كيناز للمستقبل EGFR.
- مرضى بالعمون الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) من مصدر خلايا حرشفية (squamous)، والذين مرضهم موجود في مرحلة متقدمة موضعية أو نقيلية، والذي تطوّر خلال أو بعد علاج كيميائي مركّز على البلاتين.

المجموعة العلاجية: مضادّ للأورام، مثبطات تيروسين كيناز.

جيوتريف هو دواء يحتوي على المادة الفعّالة أفاتينيب. يعمل الدواء على حجب عمل مجموعة بروتينات تدعى عائلة ErbB. تشارك هذه البروتينات في نمو وانتشار خلايا سرطانية، وممكن أن تتأثر من تغييرات في الجينات (طفرات) التي تقوم بإنتاجها. من خلال حجب عمل هذه البروتينات، يستطيع هذا الدواء أن يثبط نمو وانتشار خلايا سرطانية.

**2. قبل استعمال الدواء**

**يُمنع استعمال الدواء إذا:**

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعّالة أفاتينيب أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 2 "قبل استعمال الدواء" تحت العنوان "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية").
- كنت حاملاً أو مرضعة.

**تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء**

**قبل العلاج بـ جيوتريف، أخبر الطبيب إذا:**

- كان وزنك أقل من 50 كغم، إذا كنت امرأة، أو إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى. إذا كان أحد هذه المعايير ينطبق عليك، قد يحتاج الطبيب إلى مراقبة حالتك عن كثب، وذلك لأنّ الأعراض الجانبية قد تكون ظاهرة وحادة أكثر.
- كان لديك تاريخ مرضي من التهاب الرئتين (مرض رئوي خلالي).
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد. من المحتمل أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوصات كبد معينة. لا يُنصح العلاج بهذا الدواء إذا كنت تعاني من مرض كبد خطير.
- كان لديك تاريخ مرضي من مشاكل في العينين مثل جفاف شديد في العينين، التهاب في الطبقة الشفافة في القسم الخارجي من العين (القرنية) أو تقرّحات تشمل القسم الخارجي من العين، أو إذا كنت تستعمل عدسات لاصقة.

- كان لديك تاريخ مرضي من مشاكل في القلب. قد يحتاج طبيبك إلى مراقبة حالتك عن كثب.

أخبر الطبيب فورًا إذا خلال العلاج بالدواء:

- تطوّر إسهال. تلقى العلاج عند ظهور العلامات الأولى من الإسهال هو أمر مهم.
- تطوّر طفح جلدي. تلقى علاج ميكرو للطفح الجلدي هو أمر مهم.
- تطوّر فجأة ضيق تنفس أو تفاقم، من المحتمل أن يكون مصحوبًا بسعال أو بحمى. قد تكون هذه أعراض التهاب رئوي (مرض رئوي خلالي) الذي قد يشكل خطرًا على الحياة.
- كنت تعاني من ألم شديد في المعدة أو في الأمعاء، حمى، قشعريرة، غثيان، تقيؤ أو تصلب بطني أو انتفاخ. قد تكون هذه أعراض تمزق في جدار المعدة أو في الأمعاء (تتقب في جهاز الهضم). كما ويجب إخبار الطبيب إذا عانيت في الماضي من تقرحات في جهاز الهضم أو من مرض رنجي (diverticular disease)، أو إذا كنت تتعالج بالمقابل بأدوية مضادة للالتهاب (NSAIDs) (تستعمل لتخفيف الألم ولعلاج الانتفاخ) أو ستيروينيدات (تستعمل لعلاج الالتهابات وأنواع حساسية)، لأن هذه الأدوية قد تزيد من الخطورة.
- تطوّر لديك احمرار وألم شديدين في العين أو إذا تفاقما، إذا كانت العين تدمع أكثر، عدم وضوح الرؤية لديك و/أو وجود حساسية للضوء. من المحتمل أن تحتاج تلقي علاج طارئ.

انظر أيضًا البند 4 "أعراض جانبية".

#### الأطفال والمراهقون

غير موصى باستعمال جيوتريف للأطفال أو للمراهقين. يُمنع إعطاء هذا الدواء للأطفال أو للمراهقين تحت سن 18 عامًا.

#### تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

- وبشكل خاص، فإن تناول الأدوية التالية قبل جيوتريف من الممكن أن يزيد من مستويات الدواء جيوتريف في الدم، وبالتالي زيادة خطر ظهور أعراض جانبية. لذلك يجب تناول هذه الأدوية بعيدًا قدر الإمكان عن موعد تناول جيوتريف. أي، يُفضّل أن يكون فارق زمني يبلغ 6 ساعات (إذا كان الدواء الإضافي يتم تناوله مرتين في اليوم) أو فارق زمني يبلغ 12 ساعة (إذا كان الدواء الإضافي يتم تناوله مرة في اليوم) من موعد تناول جيوتريف:
- ريتونافير، كتوكونزول (إلا إذا كان موجودًا في الشامبو)، إيتراكونزول، إريثروميسين، نلفينافير، سكوبينافير – تُستعمل لعلاج حالات عدوى مختلفة.
- فيرإمبل، كينيدين، إميدرون – تُستعمل لعلاج أمراض قلب.
- سيكلوسبورين A، تكلوليموس – أدوية التي تؤثر على جهاز المناعة لديك.

الأدوية التالية يمكن أن تقلل من نجاعة جيوتريف:

- كاربامازيبين، فنيوتين، فنوباربيتال – تُستعمل لعلاج حالات الاختلاج.
  - خلاصة العرن (نبته سانت جون St. John's Wort)، دواء نباتي لعلاج الاكتئاب.
  - ريفامبيسين، مضاد حيوي يُستعمل لعلاج السل.
- اسأل الطبيب إذا لم تكن متأكدًا متى يجب عليك تناول هذه الأدوية.

قد يزيد جيوتريف من مستويات أدوية أخرى في الدم. من الممكن أن تكون هذه الأدوية، ولكن ليس فقط:

- سولفسلازين، يُستعمل لعلاج الالتهاب/العدوى.
- روزوفاستاتين، يُستعمل لخفض الكوليسترول.

أخبر الطبيب قبل أن تتناول أي من هذه الأدوية سويًا مع جيوتريف.

#### استعمال الدواء والغذاء

من المهم تناول هذا الدواء على معدة فارغة. يجب تناول القرص ساعة واحدة على الأقل قبل وجبة الطعام، أو إذا تناولت الطعام، فعليك الانتظار مدة 3 ساعات على الأقل قبل تناول القرص.

#### الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين الحمل، استشيرى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

## الحمل

يجب عليك الامتناع عن الحمل خلال تناول هذا الدواء. إذا كانت هناك إمكانية أن تحملي، يجب عليك استعمال وسائل منع حمل آمنة خلال العلاج وعلى الأقل شهرًا واحدًا بعد تناول الجرعة الأخيرة من هذا الدواء، لأنَّ هناك خطرًا بالتسبب بضرر للجنين.

يجب عليك إبلاغ الطبيب فورًا إذا حملت خلال العلاج بهذا الدواء. سيقدر الطبيب سويًا معك فيما إذا كان عليك الاستمرار بالعلاج أو إيقافه.

إذا كنت تخططين الحمل بعد تناول الجرعة الأخيرة من هذا الدواء، يجب عليك استشارة الطبيب لأنه من المحتمل ألا يكون الدواء قد أفرز من جسمك بعد بشكل تام.

## الإرضاع

يُمنع الإرضاع خلال تناول هذا الدواء، لأنه لا يمكن استبعاد خطر إلحاق الضرر بطفلك الرضيع.

## السياقة واستعمال الماكينات

إذا واجهت أعراض تتعلق بالعلاج والتي تؤثر على رؤيتك (مثلًا احمرار و/أو تهيج بالعين، جفاف بالعين، سيلان الدمع، حساسية للضوء) أو تؤثر على قدرتك على التركيز ورد الفعل لديك، يوصى بأن لا تقود السيارة أو تشغيل ماكينات إلى أن تزول هذه الأعراض (انظر البند 4 "أعراض جانبية").

## معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على سكر يُدعى لاكتوز. إذا أخبرك الطبيب أنك تعاني من عدم قدرة تحمل لسكرات معينة، توجه إلى الطبيب قبل بدء تناول هذا الدواء.

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.  
من المحتمل أن يلائم الطبيب جرعتك (أن يزيدها أو يقللها) بحسب قدرة احتمالك لهذا الدواء.  
غير موصى باستعمال هذا الدواء لمرضى يعانون من مرض كبدى أو مرض كلوي شديد.  
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

## طريقة استعمال الدواء:

- من المهم تناول هذا الدواء على معدة فارغة.
- يجب تناول القرص ساعة واحدة على الأقل قبل وجبة الطعام، أو إذا تناولت الطعام، فعليك الانتظار مدة 3 ساعات قبل تناول القرص.
- يجب تناول هذا الدواء مرة واحدة في اليوم. يجب الحرص على تناول الدواء في ساعة ثابتة كل يوم، بحيث يسهل عليك هذا الأمر تذكر تناول هذا الدواء.
- يُمنع كسر، مضغ أو سحق القرص.
- يجب بلع القرص كاملاً مع كأس من الماء.

يجب تناول جيوتريف عن طريق الفم. إذا كنت تواجه صعوبات في بلع القرص، ممكن إذابته بكأس من الماء. يُمنع إذابة القرص في سائل آخر غير الماء. ضع القرص داخل الماء من دون سحقه وأخلطه من مرة إلى أخرى، وليس أكثر من 15 دقيقة إلى أن يتحلل القرص إلى أجزاء صغيرة جدًا. اشرب السائل فورًا. بعد ذلك، قم بملأ الكأس مرة أخرى بالماء واشربها، للتأكد من أنه قد تم تناول الدواء كله.

إذا كنت غير قادرًا على البلع، ولديك أنبوب تغذية معوي، فمن المحتمل أن يقترح الطبيب إعطائك الدواء عن طريق هذا الأنبوب.

## إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

يجب عليك الاتصال فورًا بالطبيب أو الصيدلي. من المحتمل أن تشعر بأعراض جانبية متزايدة، وقد يوقف طبيبك العلاج بشكل مؤقت ويعطيك علاج داعم.  
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فورًا، إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك

## إذا نسيت تناول الدواء

- إذا كان موعد تناول الجرعة التالية هو بعد أكثر من 8 ساعات، تناول الجرعة التي نسيته لحظة تذكرك ذلك.

- إذا كان موعد تناول الجرعة التالية هو بعد أقل من 8 ساعات، تجاوز الجرعة التي نسبتها وتناول جرعة التالية في موعدا المحدد. بعد ذلك، يجب الاستمرار في تناول الأقراس في موعدا المحدد كالمعتاد.
- يُمنع تناول جرعة مضاعفة (قرصان بدلاً من قرص واحد في الوقت ذاته) من أجل التعويض عن الجرعة التي نسبتها. يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.
- حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

#### إذا توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن تناول هذا الدواء بدون استشارة مسبقة مع الطبيب. من المهم تناول هذا الدواء في كل يوم، ما دام الطبيب يصف لك الدواء. إذا لم تأخذ هذا الدواء بحسب ما وصف لك الطبيب، من المحتمل أن يعود السرطان لديك مرة أخرى.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. أعراض جانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال جيوتريف أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

توجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية الخطيرة المسجلة أدناه. في حالات معينة، من المحتمل أن يضطر الطبيب أن يوقف مؤقتاً العلاج وأن يقلل جرعة جيوتريف، أو إيقاف العلاج:

- **إسهال** (عرض جانبي شائع جداً، عرض يظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 10) الإسهال الذي يستمر لأكثر من يومين أو إسهال شديد جداً، من الممكن أن يؤدي إلى فقدان سوائل (شائع، وقد يؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10)، مستويات بوتاسيوم منخفضة في الدم (شائع) وتفاقم في أداء وظائف الكلى (شائع). الإسهال قابل للعلاج. مع ظهور العلامات الأولى للإسهال، يجب عليك شرب الكثير من السوائل. توجه فوراً إلى الطبيب وابدأ بعلاج ملانم مضاد للإسهال بأسرع وقت ممكن. يجب أن يكون في حوزتك دواء متوفر مضاد للإسهال، قبل بدء العلاج بـ جيوتريف.
- **طفح جلدي** (عرض جانبي شائع جداً، عرض يظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 10) من المهم علاج الطفح الجلدي مبكراً عند ظهوره. أخبر الطبيب إذا ظهر لديك طفح جلدي. إذا لم يكن علاج الطفح الجلدي مفيداً وتفاقمت حالة الطفح إلى أسوأ (مثلاً، إذا ظهر لديك تقشر أو بثور على الجلد)، يجب عليك تبليغ الطبيب فوراً، لأنه من المحتمل أن يقرر الطبيب إيقاف العلاج بـ جيوتريف. من الممكن أن يظهر الطفح الجلدي أو أن يتفاقم في المناطق المكشوفة للشمس. يوصى بأن تحمي نفسك من الشمس بواسطة ملابس واقية وكريم حماية.
- **التهاب الرئة** (عرض جانبي غير شائع، عرض يظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000) يُدعى "مرض الرئة الخلالي". أخبر طبيبك فوراً إذا تطورت لديك أو إذا تفاقت حالة ضيق تنفس بشكل فجائي، ومن المحتمل أن يكون مصحوباً بسعال أو بحمى.

- **تهيج أو التهاب عيني** ممكن أن يحدث تهيج أو التهاب عيني [التهاب الملتحمة/جفاف في العين (أعراض شائعة) والتهاب في القرنية (عرض غير شائع)]. أخبر الطبيب إذا ظهرت لديك بشكل مفاجئ أو إذا تفاقت أعراض عيني مثل ألم أو احمرار أو جفاف في العينين.

إذا كنت تشعر بواحد من الأعراض المذكورة أعلاه، توجه فوراً إلى طبيبك بأسرع وقت ممكن.

#### أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 10):

- قروح والتهاب في الفم
- عدوى في الأظافر
- تراجع في الشهية
- نزيف من الأنف
- غثيان
- تقيؤ
- حكة
- جفاف الجلد

#### أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100):

- ألم، احمرار، انتفاخ أو تقشر الجلد في كفوف القدمين واليدين
- ارتفاع في مستويات انزيمات الكبد (AST - أسبارتات أمينوترانسفيراز و- ALT ألانين ترانساميناز) في فحوصات الدم
- التهاب بطانة المثانة المصحوب بشعور بالحرقنة أثناء التبول والحاجة المتواترة والطارئة للتبول (التهاب المثانة)
- اضطرابات شاذة في المذاق (خلل التنوق)
- ألم بطن، اضطرابات هضم، حرقنة
- التهاب الشفاه
- انخفاض في الوزن
- رشح
- انقباضات في العضلات
- حمى
- مشاكل في الأظافر

#### أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- التهاب في البنكرياس
- ظهور تمزق في جدار المعدة أو الأمعاء (تنقبج جهاز الهضم)
- نمو شاذ لرموش عينيك (وهذا يشمل نمو بالاتجاه الخطأ، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضرر في سطح العين)

#### أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- حالة خطيرة من وجود بثور على الجلد أو تقشر الجلد [قد يرمز ذلك إلى متلازمة ستيفنز - جونسون (Stevens-Johnson syndrome) وتقشر الأنسجة المتطورة البشرية التسممي (Toxic epidermal necrolysis)].

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.au](http://www.health.gov.au)) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

#### 5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على عبوة الكرتون، غلاف الشريط والشريط (بليستر) نفسه. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- **شروط التخزين:** يجب التخزين في درجة حرارة تحت الـ 25°C. احفظ في العبوة الأصلية من أجل الحماية من الرطوبة ومن الضوء. بعد فتح غلاف الشريط (بليستر) لأول مرّة، يمكن استعمال الأقراص الموجودة في الشريط خلال 14 يومًا.
- يُمنع إلقاء الأدوية في سلّة المهملات في البيت أو في مياه الصرف الصحيّ. قم باستشارة الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على:

**Giotrif 20 mg:** Lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose 2910, titanium dioxide, silica colloidal anhydrous, talc, macrogol 400, polysorbate 80.

**Giotrif 30 mg:** Lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose 2910, talc, silica colloidal anhydrous, macrogol 400, titanium dioxide, Indigo carmine aluminium lake, polysorbate 80.

**Giotrif 40 mg:** Lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose 2910, titanium dioxide, silica colloidal anhydrous, talc, macrogol 400, polysorbate 80, Indigo carmine aluminium lake.

كل قرص مغلف من جيوتريف 20 ملغ يحتوي على 124 ملغ لاکتوز مونوهيدرات.  
كل قرص مغلف من جيوتريف 30 ملغ يحتوي على 186 ملغ لاکتوز مونوهيدرات.

كل قرص مغلف من جيوتريف 40 ملغ يحتوي على 248 ملغ لاكلتوز مونوهيدرات.

- كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:
  - جيوتريف 20 ملغ: قرص مغلف، مستدير، محدب من كلا الجانبين مع أطراف مائلة، بلون أبيض حتى مائل إلى الأصفر. على واحدة من جهات القرص مختوم "T20"، وفي الجهة الثانية مختومة العلامة التجارية لشركة بوننجر إنجلهايم.
  - جيوتريف 30 ملغ: قرص مغلف، مستدير، محدب من كلا الجانبين مع أطراف مائلة، بلون أزرق داكن. على واحدة من جهات القرص مختوم "T30"، وفي الجهة الثانية مختومة العلامة التجارية لشركة بوننجر إنجلهايم.
  - جيوتريف 40 ملغ: قرص مغلف، مستدير، محدب من كلا الجانبين مع أطراف مائلة، بلون أزرق فاتح. على واحدة من جهات القرص مختوم "T40"، وفي الجهة الثانية مختومة العلامة التجارية لشركة بوننجر إنجلهايم.
- 7 أقراص مغلقة في كل شريط (بليستر)، المرزومة مع ماص للرطوبة داخل غلاف الشريط. يُمنع بلع ماص الرطوبة.
- يوجد 7، 14 أو 28 قرصًا مغلفًا في عبوة الكرتون.
- من المحتمل ألا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.
- اسم صاحب التسجيل، المستورد وعنوانه: بورنجر إنجلهايم إسرائيل م.ض.، مدينت هيهوديم 89، ص.ب. 4124، هرتسليا بيتواح 4676672.

• تم تحرير هذه النشرة في حزيران 2025.

- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

جيوتريف 20 ملغ	151-47-33984-00
جيوتريف 30 ملغ	151-48-33986-00
جيوتريف 40 ملغ	151-49-33987-00

- لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.