

## ناكسين 500 ملغ أقراص

### التركيب

يحتوي كل قرص على:

ناپروكسين 500 ملغ (Naproxen 500 mg)

لمعلومات عن مركبات غير فعالة ومؤثرة للحساسية أنظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء"، والبند 6 - "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.  
هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

### 1. لم أعد هذا الدواء؟

**ناكسين 500 ملغ معد لاستعمال في الحالات التالية:**

- للتخفيف من علامات وأعراض أمراض روماتيزمية (رتوية)، بما في ذلك التهاب المفاصل التنكسي (الفصال العظمي)، التهاب الفقار المقسط، سواء في علاج النوبات الحادة أو في العلاج المتواصل للمرض.
- التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأطفال.
- اضطرابات في الجهاز العضلي-الهيكلية والاضطرابات في منطقة المفصل.
- تخفيف الألم الناتج عن التهاب الوتر (tendinitis)، التهاب كيسبي (bursitis)، التهاب الغشاء الزليلي (synovitis)، التهاب عمدة الوتر (tenosynovitis)، وآلام أسفل الظهر (lumbago).
- تخفيف الألم، الانتفاخ، الحساسية، والسخونة الناتجة عن التهاب المفاصل التقرسي الحاد (gouty arthritis).
- تخفيف أعراض آلام الطمث.

**المجموعة العلاجية:** مضادات التهاب غير ستيرويديّة (NSAIDs).

### 2. قبل استعمال الدواء

**يُمنع استعمال الدواء إذا:**

- وجدت لديك حساسية ل نايبروكسين، ل نايبروكسين صوديوم أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (أنظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية").
- وجدت لديك حساسية للأسبيرين، لدواء آخر من مجموعة مضادات الالتهاب غير الستيرويديّة (NSAIDs) أو لكل دواء مسكن الألم آخر (مثل إيبوبروفين أو ديكولوفيناك).
- كانت توجد لديك اليوم أو في الماضي أية مشاكل في المعدة أو في الأمعاء مثل قرحة أو نزيف.
- عانيت في الماضي من نزيف أو من تثقب في المعدة أثناء تناول أدوية من مجموعة NSAIDs.
- كانت لديك مشاكل خطيرة في الكلى، في الكبد أو في القلب.
- كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

**تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء**

**قبل العلاج بـ ناكسين 500 ملغ أخير الطبيب أو الصيدلي إذا كانت لديك مشاكل في القلب، إذا كان لديك في الماضي سكتة دماغية أو إذا كنت تعتقد بأنك معرض لخطر حصول هذه الحالات (مثلاً، في حال كان لديك ضغط دم مرتفع، سكري، مستوى كولسترول مرتفع أو إذا كنت مدخنًا).**

**قبل بدء العلاج بـ ناكسين 500 ملغ، أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كانت لديك إحدى الحالات التالية:**

- ربو أو حالات حساسية (مثل رشح حساسي) أو إذا كان لديك في الماضي انتفاخ في الوجه، الشفتين، العينين أو اللسان.
- إحساس بالضعف (قد يكون ذلك بسبب المرض) أو إذا كنت مسنًا.
- كتل (زوائد لحمية) في الأنف، إذا كنت تعطس كثيرًا أو إذا كنت تعاني من الرشح، أنف مسدود أو تهيّج في الأنف (التهاب في الأنف).
- مشاكل في الكلى أو في الكبد.
- مشاكل في تخثر الدم.
- مشاكل في الأوعية الدموية (شرايين) في قسم معين في الجسم.
- مستوى مرتفع جدًا من الدهون في الدم (فرط الدهون في الدم - Hyperlipidemia).
- مرض مناعي ذاتي، مثل الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) أو systemic lupus erythematosus، الذي يسبب آلام مفاصل، طفح جلدي وسخونة) والتهاب الأمعاء الغليظة (التهاب القولون - Colitis) أو مرض كرون (وهي حالات التي تؤدي إلى التهاب في الأمعاء، الأم في البطن، حالات إسهال، تقبؤات وانخفاض في الوزن).
- إذا اضطبت عليك إحدى الحالات أعلاه أو إذا لم تكن متأكدًا، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

### الأطفال والمراهقون

لتعليمات الاستعمال للأطفال والمراهقين، انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟".

### الفحوصات والمتابعة

أثناء العلاج بـ ناكسين 500 ملغ قد يطلب الطبيب رويتك للتأكد من أنك تحصل على الجرعة المناسبة ولا تتلفق مما إذا كانت هناك أي أعراض جانبية. وهذا مهم بشكل خاص لدى المتعاطين المسنين.

### ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:  
• مسكّنات الألم أخرى، مثل أسبيرين، إيبوبروفين، ديكولوفيناك وإبراسيتامول.  
• أدوية لمنع تخثر الدم، مثل أسبيرين/حمض أسيتيل ساليسيليك، وارفارين، هيبارين أو كلوبيدوجريل.  
• هيدانتوين (للصرع)، مثل فينتوبين.  
• سولفوناميدات مثل هيدروكلوروثيازيد، أسيتازولاميد، إينداميد، بما في ذلك مضاد حيوي من مجموعة السولفوناميدات (ضد حالات العدوى).  
• سولفونولوريا (للسكري)، مثل جلبيبيريد أو جلبيزيد.  
• مثبّطات ACE أو أي دواء آخر لضغط الدم المرتفع مثل: سيلزابريل، إينالبريل أو بروبونولول.  
• حاصرات المستقبل أنجيوتنسين 2، مثل كانديسرتان، إپروسارتان أو لوسارتان.  
• مدرّات البول (لعلاج ضغط الدم المرتفع)، مثل فوروسيميد.  
• جليكوزيدات قلبيّة (لعلاج مشاكل القلب)، مثل ديجوكسين.  
• ستيرويدات (لانتفاخ ولالتهاب)، مثل هيدروكورتيزون، پردنيزولون وديكساميثازون.  
• مضاد حيوي من مجموعة الكونولونات (ضد حالات العدوى)، مثل سيبروفلوكساسين أو موكسيفلوكساسين.  
• أدوية معينة لمشاكل نفسية مثل ليثيوم أو أدوية من مجموعة SSRIs (مثبّطات انتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين) مثل فلواوكسيتين أو سيتالوبرام.  
• بروبيسيد (للقرص).

ميثورتيكسات (يستعمل لعلاج مشاكل في الجلد، التهاب مفاصل أو سرطان).

• سيكلوسبورين أو تاكروليموس (مشاكل في الجلد أو العلاج بعد زرع أعضاء).

• زيدوفودين (لعلاج الإيدز وحالات عدوى HIV).

• فينيترون (يستعمل لوقف الحمل (للإجهاض) أو لتحفيز الولادة إذا مات الجنين).

إذا كنت تتناول إحدى هذه الأدوية المذكورة أعلاه أو إذا لم تكن متأكدًا، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

### استعمال الدواء والغذاء

يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء. يجب تناول الدواء مع أو بعد وجبة الطعام.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

- لا تتناولي ناكسين 500 ملغ خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل، إلا إذا كان ذلك ضروريًا وهكذا أوصلك الطبيب. إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل أو عندما تحاولين الحمل، فاستمعي لقل جرعة ممكنة وأقصر مدة ممكنة. إذا تم تناول ناكسين 500 ملغ بعد الأسبوع العشرين من الحمل ولمدة تزيد عن بضعة أيام، فقد يسبب مشاكل في الكلى لدى الجنين التي قد تسبب نقصًا في السائل الأمنيوسي أو تضيق الأوعية الدموية في قلب الجنين (القناة الشريانية). إذا كنت بحاجة إلى علاج لأكثر من بضعة أيام، يجب استشارة الطبيب. قد يوصي طبيبك بمتابعة إضافية.
- يُمنع تناول ناكسين 500 ملغ إذا كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، لأن هذا ممكن أن يسبب ضررًا للجنين. قد يسبب العلاج تضررًا في كلي الجنين وقلبه، ويؤثر على ميك أنت والجنين إلى الزيف ويسبب ولادة متأخرة أو أطول من المتوقع.
- إذا كنت حاملًا أو مرضعة، فتعديدين بأنك حامل أو تخططين للحمل أو تحاولين الحمل، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
- ناكسين 500 ملغ ممكن أن يؤدي إلى صعوبات في أن تحملي. يجب عليك إخبار الطبيب إذا كنت تخططين أن تحملي أو إذا واجهت صعوبات في أن تحملي.

### السياقة واستخدام الماكينات

ناكسين 500 ملغ ممكن أن يؤدي إلى تعب، نعاس، دوام، مشاكل في الرؤية والتوازن، شعور بالانكباب أو صعوبات نوم. إذا كنت تواجه إحدى هذه الأعراض عليك إخبار الطبيب وعليك تجنب القيادة أو استعمال الأدوات أو الماكينات.

### معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على لاكتوز. إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم قدرة تحمّل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
- يحتوي الدواء على مادة ملونة صفراء تدعى سانسييت FCF (Sunset yellow FCF (E 110)، FD&C Yellow No. 6) التي ممكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددانها الطبيب، فقط.

**في حال الحاجة إلى جرعة مقدارها 250 ملغ أو أي جرعة أخرى لا يمكن الوصول إليها باستخدام المستحضر بالعين المتوفرة، يجب التوجه إلى الطبيب للحصول على مستحضر بديل.** سيرشدك الطبيب إلى الطريقة التي يمكن بها الوصول إلى الجرعة المطلوبة.

الجرعة المتبعة عادة هي:

### الأمراض الروماتيزمية (الرتوية):

الجرعة اليومية الموصى بها هي 500 ملغ أو 1000 ملغ مرة واحدة في اليوم، في الصباح أو في المساء. كبديل، يمكن تناول 250 ملغ أو 500 ملغ مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً، مع فاصل زمني قدره 12 ساعة بين الجرعتين.

### اضطرابات عضلية-هيكلية واضطرابات في منطقة المفصل

الجرعة الابتدائية هي 500 ملغ، تليها 250 ملغ بفواصل زمنية من 8-12 ساعة.

### التهاب مفاصل تقرسي حاد

الجرعة الابتدائية هي 750 ملغ، وبعد 8 ساعات تناول 500 ملغ، ثم 250 ملغ كل 8 ساعات حتى زوال النوبة.

### آلام الطمث

500 ملغ عند ظهور آلام الطمث، ثم 250 ملغ كل 6 ساعات حتى زوال الأعراض، بينما الجرعة القصوى هي 1250 ملغ في اليوم.

نقلت انتباهك: في الجرعات التي تتطلب تناول 250 ملغ، يجب التفكير في استعمال مستحضر دوائي بديل، نظرًا لعدم إمكانية شطر القرص، لأنه لا يحتوي على خط شطر.

### التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأطفال

للأطفال فوق عمر 5 سنوات: الجرعة اليومية الموصى بها هي 10 ملغ لكل كغم من وزن الجسم في اليوم، تُقسم إلى جرعتين يوميًا، بفصل من 12 ساعة بين الجرعتين. في الحالات التي تتطلب فيها الجرعة المسبوبة بحسب الوزن جرعة أعلى من 500 ملغ، يجب التفكير في علاج بديل.

### المسنّون والمتعاطون الذين يعانون من مشاكل في الكبد

إذا كنت مسنًا أو تعاني من مشكلة في الكبد، فيسوق الطبيب بتحديد الجرعة المناسبة لك، والتي عادةً ما تكون أقل من الجرعة المتبعة.

### يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

### طريقة الاستعمال:

- يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء.
- يجب تناول الدواء مع أو بعد وجبة الطعام.
- لا تتوفر معلومات بخصوص السحق والمضغ. يُمنع شطر القرص نظرًا لعدم وجود خط شطر في القرص.

من المحتمل أن تكون لأدوية معينة مثل ناكسين، علاقة مع ارتفاع صغير في خطورة حدوث نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغية. تزداد هذه الخطورة عند تناول جرعة أعلى وعند الاستعمال لفترة طويلة. يُمنع تجاوز (تناول أكثر) الجرعة الموصى بها أو تجاوز فترة العلاج الموصى بها. استشر الطبيب إذا لم تكن متأكدًا.

يجب الحرص على الشرب بصورة كافية خلال العلاج بـ ناكسين 500 ملغ. هذا الأمر هام جدًا خاصة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

خلال العلاج بـ ناكسين 500 ملغ، من المحتمل أن يطلب منك الطبيب زيارته من أجل الفحص فيما إذا كنت تتناول الجرعة الملائمة لك ولحوص وجود أعراض جانبية. هذا الأمر هام بالنسبة للمرضى المسنين.

**إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى،** إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بإبتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

### إذا نسيت تناول الدواء

- إذا نسيت تناول جرعة، تجاوز الجرعة التي نسيتها وتناول الجرعة التالية كالمعتاد.
- يُمنع تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة التي نسيتها.

**يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال ناكسين 500 ملغ أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

قد تكون الأدوية مثل ناكسين 500 ملغ مرتبطة بحدوث ارتفاع طفيف في خطورة الإصابة بنبوة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغية.

**يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فورًا إلى الطبيب إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية. من المحتمل أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ بشكل فوري:**

**مشاكل خطيرة في المعدة أو في الأمعاء، وتشمل العلامات:**

- نزيف من المعدة، الذي يتجلى من خلال قيء مع دم أو قطع صغيرة التي تبدو كحبوب القهوة.
- نزيف من فتحة الشرج الذي يتجلى كبراز لزج وأسود أو إسهال دموي.
- تقرحات أو تكون قيوب (انتفاخ) في المعدة أو في الأمعاء. تشمل العلامات لذلك انزعاج في البطن، آلام بطن، سخونة، غثيان أو تقيؤ.
- مشاكل في البنكرياس. تشمل الأعراض آلام بطن شديدة التي تمتد باتجاه الظهر.
- تفاقم في التهاب القولون التقرحي أو في مرض كرون، الذي يتجلى بالآلام، حالات إسهال، تقيؤات وفقدان الوزن.

**ردود فعل تحسسية، وتشمل العلامات:**

- انتفاخ جانبي في الحنجرة، في الوجه، اللسان أو القدمين.
- صعوبات تنفس، ضغط في الصدر.
- حالات طفح جلدي، حويصلات أو حكة.
- طفح منتشر.
- سخونة مرتفعة.

**حالات طفح جلدي شديدة، وتشمل العلامات:**

- طفح جلدي شديد، مع حويصلات أو تقشرات في الجلد، ومن المحتمل أيضًا ظهور حويصلات في الفم، في اللق أو في العينين. من المحتمل أن تظهر في الوقت ذاته سخونة، حالات صداع، سعال وآلام في الجسم.
- حويصلات في الجلد في أعقاب التعرض لأشعة الشمس (بُروفرية جلدية متأخرة) التي تظهر بالأساس في الذراعين، في الوجه وفي اليدين.
- رد فعل جلدي تحسسي فريد وهو رد فعل جلدي تجاه الدواء في مكان ثابت (fixed drug eruption)، والذي يعود عادةً في نفس المكان/الأماكن عند التعرض المتكرر للدواء، وقد يظهر على شكل دائري أو بيضاوي بقع حمراء وانتفاخ في الجلد، حويصلات (شرى) وحكة.

**مشاكل في الكبد، وتشمل العلامات:**

- اصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان).
- إحساس بالتهعب، نقص الشهية، غثيان أو تقيؤ وبرزاز فاتح (التهاب في الكبد)، ومشاكل التي تظهر في فحوصات الدم (وهذا يشمل التهاب الكبد).
- ارتفاع بِلزيمات الكبد.

**نوبة قلبية، وتشمل العلامات:**

• ألم في الصدر الذي قد ينتشر إلى الرقبة، إلى الكتفين وفي أسفل الذراع الأيسر.

**سكتة دماغية، وتشمل العلامات:**

- ضعف عضلات وانعدام الإحساس (خدر). هذه الأحاسيس قد تظهر فقط في جهة واحدة من الجسم.
- تغير فجائي في حاسة الشم، الذوق، السمع أو الرؤية، ارتباك.

**التهاب السحايا، وتشمل العلامات:**

- سخونة، غثيان أو تقيؤ، تصلب الرقبة، صداع، حساسية للضوء الساطع وارتباك (خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مناعية ذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية).

**أعراض جانبية إضافية**

**المعدة والأمعاء**

- حرقة، صعوبات هضم، ألم بطن، غثيان أو تقيؤ، إمساك، إسهال، غازات.

**جهاز الدم**

- مشاكل في الدم، مثل فقر الدم أو تغييرات في عدد خلايا الدم البيضاء.
- شدوذ في الدم (كثرة الحمضات).

**أمراض نفسية**

- صعوبات في النوم أو تغييرات في نمط الأحلام.
- اكتئاب.
- ارتباك أو هذيان (رؤية، وهمية) ويمكن أيضًا سماع أمور غير موجودة).

**الجهاز العصبي**

- صداع.
- تشنجات أو اختلاجات، إحساس بالدوار أو النعاس.
- إحساس بالوخز أو انعدام الإحساس (خدر) في اليدين وفي القدمين.
- صعوبات في الذاكرة أو في التركيز.

**العيون والأنف**

- تغييرات في الرؤية، ألم في العينين.

- تغييرات في السمع، وهذا يشمل رنين في الأذنين (طنين) وققدان السمع.
- دوار الذي يؤدي إلى مشاكل في التوازن.

**القلب والدورة الدموية**

- انتفاخ اليدين، القدمين أو الساقين (وذمة)، الذي قد يكون مصحوبًا بالآلام في الصدر، تعب وضيق تنفس (قصور في القلب).
- إحساس بنبض القلب (خفقان). نبض بطيء أو ضغط دم مرتفع.
- مشاكل في تدفق الدم في الجسم أو ضرر للأوعية الدموية. وقد تشمل هذه العلامات تعب، ضيق تنفس، إحساس بالإغماء وألم عام.

**الصدر**

- صعوبات تنفس، وهذا يشمل ضيق تنفس، صفير في التنفس أو سعال.
- التهاب الرئتين أو انتفاخ الرئتين.

**الجلد والشعر**

- حالات طفح جلدي التي تشمل احمرار، شرى، حب الشباب (العُد) وحويصلات على الجسم والوجه.
- كدمات، حكة، تعرق، ويصبح الجلد أكثر حساسية للشمس أو لتساقط الشعر.

**جهاز البول**

- دم في البول أو مشاكل في الكلى.

**أعراض جانبية مختلفة**

- عطش، سخونة، إحساس بالتهعب أو إحساس عام غير جيد.
- ألم في الفم أو تقرحات في الفم.
- ألم أو ضعف في العضلات.
- لدى النساء – صعوبة في حدوث حمل.
- ذئبة حمامية جهازية. وتشمل الأعراض سخونة، طفح جلدي، مشاكل في الكلى والآلام مفاصل.
- تضخم الغدة اليغلافية ومشاركة أعضاء إضافية (متلازمة تفاعل فرط الحساسية للأدوية بما في ذلك كثرة الحمضات والأعراض الجهازية، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة DRESS).

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوناتي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>.

## 5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- **يجب التخزين في مكان جاف، في درجة حرارة تحت 25°C.**
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إنّ هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء، أيضًا:

Lactose monohydrate, starch, povidone, magnesium stearate, hypromellose, polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 6000, D&C yellow No. 10, FD&C yellow No. 6 (Sunset yellow FCF (E 110)).

**كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:**

أقراص مغلفة ومستديرة ذات لون أصفر.  
تحتوي كل عبوة على 30 قرصًا في عبوة بلبستور.

**اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:**

تتبع إسرائيل م.ص.، شارع دفوراً هنتينا 124، تل أبيب 6944020.

**تم تحرير النشرة في أيار 2025.**

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**

055.98.20619

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

teva