

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

أوكسيكود فورته 10 ملغ/ملع شراب

المادة الفعالة:

يحتوي كل 1 مليلتر (مائل) على: أوكسيكودون هيدروكلوريد 10 ملغ (mg/ml) Oxycodone hydrochloride).

للإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6.

انظر أيضاً "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في البند 2.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهائنها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات مُلصَّعة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء لعلاج حالتك، لا تمطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بد لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

هذا الدواء غير مخصص للأولاد، والمرافقين الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا.

الأدوية المنتمئة لفصيلة الأفيونيات قد تسبب الإدمان، لا سيما عند الاستعمال المطول، وتكمن فيها إمكانية لمعاقرتها (سوء استخدامها) ولقرط الجرعة الدوائية. يمكن أن يتمثل رد الفعل على فرط الجرعة الدوائية بتنفس بطيء وحتى أن يتسبب بالموت.
تأكد من أنك تعرف اسم الدواء، والجرعة الدوائية التي تستعملها، ووتيرة الإعطاء، ومدة العلاج، والأعراض الجانبية والمخاطر المحتملة. يمكن الحصول على معلومات إضافية حول خطر الاعتماد والإمان في الرابط:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MT/IL/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf

استعمال هذا الدواء مع أدوية من فصيلة البنزوديازيبينات، أو مع أدوية أخرى كابتة للجانح العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو مع الكحول قد يسبب إحساساً عميقاً بالميل إلى النوم، صعوبات في التنفس (كبثًا تنفسيًا)، غيبوبة وموتًا.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من الآلام المتوسطة إلى الشديدة.

الفصيلة العلاجية: المسكنات، الدواء الأفيونية.

لقد وُصف الدواء لك فقط ولا يجوز إعطاؤه لأي شخص آخر. قد تسبب الأفيونيات الإدمان وقد تتسبب لديك أعراض الانسحاب إذا توقفت عن استعمالها بشكل فجائي.
تأكد من أنك قد تلتفت شرخًا من الطبيب عن مدة العلاج بالدواء، وعندما يكون من المناسب التوقف عن استعماله، كيفية فصلك بشكل آمن.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).
- كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشمل الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.
- كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.
- كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).
- كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.
- كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.
- كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.

كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.

كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.

كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.

كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.

كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.

كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.

كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.

كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.

كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.

كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.

كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.

كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.

كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.

كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

كنت تعاني من مستوى مرتفع لثاني أكسيد الكربون في الدم. يمكن أن تشملّم الأعراض على دوار، غثاس، تعب، ضيق التنفس وصداخ.

كنت تعاني من مشكلة متوسطة إلى خطيرة في الكبد. إذا كنت تعاني من مشاكل مطولة أخرى في الكبد، فيجب استشارة الطبيب.

كان عمرك أقل من 18 عامًا.

قد يكون لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (أوكسيكودون هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الشراب (الإطلاع على قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

كنت تعاني من مشاكل تنفسية، مثل: الداء الرئوي الانسدادي المزمن، الخضير، الربو القصبي الخضير، الكبت التنفسي الخضير. قد تشملّم الأعراض على ضيق التنفس، سعال أو تنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع.

كنت تعاني من حالة لا تعمل فيها الأمعاء الدقيقة كما ينبغي (انسداد الأمعاء)، من إفراج معدّي بطيء، من ألم شديد في البطن، من إمساك مزمن.

كنت تعاني من مشكلة قلبية بعد مرض رئوي مطول (cor pulmonale).

أثناء النوم – sleep apnea)، ونقص تأكسج الدم (مستوى منخفض للأكسجين في الدم) المرتبط بالنوم. يجب إخبار الطبيب إذا لاحظت أو لاحظ أحد المحيطين بك الأعراض التالية: حالات من توقف التنفس أثناء النوم، الاستيقاظ بسبب ضيق التنفس، صعوبة في أن تبقى نائمًا، ميلًا متزايدًا للنوم خلال النهار. في هذه الحالة يُحتمَل أن يوصي الطبيب بخفض الجرعة الدوائية.

لا يجوز حقن المحلول. قد يسبب حقن المحلول أعراضًا جانبية خطيرة تشتمل على موت النسيج في موضع الحقن، تلوّث، التهاب الرئتين وتضرس القلب الذي قد يسبب الموت.

إذا خضعت مؤخرًا أو كنت على وشك الخضوع لجراحة (تشمل ما يتعلق طب الأسنان) أو لأي عملية منوطة بالتخدير، فيجب أن تخبر الطبيب أنك تستعمل هذا الدواء، لأنه قد تتغيّر ملامحة الجرعة. يجب الاستمرار بحذر زائد لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد الجراحة وبحسب تعليمات الطبيب.

قد تحدث لتغيرات هرمونية في فترة العلاج بالدواء. يجب الامتناع عن الانتقال الفجائي من وضعية الاستلقاء/الجلوس إلى الوقوف، من أجل منع الدوار وفي الحالات المتطرفة منع الإغماء.

يجب مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من ألم إضافية في الجزء العلوي من البطن قد تشع أيضًا إلى الظهر، أو من غثيان وتقيؤات وحجم، لأن هذه الأعراض يمكن أن تدل على التهاب في البنكرياس أو في القنوات الصفراوية.

الأولاد والمرافقون:

هذا الدواء غير مخصص للأولاد، والمرافقين الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا.

عند الحاجة ووفقًا لتعليمات الطبيب، يمكن استعمال مستحضر أوكسيكود شراب الأفل تركيزًا (تركيز أوكسيكود شراب هو 2 ملغ في كل 1 مل) والمخصص للأولاد بدءًا من سن 6 أعوام.

الفحوص والمناهضة:

يجب عليك الخضوع لتقييمات دورية خلال فترة العلاج الطويل الأمد، من أجل تقييم الحاجة المتواصلة إلى الدواء.

قد يقوم الطبيب بمراقبة التغيرات الهرمونية المحتملة.

التفاعلات بين الأدوية:

استعمال أوكسيكود فورته شراب سويًا مع أدوية أخرى كابتة للجهاز العصبي المركزي قد يؤدي إلى نقص بطيء أو صعوبات في التنفس (كبت تنفسي)، ميل شديد إلى النوم، فقدان الوعي، غيبوبة والموت. لهذا السبب، سينظر الطبيب في استعمال أوكسيكود فورته شراب سويًا مع هذه الأدوية، فقط إذا لم تكن هناك خيارات علاجية أخرى، وسيكون ذلك فقط بجرعة دوائية منخفضة ولفترة قصيرة. تشملّم هذه الأدوية على: أدوية أفيونية أخرى لتسكين الألم (مثل مورفين أو كودئين)؛ أدوية جابايبنتيويدية (لعلاج الصرع) مثل بريجابالين؛ أدوية مضادة للقلق؛ أدوية للتهدئة، أدوية للتبويم (مثل بينزوديازيبينات)؛ أدوية لعلاج المشاكل النفسية/المتعلقة بالباطب النفسي (مثل فينوتازينات)؛ أدوية مضادة للاكتئاب، أدوية للتخدير؛ أدوية لإرخاء العضلات؛ مواد أمين أوكسيداز (MAOIs) المستعملة مثلا لعلاج الاكتئاب، مثل ترانيلسيبرومين، فينيلزين، إيزوكاربوكسيد. لا يجوز استعمال أوكسيكود فورته شراب إذا كنت تستعمل الأن أدوية من فصيلة MAOIs أو قد استعمالتها في الأسبوعين الأخرين.

إذا لاحظت أو لاحظ المحيطون بك (الأصدقاء، العائلة، مقدمو الرعاية) أنك تستصعب التنفس أو أنك أصبحت تميل جدًا إلى النوم أو تقفد الوعي، فيجب مراجعة الطبيب فورًا.

استعمال أوكسيكود فورته شراب مع الأدوية المستعملة لعلاج الاكتئاب
من فصيلة SSRIs أو SNRIs (مضطبات استرداد السيروتونين/التوريبينفينة المتأينة)؛ مع أدوية أخرى سيروتونينية (أدوية قد يسبب تسبمًا بالسيروتونين. تشملّم الأعراض على: تغيرات في الحالة النفسية مثل هياج (عدم الهدوء)، روية أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع (هلوسات)، فقدان الوعي/غيبوبة؛ دقات قلب سريعة، تغيرات في ضغط الدم، ارتفاع حرارة الجسم، تشنجات عضلية، انعدام التنسيق الحركي، تزايد المتعسكات، تصلب؛ أعراض في الجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤات، إسهال.
إذا كنت تستعمل أدوية من فصيلة SSRIs أو SNRIs مثل سيالوبرام، دولوكسيتين، إيسيتلوبرام، فلوكسيتين، فلوفاكسامين، باروكسيتين، سيرترالين أو فينلافاكسين، فقد يقلل الطبيب الجرعة الدوائية.

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعمالت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فإخبار الطبيب أو الصيدلي بذلك يُحتمَل أن يلائم الطبيب جرعة الأدوية، خاصةً، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

أدوية معينة مضادة للاكتئاب من فصيلة مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات، مثل: إميترپيتيلين، كلوميبرامين، إيميبرامين، لوفيرامين، نورترپيتيلين.

أدوية تستعمل لعلاج الارجيات (مضادات الهيستامين)، مثل: سيتريزين، فيكسوفينادين، كلوريفينامين.

أدوية لعلاج مرض الأيركيسون.

مضاد حيوي من فصيلة المكاروليدات، مثل: كلاريثروميسين، إريثروميسين، تيليثروميسين.

أدوية مضادة للفطريات، مثل: كيتوكونازول، فلوريكونازول، إيتراكونازول، بوساكونازول.

أدوية مضادة لفيروس HIV من فصيلة مثبطات الفيروساز، مثل: بوسيفيرفير، ريتونافير، إيندينافير، نيفينافير، ساكينافيير.

سيفميدئين (علاج قرح المعدة).

ريفايميسين (لعلاج السل).

أدوية لعلاج التشنجات/الاختلاجات، مثل: كارامازيبين وفيثيتوين.

نبتة العرن (تسمى أيضًا St. John's wort)، المستعملة لعلاج الاكتئاب.

كينيديين (لعلاج عدم انتظام نظم القلب).

أدوية ذات فعالية مضادة للكولين.

استعمال الدواء والطعام:

يمكن تناول الدواء دون ارتباط بأوقات وجبة الطعام. يجب الامتناع عن استهلاك الكافيين/كافيزوفوت خلال فترة العلاج بالدواء.

استعمال الدواء وإسهالته الكحول:

لا يجوز شرب الكحول في فترة العلاج بهذا الدواء.

شرب الكحول في فترة العلاج بالدواء قد يجعلك تشعر بالميل إلى النوم أو يزيد من خطر نشوء أعراض جانبية خطيرة، مثل تنفس سطحي مع خطر توقّف التنفس وفقدان الوعي.

الحمل والإرضاع:

الحمل: لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو إذا كنت تظنين أنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، إلا إذا قرر الطبيب أن الفائدة من استعمال الدواء تطغى على الخطر المحتمل. إذا استعمالت الدواء أثناء الحمل فقد يمثأ لدى الطفل اعتماد على الدواء وقد يعاني من أعراض الانسحاب بعد الولادة، وقد تكون هناك حاجة إلى علاجها. يمكن أن تشملّم الأعراض على: عصبية، فرط النشاط (فرط الحركة)، أمشاط نوم غير عادية، بكاء عالي النبرة، ارتجاع، تقيؤات، إسهال، عدم الارتفاع في الوزن.

الولادة: لا يوصى بالاستعمال أثناء الولادة. قد يسبب الاستعمال أثناء الولادة تنطيط تنفسيًا لدى المولود.

الإرضاع: لا يجوز استعمال الدواء في فترة الإرضاع، لأن المادة الفعالة (أوكسيكودون) تنتقل إلى حليب الأم وقد تؤثر على الرضيع (قد تسبب تنطيط تنفسيًا لدى الرضيع).

السياقة واستعمال الماكنت:

استعمال هذا الدواء قد يسبب عد أعراض جانبية من شأنها أن تؤثر سلبيًا على قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكنت (على سبيل المثال الغثاس، الدوار). انظر البند 4 للإطلاع على قائمة الأعراض الجانبية الكاملة. عادةً يتم الشعور بهذه الأعراض الجانبية بشكل أكبر في بداية العلاج، وأو عند رفع الجرعة الدوائية. إذا شعرت بهذه الأعراض، وأو بأي عرض آخر قد يؤثر على السياقة، فلا تجوز السياقة أو تشغيل الماكنت. لا تجوز السياقة إلى أن تعلم كيف يؤثر الدواء عليك.

إذا كانت لديك شكوك عما إذا كانت السياقة آمنة لك في فترة العلاج، فاستشر الطبيب.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي كل 1 ملل من الشراب على 2.5 ملغ من سكارين الصوديوم.

يحتوي كل 1 ملل من الشراب على 1 ملغ من بينزوات الصوديوم.

قد يزيد بينزوات الصوديوم من خطر نشوء العرق (اصفرار الجلد والعينين) لدى الأطفال الذين لُودوا للتو (حتى عمر 4 أسابيع).

يحتوي الشراب على المادة الملونة **sunset yellow** التي قد تسبب رد فعل تحسسيًا مثلًا الربو. هذه الظاهرة أكثر شيوعًا لدى المتعالمين ذوي الحساسية للأسبيرين.

يحتوي كل 1 ملل على أقل من 5.5 ملغ من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيجدهما الطبيب فقط.

قبل البدء بالعلاج وخلال سبُوعك عليك بما يُتوقَّع من العلاج، وبمدة العلاج بالدواء، وبأي حالات يجب مراجعة الطبيب ومتى، يجب عليك إيقاف العلاج وفقًا لخطة توقّف تدريجي عن الاستعمال (المزيد من المعلومات في البند الفرعي "إذا توقفت عن تناول الدواء").

سيلائم الطبيب الجرعة لك وفقًا لحالتك وشدة ألمك. يجب استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة كما حدد من قبل الطبيب المعالج.

لا يجوز تغيير الجرعة الدوائية دون استشارة الطبيب المعالج. إذا كنت لا تزال تشعر بالألم خلال فترة العلاج بالدواء – فراجع الطبيب.

متلقو العلاج المصابون بمشاكل في الكليتين أو في الكبد: يجب إخبار الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين أو في الكبد. يُحتمَل أن يصف الطبيب جرعة أقل استنادًا إلى وضعك.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستمعال:

الشراب مخصص للإعطاء عن طريق الفم فقط. انظر أيضًا "تحذيرات إضافية" في البند 2.

يجب الحرص على قياس الجرعة بدقة بواسطة المحقة المرفقة.

يمكن خلط الجرعة مع الفليل من الشراب الخفيف لتسهيل الطعم.

لا يجوز شرب المحلول مباشرةً من القنينة، لأن خطر فرط الجرعة سيزداد عندها.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أعلى أو إذا قام ولد أو شخص آخر ببلع الدواء خطأ، فيجب التوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك. قد يجعلك فرط الجرعة شديد

الميل إلى النوم ويسبب أيضًا أعراضًا مثل: الغثيان/التقيؤات، الدوار، الهلوسات، انخفاض ضغط الدم، تضيقُ الحقدقين، انخفاض التوتر العضلي (نقص التوتر العضلي)، بطء القلب (وتيرة قلب بطيئة). كذلك قد تظهر ودمة رئوية، صعوبة في التنفس (تصلب إلى كبت تنفسي) أو انهيار قلبي وعائي مما قد يسبب فقدان الوعي، الغيبوبة وحتى الموت. فرط الجرعة الدوائية قد يؤدي حتى إلى اضطراب دماغي (Toxic leukoencephalopathy). هذه الأعراض ستوجب المساعدة الطبية المستعجلة في المستشفى. يُستحسن أن تطلب من المحيطين بك أن يتعرفوا هم أيضًا على هذه الأعراض وينبئوها إليها إذا ظهرت لديهم.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المنتظم فيجب تناول جرعة فور تتذكرك، لكن يجب الحرص على فارق زمني لا يقل عن أربع ساعات بين الجرعة والأخرى. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة تعويضًا عن الجرعة الممنية.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب، وحتى عندها سيتم عادةً بشكل تدريجي فقط.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

لا يجوز التوقف عن استعمال الدواء بشكل فجائي. إذا رغبت بالتوقف عن استعمال الدواء، فيجب استشارة الطبيب أو لا ليرشدك إلى كيفية فعل ذلك. سيوصيك الطبيب على أخذ بقليل الجرعة تدريجيًا لتقليل خطر ظهور أعراض الانسحاب، مثل: هياج/تعلّم، صعوبات في النوم، عصبية، قلق، شعور بالدقات القلبية (خفقان القلب)، ارتفاع ضغط الدم، غثيان، تقيؤات، إسهال، ارتجاع، تشنّج، شعور بحرق، تنميع، سيلان الأنف، تئؤبات، ألم العضلات، توتّع الغثانة، فرط الحركة، ضعف، تقصّصات في البطن، فقدان الشهية، تزايد في وتيرة القلب و/أو التنفس.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة **في كل مرة تناول فيها دواء.** ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال أوكسيكود فورته شراب إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلتاق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية.

قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

رد فعل تحسسي أو تأقني: كل دواء قد يسبب رد فعل تحسسيًا، على الرغم من أن رد الفعل التحسسي الخطير نادر. يمكن أن تشملّم أعراض رد الفعل التحسسي الخطير على: أزيز تنفسي مفاجئ، صعوبات في التنفس، انتفاخ الوجه، الأوجاع، الحكة، تورم الشفتين؛ طفح جلدي و/أو حكة (خاصةً في مناطق موعسة من الجسم).

كبت تنفسي: العرض الجانبي الأكثر خطورةً هو حالة تننفس فيها بشكل أبطأ أو أضعف من المعتاد، مما قد يؤدي إلى ميل شديد إلى النوم وفقدان الوعي. قد يؤثر هذا العرض الجانبي على ما لا يزيد عن 1 شخص من بين 100 شخص ويرجع أن يحدث مع الدمج مع أدوية معينة أخرى (انظر أيضًا "التفاعلات بين الأدوية" في البند 2). يوصى بأن تطلب من المحيطين بك (الأصدقاء، العائلة، مقدمي الرعاية) أن ينبئوها إلى نشوء هذه العلامات والأعراض لديك.

أعراض الانسحاب: عندما توقفت عن استعمال الدواء، يُحتمَل أن تصاب بأعراض الانسحاب. انظر "إذا توقفت عن تناول الدواء" في البند 3.