

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **סקייריזי® 150 מ"ג תמיסה להזרקה במזרק מוכן להזרקה**

**החומר הפעיל וריכוזו:**

כל מזרק מוכן להזרקה מכיל ריזאנקיזומאב 150 מ"ג ב-1 מ"ל,  
Risankizumab 150 mg/1 ml

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים - אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" בעלון זה.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

##### ספחת רובדית

סקייריזי מיועדת לטיפול בספחת (פסוריאזיס) רובדית בינונית עד חמורה, במבוגרים שמועמדים לטיפול סיסטמי.

##### דלקת מפרקים ספחתית

סקייריזי, לבד או בשילוב עם מתוטרקסאט (MTX), מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית פעילה במבוגרים אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטי ראומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם.

##### **קבוצה תרפויטית:**

מדכאי מערכת החיסון, מעכבי אינטרלוקין. סקייריזי פועלת על ידי חסימת חלבון בגוף המכונה 'IL-23', אשר גורם לדלקת.

##### ספחת רובדית

סקייריזי מיועדת לטיפול במבוגרים עם ספחת (פסוריאזיס) רובדית בינונית עד חמורה. סקייריזי מפחיתה דלקת ובכך יכולה לסייע בהפחתת תסמינים של ספחת (פסוריאזיס) רובדית כגון צריבה, גרד, כאב, אדמומיות והיווצרות קשקשים.

##### דלקת מפרקים ספחתית

סקייריזי מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית במבוגרים. דלקת מפרקים ספחתית הינה מחלה הגורמת למפרקים מודלקים ופסוריאזיס. אם אתה סובל מדלקת מפרקים ספחתית פעילה, ייתכן ותחילה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו אינן משפיעות באופן מספק, תקבל סקייריזי עם או ללא תרופות אחרות לטיפול בדלקת המפרקים הספחתית שלך.

סקייריזי מפחיתה דלקת ובכך יכולה לעזור בהפחתת כאב, נוקשות ונפיחות במפרקים שלך

ומסביבם, כאב ונוקשות בעמוד השדרה, נגעים ספחתיים בעור, נזק ספחתי לציפורניים ועלולה להאט את הנזק לעצם ולסחוס במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היום-יומית הרגילה שלך, להפחית עייפות ולשפר את איכות חייך.

## 2. לפני השימוש בתרופה

### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לריזאנאקוזומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה תרופה זו (מפורטים בסעיף 6).
- יש לך זיהום, כולל שחפת פעילה, שלדעת הרופא שלך הינו משמעותי.

### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

#### **לפני הטיפול ובמהלך השימוש בסקייריזי ספר לרופא אם:**

- יש לך זיהום כעת או אם אתה סובל מזיהומים חוזרים.
- יש לך שחפת.
- קיבלת לאחרונה או שאתה מתכנן לקבל חיסון. עליך להימנע מקבלת חיסונים מסוגים מסוימים במהלך השימוש בסקייריזי.

### תגובות אלרגיות חמורות

סקייריזי יכולה לגרום לתופעות לוואי חמורות כולל תגובות אלרגיות חמורות ('אנפילקסיס'). ספר לרופא או פנה מיד לעזרה רפואית אם אתה מבחין באחד מהסימנים של תגובה אלרגית במהלך השימוש בסקייריזי, כגון:

- קושי בנשימה או בבליעה
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון
- לחץ דם נמוך, שיכול לגרום לסחרחורת או לתחושת סחרור
- גרד חמור של העור, המלווה בפריחה אדומה או בנגעי עור מורמים

### **ילדים ומתבגרים**

סקייריזי אינה מיועדת עבור ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים, זאת מאחר שסקייריזי לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

### **אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם קיבלת לאחרונה או אתה מתכנן לקבל חיסון. עליך להימנע מקבלת חיסונים מסוגים מסוימים במהלך השימוש בסקייריזי. אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות שלך לפני ובמהלך השימוש בסקייריזי.

### **היריון, הנקה ופוריות**

אם הינך אישה בגיל הפוריות, עליך להשתמש באמצעי מניעה במהלך השימוש בתרופה זו, ובמשך 21 שבועות לפחות לאחר המנה האחרונה של סקייריזי. לא קיים מידע מספק בנוגע לשימוש בסקייריזי בהיריון, ועל כן, כאמצעי זהירות, מומלץ להימנע משימוש בתרופה במהלך ההיריון. לא ידוע אם סקייריזי מופרשת לחלב אם. ספרי לרופא שלך אם הינך מניקה או מתכננת להניק לפני השימוש בתרופה זו.

### **נהיגה ושימוש במכונות**

סקייריזי לא צפויה להשפיע על שימוש במכונות ועל הנהיגה שלך.

### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

תרופה זו מכילה 0.2 מ"ג של פוליסורבט 20 בכל מנה של 150 מ"ג. פוליסורבטים עלולים לגרום

לתגובות אלרגיות. ספר לרופא שלך אם יש לך אלרגיות ידועות כלשהן.  
תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל עט מוכן להזרקה, כלומר למעשה היא 'נטולת נתרן'.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.  
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח שלך אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.  
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

תרופה זו ניתנת בזריקה מתחת לעור שלך ( נקראת 'הזרקה תת-עורית').

כל מנה מכילה 150 מ"ג הניתנת בזריקה אחת. לאחר המנה הראשונה, תקבל את המנה הבאה כעבור 4 שבועות, ולאחר מכן כל 12 שבועות.

אתה והרופא, הרוקח או האחיות שלך צריכים להחליט האם אתה אמור להזריק תרופה זו בעצמך. אל תזריק לעצמך את התרופה עד שתקבל הדרכה על ידי הרופא, הרוקח או האחיות שלך. גם מטפל יכול להזריק לך אחרי הדרכה מתאימה.

### **אין לעבור על המנה המומלצת.**

**עייני בסעיף 7 'הוראות שימוש' בסוף עלון זה לפני שתזריק לעצמך סקיייריזי.**

### **אם הזרקת בטעות מינון גבוה יותר**

אם בטעות הזרקת מנת יתר של סקיייריזי או שהמנה ניתנה במועד מוקדם יותר מזה אשר נקבע על פי מרשם רופא או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

### **אם שכחת להזריק סקיייריזי**

אם שכחת להזריק סקיייריזי, עליך להזריק מנה מיד כשתיזכר בכך. שוחח עם הרופא שלך אם אינך בטוח בנוגע למה עליך לעשות.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

### **אם אתה מפסיק להשתמש בסקיייריזי**

אין להפסיק להשתמש בסקיייריזי ללא התייעצות תחילה עם הרופא. אם תפסיק את הטיפול התסמינים שלך יכולים לחזור.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בסקיייריזי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

### **תופעות לוואי חמורות**

תגובות אלרגיות - אלה עשויות להצריך טיפול דחוף. פנה לרופא שלך או לקבלת עזרה רפואית דחופה באופן מיידי אם אתה מבחין באחד מהסימנים הבאים:

תגובות אלרגיות חמורות ('אנפילקסיס') נדירות בקרב אנשים הנוטלים סקיייריזי (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 1000 אנשים). הסימנים כוללים:

- קשיי נשימה או בליעה
- נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון

- לחץ דם נמוך, שעלול לגרום לסחרחורת או לתחושת סחרור

**עליך לשוחח עם הרופא או לפנות לעזרה רפואית באופן מיידי אם יש לך את התסמינים הבאים.**

**תסמינים של זיהום חמור, כגון:**

- חום, תסמינים דמויי שפעת, הזעות לילה
- תחושת עייפות או קוצר נשימה, שיעול שאינו חולף
- עור חם, אדום וכואב, או פריחה כואבת בעור עם שלפוחיות הרופא שלך יחליט אם תוכל להמשיך להשתמש בסקייריזי.

**תופעות לוואי אחרות**

ספר לרופא שלך אם מופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):**

- זיהומים בדרכי הנשימה העליונות המלווים בתסמינים כגון כאב גרון וגודש באף
- תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100):**

- תחושת עייפות
- זיהום פטרייתי בעור
- תגובות במקום ההזרקה (כגון אדמומיות או כאב)
- גרד
- כאב ראש
- פריחה
- אקזמה

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000):**

- בליטות קטנות ואדומות על העור
- סרפדת

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דיווח תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי תווית המזרק ואריזת הקרטון החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן במקרר (2°C - 8°C). אין להקפיא.
- יש לשמור את המזרק באריזת הקרטון המקורית על מנת להגן מאור.
- במידת הצורך, ניתן לאחסן את המזרק מוכן להזרקה גם מחוץ למקרר (עד מקסימום 25 °C) עד 24 שעות באריזת הקרטון המקורית על מנת להגן מאור.
- אין להשתמש בתרופה זו אם הנוזל נראה עכור או מכיל פתיתים או חלקיקים גדולים.
- אין להשליך תרופות לבויב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח שלך כיצד יש להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

## **6. מידע נוסף**

### **● מה סקייריזי מכילה**

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם :

Trehalose dihydrate, sodium acetate trihydrate, polysorbate 20, acetic acid glacial and water for injection

אנא ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה".

### **● כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?**

סקייריזי היא נוזל צלול וחסר צבע עד צהוב הנמצא בתוך מזרק מוכן להזרקה עם מגן מחט. הנוזל עלול להכיל חלקיקים זעירים בצבע לבן או שקוף.

כל אריזה מכילה 1 מזרק מוכן להזרקה.

● **בעל הרישום וכתובתו:** אבווי ביופארמה בע"מ, החרש 4, הוד השרון, ישראל.

● **שם היצרן וכתובתו:** אבווי דויטשלנד ג'י.אמ.בי.אייץ' אנד קו. קיי.ג'י, קנולשטרסה, 67061, לודויגשפן, גרמניה

● נערך בספטמבר 2025.

● **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 169-73-36871

למידע נוסף ולמוקד תוכנית התמיכה


התקשרו \*6718

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

## 7. הוראות שימוש

אנא קרא את סעיף 7 במלואו לפני השימוש בסקייריזי

### סקייריזי מזרק מוכן להזרקה






#### לפני שתזריק סקייריזי, חשוב שתדע

- עליך לקבל הדרכה כיצד להזריק סקייריזי לפני מתן הזריקה. שוחח עם הרופא, הרוקח או האחיות שלך אם אתה זקוק לעזרה
- סמן את התאריכים על לוח השנה שלך, כך שתדע מתי להזריק סקייריזי
- שמור את סקייריזי באריזת הקרטון המקורית על מנת להגן על התרופה מפני אור עד למועד השימוש בה
- אין להזריק אם הנוזל עכור או מכיל פתיתים או חלקיקים גדולים. הנוזל צריך להיראות צלול עד צהוב ועלול להכיל חלקיקים זעירים לבנים או שקופים
- אין לנער את המזרק
- המתן עם הסרת מכסה המחט עד ממש לפני ההזרקה

#### החזר תרופה זו לבית המרקחת

- אם תאריך התפוגה (EXP) חלף
  - אם הנוזל אי פעם קפא (אפילו אם הפשיר)
  - אם המזרק נפל או נפגם
  - אם אריזת הקרטון איננה שלמה
- להזרקה נוחה יותר:** הוצא את אריזת הקרטון מהמקרר והשאר אותה בטמפרטורת החדר, הרחק מאור שמש ישיר, למשך 15 עד 30 דקות לפני ההזרקה.
- אין לחמם את סקייריזי בשום דרך אחרת (לדוגמא, בתוך מיקרוגל או במים חמים)
  - שמור את המזרק בתוך אריזת הקרטון עד שתהיה מוכן להזריק


**עקוב אחר השלבים מטה בכל פעם שאתה משתמש בסקיייריזי**

<p>הוצא את המזרק מוכן להזרקה מעטיפתו בעזרת ידית האחיזה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● אין להחזיק או למשוך את הבוכנה בעת הוצאת המזרק מוכן להזרקה מעטיפתו</li> </ul> <p>הנח את הפריטים הבאים על משטח נקי ושטוח:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 מזרק מוכן להזרקה</li> <li>● 1 פד אלכוהול (אינו כלול באריזת הקרטון)</li> <li>● 1 כדור צמר גפן או פד גאזה (אינו כלול באריזת הקרטון)</li> <li>● מיכל מיוחד לפסולת (אינו כלול באריזת הקרטון)</li> </ul> <p>שטוף ויבש את ידיך.</p>	<p><b>שלב 1</b></p> 
<p>בחר מתוך 3 אזורי הזרקה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ירך שמאל קדמית</li> <li>● ירך ימין קדמית</li> <li>● בבטן במרווח של 5 ס"מ לפחות מהטבור</li> </ul> <p>לפני ההזרקה, נגב את המקום שבו אתה עומד להזריק עם פד אלכוהול בתנועה סיבובית.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● אין לגעת או לנשוף על מקום ההזרקה לאחר שהוא נוקה. אפשר לעור להתייבש לפני ההזרקה</li> <li>● אין להזריק דרך בגדים</li> <li>● אין להזריק לתוך עור כואב, חבול, אדום, קשה, מצולק, או עם סימני מתיחה</li> <li>● אין להזריק לתוך אזורים עם פסוריאזיס</li> </ul>	<p><b>שלב 2</b></p>  <p>אזורי הזרקה</p> <p>אזורי הזרקה</p>
<p>אחוז במזרק כשהמחט המכוסה פונה כלפי מטה, לפי האיור. בדוק את הנוזל במזרק.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● זה תקין לראות בועות בחלונית</li> <li>● הנוזל צריך להיראות צלול עד צהוב ועלול להכיל חלקיקים זעירים לבנים או שקופים</li> <li>● אין להשתמש אם הנוזל נראה עכור או מכיל פתיתים או חלקיקים גדולים</li> </ul>	<p><b>שלב 3</b></p>  <p>בדוק נוזל</p>


**שלב 4**

הסרת מכסה המחט:


- אחוז את המזרק ביד אחת בין ידיה האחיזה למכסה המחט
- עם היד השנייה, משוך בעדינות והסר את מכסה המחט
- **אין** להחזיק או למשוך את הבוכנה בעת הסרת מכסה המחט
- ייתכן ותראה טיפה של נוזל בקצה המחט. זה תקין
- השלך את מכסה המחט
- **אין** לגעת במחט עם האצבעות שלך ואין לאפשר מגע של המחט עם משטח כלשהו

**שלב 5**

- אחוז את גוף המזרק ביד אחת, בין האגודל לאצבע המורה, כפי שהיית מחזיק עיפרון.
- צבוט בעדינות את האזור עם העור שעבר ניקוי עם ידך השנייה ואחוז בו בחוזקה.
- החדר את המחט עד הסוף לתוך העור בזווית של כ- 45 מעלות תוך שימוש בתנועה מהירה וקצרה. שמור את המזרק יציב באותה הזווית.

**שלב 6**

- דחוף באיטיות את הבוכנה פנימה עד הסוף, עד שכל הנוזל מוזרק. משוך את המחט מתוך העור תוך שמירת המזרק באותה הזווית. הסר באיטיות את האגודל מהבוכנה. בשלב זה, המחט תכוסה על ידי מגן המחט.
- מגן המחט לא יופעל עד אשר יוזרק כל הנוזל
  - שוחח עם הרופא, הרוקח או האחיות שלך אם נדמה לך שלא ניתנה מנה מלאה
- לחץ כדור צמר גפן או פד גאזה במקום ההזרקה והחזק למשך 10 שניות.
- אין** לשפשף את העור במקום ההזרקה. ייתכן דימום קל במקום ההזרקה. זה תקין



מגן המחט

**שלב 7**

- השלך את המזרק המשומש למיכל מיוחד לפסולת מיד לאחר השימוש.
- **אין** להשליך את המזרק המשומש בפסולת הביתית
  - הרופא, הרוקח או האחיות שלך יסבירו לך כיצד יש להחזיר את המיכל המלא המיוחד לפסולת

