

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

جلوكوفاج إكس. آر 1000 ملغ
أقراص بإطلاق ممتد

جلوكوفاج إكس. آر 750 ملغ
أقراص بإطلاق ممتد

جلوكوفاج إكس. آر 500 ملغ
أقراص بإطلاق ممتد

المادة الفعّالة:

يحتوي كل قرص بإطلاق ممتد من جلوكوفاج إكس. آر 500 ملغ على:
ميتفورمين هيدروكلوريد 500 ملغ (metformin hydrochloride 500 mg) الذي يعادل ميتفورمين 390 ملغ
يحتوي كل قرص بإطلاق ممتد من جلوكوفاج إكس. آر 750 ملغ على:
ميتفورمين هيدروكلوريد 750 ملغ (metformin hydrochloride 750 mg) الذي يعادل ميتفورمين 585 ملغ
يحتوي كل قرص بإطلاق ممتد من جلوكوفاج إكس. آر 1000 ملغ على:
ميتفورمين هيدروكلوريد 1000 ملغ (metformin hydrochloride 1000 mg) الذي يعادل ميتفورمين 780 ملغ

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر البند 2 تحت "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء"
والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وصف لك. لا تعطه للآخرين. لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء

- جلوكوفاج إكس. آر معدّل لتقليل خطر أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع 2 لدى البالغين، الذين يعانون من وزن زائد ولديهم اضطراب في تحمل الجلوكوز (IGT) و/أو اضطراب في تركيز الجلوكوز أثناء الصوم (IFG) و/أو زيادة في HbA1C الذين هم:
 - معرضون لخطر كبير لتطور مرض السكري الصريح من النوع 2، وكذلك
 - يتقدمون نحو مرض السكري من النوع 2 على الرغم من التغيير الجوهري في نمط الحياة لمدة 3 إلى 6 أشهر.

يجب أن يعتمد العلاج بـ جلوكوفاج إكس. آر على مؤشرات الخطر التي تتضمن وجود قيم ملائمة للتحكم في مستوى السكر في الدم ودليل على وجود خطر مرتفع للقلب والأوعية الدموية.
يجب الاستمرار في التغيير في نمط الحياة عند بدء العلاج، إلا إذا كان المتعالج غير قادر على القيام بذلك لأسباب طبية.

- جلوكوفاج إكس. آر معدّل لعلاج مرض السكري من النوع 2 لدى البالغين، وخاصة لدى المرضى الذين يعانون من وزن زائد، عندما لا تؤدي إدارة النظام الغذائي وممارسة النشاط البدني وحدهما إلى التحكم الكافي في مستوى السكر في الدم.
يمكن استعمال جلوكوفاج إكس. آر كعلاج منفرد أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم، أو مع الإنسولين.

المجموعة العلاجيّة: أدوية لخفض مستويات الجلوكوز في الدم. تنتمي المادة الفعّالة إلى فصيلة البيجوانيدات.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجي) للمادة الفعّالة أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).
- قد يتسبب رد الفعل التحسسي في حدوث طفح، حكة أو ضيق في التنفس.
- وجدت لديك مشاكل في الكبد.
- وجد لديك انخفاض شديد في وظائف الكلى.
- وجد لديك سكري غير منضبط، مثلاً مع فرط سكر شديد في الدم (ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم)، غثيان، تقيؤات، إسهال، تناقص سريع في الوزن.
- أي نوع من الحمض الأيضي الحاد، مثل حمض لبنني (انظر "خطر الحمض اللبني" تحت "تحذيرات خاصة متعلّقة باستخدام") أو الحمض الكيتوني. الحمض الكيتوني هو حالة تتراكم فيها مواد تسمى "أجسام الكيتون"

- في الدم، وقد تؤدي إلى حالة ما قبل الغيبوبة السكرية. تشمل الأعراض على الأم في البطن، تنفس سريع وعميق، ميل إلى النوم أو رائحة فواكه شاذة تتطور في النفس.
- فقدت الكثير من السوائل من جسمك (تجفاف). يمكن أن يؤدي التجفاف إلى مشاكل في الكلى، والتي يمكن أن تسبب الحمض اللبني (انظر "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").
 - كانت لديك عدوى خطيرة، على سبيل المثال عدوى تؤثر على الرئتين أو القصبات الهوائية أو الكلى. يمكن أن تؤدي حالات العدوى الشديدة إلى مشاكل في الكلى، والتي يمكن أن تسبب الحمض اللبني (انظر "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").
 - تلقيت علاجًا لمشاكل القلب الحادة أو تعرضت مؤخرًا لنوبة قلبية أو لديك مشاكل شديدة في الدورة الدموية أو صعوبات في التنفس. قد يؤدي هذا إلى نقص في تزويد الأنسجة بالأكسجين مما قد يؤدي إلى الحمض اللبني (انظر "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").
 - كنت تشرب الكحول بكميات كبيرة.
 - كنت دون عمر 18 سنة.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بـ جلوكوفاج إكس. آر، أعلم الطبيب إذا:

خطر تطوّر الحمّاض اللبني

قد يسبب جلوكوفاج إكس. آر عرضًا جانبيًا نادرًا جدًا، لكنه خطير جدًا، يسمى الحمّاض اللبني، خاصةً إذا لم تؤدي الكلى وظيفتها كما ينبغي. يزداد خطر تطوّر الحمّاض اللبني أيضًا مع وجود سكري غير منضبط، حالات عدوى خطيرة، صوم متواصل أو استهلاك الكحول، تجفاف، مشاكل في الكبد وعند وجود أي حالة طبية ينخفض فيها تزويد جزء من الجسم بالأكسجين (مثل مرض قلبي حاد). إذا انطبق عليك أي مما ذكر أعلاه، فتحدث مع الطبيب للحصول على إرشادات إضافية.

توقف عن تناول جلوكوفاج إكس. آر لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من حالة يمكن أن تكون مرتبطة بالتجفاف (فقدان ملحوظ لسوائل الجسم) مثل تقيؤات شديدة، إسهال، سخونة، تعرّض للحرارة أو إذا كنت تشرب السوائل بشكل أقل من المعتاد. تحدث مع الطبيب للحصول على إرشادات إضافية.

توقف عن استعمال جلوكوفاج إكس. آر وتوجه إلى الطبيب أو إلى المستشفى القريب فورًا إذا شعرت ببعض أعراض الحمّاض اللبني، لأن هذه الحالة قد تسبب الغيبوبة.

تشمل أعراض الحمّاض اللبني:

- تقيؤات
- ألم في البطن
- تقلصات في العضلات
- شعور عام غير جيد مصحوب بإرهاق شديد
- صعوبات في التنفس
- انخفاض في درجة حرارة الجسم والنبض

الحمّاض اللبني هو عبارة عن حالة طوارئ طبية ويتوجب علاجها في المستشفى.

تحدث مع الطبيب في أقرب وقت ممكن للحصول على إرشادات بشأن الاستمرار إذا:

- كان من المعروف لديك أنك تعاني من مرض جيني وراثي يؤثر على الميتوكوندريا (أجزاء في الخلية تنتج الطاقة) مثل متلازمة MELAS (اعتلال الدماغ ميتوكوندري، اعتلال عضلي، حمض لبني، وحوادث تشبه السكتة الدماغية) أو داء السكري والصمم الوراثيين المنقولين عن طريق الأم (MIDD).
- يوجد لديك أيّ من الأعراض التالية بعد البدء بـ ميتفورمين: اختلاجات، تدني في القدرة الإدراكية، صعوبة في حركات الجسم، أعراض تُشير إلى تضرر في الأعصاب (مثل ألم أو خدر)، شقيقة وصمم.

إذا كان عليك الخضوع لعملية جراحية كبيرة أو تصوير بالأشعة السينية التي تشمل حقن مادة صبغية للتصوير، عليك إخبار الطبيب أنك تتناول جلوكوفاج إكس. آر وأن تتوقف عن تناول جلوكوفاج إكس. آر أثناء الإجراء ولفترة ما بعده. سيقرر الطبيب متى عليك التوقف ومتى عليك بدء العلاج بـ جلوكوفاج إكس. آر مجددًا.

إذا كان عمرك يزيد عن 75 سنة، يُمنع بدء العلاج بـ جلوكوفاج إكس. آر لتقليل خطر تطوير السكري من النوع 2.

قد ترى بقايا الأقراص في البراز. لا تقلق - هذا أمر سليم بالنسبة لهذا النوع من الأقراص. يجب عليك الاستمرار في اتباع أي نصيحة غذائية من الطبيب والحرص على تناول الكربوهيدرات بانتظام طوال اليوم.

لا تتوقف عن تناول الدواء دون التحدث مع الطبيب.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير معدّ للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة. لا توجد معلومات بخصوص سلامة ونجاعة استعمال الدواء لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

فحوصات ومتابعة

قبل البدء في استعمال الدواء وخلال فترة العلاج، قد يقوم الطبيب بتوجيهك لفحص مستوى السكر في الدم. أثناء العلاج بالدواء، سيقوم الطبيب بفحص وظيفة الكلى على الأقل مرة واحدة في السنة أو بوتيرة أكبر إذا كنت مسنًا و/أو لديك تفاقم في وظيفة الكلى. إذا كانت لديك مشاكل في القلب، فسيقوم طبيبك بمراقبة وظائف قلبك بانتظام. إذا كنت معرضًا لخطر نقص فيتامين B12، فسيقوم طبيبك بمراقبة مستويات فيتامين في الدم بانتظام.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذا كان عليك أن تتلقى حقنة لمادة تباين تحتوي على اليود، خلال إجراء تصوير بالأشعة السينية أو المسح، يجب عليك التوقف عن تناول جلوكوفاج إكس. آر قبل أو أثناء عملية الحقن. سيقوم الطبيب متى يجب عليك التوقف ومتى يجب أن تبدأ العلاج بـ جلوكوفاج إكس. آر مجددًا.

أخبر الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى. قد تحتاج إلى فحوصات الجلوكوز في الدم ووظائف الكلى بشكل متكرر أكثر، أو قد يحتاج الطبيب إلى ملاءمة جرعة جلوكوفاج إكس. آر. من المهم بشكل خاص الإعلام بشأن المستحضرات أدناه:

- أدوية تزيد من إنتاج البول (مدرات البول مثل فوروساميد).
- أدوية تُستعمل لعلاج الألم والالتهاب (مضادات الالتهاب لا ستيروئيدية ومثبطات COX-2 مثل: إيبوبروفين، سيليكوكسيب).
- أدوية معينة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ACE ومضادات مستقبل الأنجيوتنسين 2).
- ستيروئيدات (مثل بريدنيزولون، موميتازون، بيكلوميثازون).
- الأدوية المحاكية للودي بما في ذلك إينفيرين دوپامين المستعملة لعلاج النوبات القلبية وانخفاض ضغط الدم. الإينفيرين يتضمّن في بعض مواد التخدير لعلاج الأسنان.
- أدوية التي قد تغير كمية جلوكوفاج إكس. آر في الدم، خاصة إذا كان لديك انخفاض في وظيفة الكلى:
 - أدوية مثل فير إياميل قد تخفض مستويات الدواء في الدم.
 - أدوية مثل ريفامبيسين، سيميديين، دولوتيجرافير، رانولازين، تريميثوبريم، فانديتانيب، إيساڤوكونازول، كريزوتينيب، أو لاياريب قد ترفع مستويات الدواء في الدم.

استعمال الدواء والغذاء

يجب بلع الأقراص مع الطعام أو بعد الطعام مباشرة.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

امتنع عن الاستهلاك المفرط للكحول خلال فترة تناول جلوكوفاج إكس. آر، لأنه قد يزيد الخطر لحدوث حمّاض لبني (انظر البند "تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء").

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل، تحدثي مع الطبيب في حالة هنالك حاجة إلى إجراء أي تغييرات في العلاج أو متابعة مستويات الجلوكوز في الدم. من المهم الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم قريبة من المستوى الطبيعي قدر الإمكان أثناء الحمل. سيقوم الطبيب ما إذا يتطلب العلاج بميتفورمين وحده أو بالاشتراك مع إنسولين. الإرضاع:

يفرز الميتفورمين في حليب الأم، لكن المعلومات المتوفرة حول تأثيره على المولود محدودة. لذلك، لا يوصى بالإرضاع أثناء العلاج بميتفورمين. سيقوم الطبيب ما إذا كان يجب إيقاف علاج ميتفورمين أثناء الإرضاع.

نساء في سن الخصوبة

قد يُسبب جلوكوفاج إكس. آر الإباضة (إطلاق البويضة من المبايض)، لدى النساء اللواتي لا يحدث لديهن إباضة بشكل سليم. يرجى الانتباه أن هناك زيادة في خطر حدوث حمل عند استعمال جلوكوفاج إكس. آر.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يسبب جلوكوفاج إكس. آر وحده "هيبو" (أعراض انخفاض مستوى السكر في الدم أو نقص السكر في الدم، مثل إغماء، ارتباك وزيادة التعرق) وبالتالي لا ينبغي أن يؤثر على قدرتك على السياقة أو استعمال الماكينات. مع ذلك، يجب أن تكون على دراية أن جلوكوفاج إكس. آر الذي يتم تناوله سوية مع أدوية أخرى لعلاج السكري يمكن أن يسبب هيبو، لذلك في هذه الحالة يجب أن تتوخى الحذر أثناء السياقة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم للجرعة - يعتبر "خاليًا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط. قد يصف لك الطبيب جلوكوفاج إكس. آر بمفرده أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

الجرعة المُنْتَجَة عادة للبالغين الذين لديهم أداء سليم بوظيفة الكلى هي:

لتقليل خطر أو تأخير ظهور السكري من النوع 2:

ستبدأ عادة العلاج بـ 500 ملغ من جلوكوفاج إكس. آر يوميًا. بعد تناول جلوكوفاج إكس. آر لمدة أسبوعين تقريبًا، قد يقيس الطبيب مستوى السكر في الدم ويقوم بملاءمة الجرعة. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 ملغ من جلوكوفاج إكس. آر. سيقوم الطبيب بفحص مستوى السكر في الدم بانتظام وعوامل الخطر لتطوير السكري وسيلانم العلاج وفقًا لذلك.

علاج السكري من النوع 2:

ستبدأ عادةً العلاج بجرعة 500 ملغ من جلوكوفاج إكس. آر يوميًا. بعد تناول جلوكوفاج إكس. آر لمدة أسبوعين تقريبًا، قد يقوم طبيبك بقياس مستوى السكر في الدم وملاءمة الجرعة. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 ملغ من جلوكوفاج إكس. آر.

إذا كان لديك انخفاض في وظيفة الكلى، قد يصف لك الطبيب جرعة أقل.

بشكل عام، يجب تناول الأقراص مرة واحدة يوميًا مع وجبة العشاء.

في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بتناول الأقراص مرتين في اليوم. تناول الأقراص دائمًا مع الطعام.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول

جلوكوفاج إكس. آر معد للتناول عن طريق الفم.

يجب ابتلاع الأقراص كاملة مع كأس من الماء، يُمنع المضغ، السحق أو الشطر.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى، فلا داعي للقلق، ولكن إذا كانت لديك أعراض شاذة، توجه الطبيب.

إذا كانت الجرعة التي تم تناولها كبيرة، فإن احتمالية تطوّر الحمض اللبني أعلى. أعراض الحمض اللبني غير محددة ويمكن أن تشمل التقيؤات، آلام البطن مع تقلصات العضلات، شعور عام غير جيد مع ارتهاق شديد وصعوبات التنفس. ومن الأعراض الإضافية هي انخفاض درجة حرارة الجسم والنبض. إذا عايشت أيًا من هذه الأعراض، فعليك التوجه لتلقي علاج طبي على الفور، حيث يمكن أن يؤدي الحمض اللبني إلى غيبوبة. توقف عن تناول جلوكوفاج إكس. آر فورًا وتوجه حالًا إلى الطبيب أو أقرب مستشفى.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء، تناوله حالما تتذكره مع القليل من الطعام. يُمنع تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال چلوکوفاج إكس.آر أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب فورًا:

قد يسبب چلوکوفاج إكس.آر عرضًا جانبيًا نادرًا جدًا (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 شخص) لكن خطير جدًا يُعرف باسم الحمض اللبني (انظر البند "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء"). إذا حدث لديك هذا العرض الجانبي، عليك التوقف عن تناول چلوکوفاج إكس.آر والتوجه فورًا إلى الطبيب أو أقرب مستشفى، حيث يمكن أن يؤدي الحمض اللبني إلى غيبوبة.

يجب التوجه إلى الطبيب على الفور:

قد يسبب چلوکوفاج إكس.آر في حدوث نتائج غير سليمة في فحوصات وظائف الكبد والتهاب الكبد (hepatitis) الذي قد يسبب اليرقان (قد يؤثر على حتى 1 من بين 10,000 شخص). إذا تطور لديك اصفرار في العينين و/أو الجلد، راجع الطبيب على الفور.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جدًا (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

- حالات إسهال، غثيان، تقيؤات، آلام البطن أو فقدان الشهية. إذا عايشت هذه الأعراض الجانبية، فلا تتوقف عن تناول الأقراص لأن هذه الأعراض ستزول عادة في غضون أسبوعين تقريبًا. يمكن أن يساعدك تناول الأقراص مع أو مباشرة بعد وجبة الطعام.

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- اضطراب التذوق.
- انخفاض أو مستويات منخفضة لفيتامين B12 في الدم [قد تشمل الأعراض ارهاقًا شديدًا، ألم واحمرار اللسان (التهاب اللسان)، الشعور بالوخز والخدر (تنمل)، أو شحوب واصفرار الجلد]. قد يطلب الطبيب عدة فحوصات للكشف عن سبب الأعراض لأن بعضها قد يكون بسبب مرض السكري أو بسبب مشاكل صحية أخرى غير ذات صلة.

أعراض جانبية نادرة جدًا (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 شخص):

- حالات الطفح الجلدي بما في ذلك احمرار، حكة وشرى.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكلّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا توجد شروط تخزين خاصة. يوصى بالحفظ في درجة حرارة الغرفة.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء أيضًا على: Hypromellose (hydroxypropyl methylcellulose), carmellose sodium (sodium carboxymethylcellulose), magnesium stearate.
- كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة: أقراص چلوکوفاج إكس.آر 500 ملغ هي بلون أبيض حتى كريمي، مستديرة، مع الكتابة '500' على جانب واحد.

تحتوي كل عبوة على 20، 28، 30، 50، 56، 60، 84، 90، 100، 112 أو 120 قرصًا بإطلاق ممتد.
أقراص **چلوکوفاج إكس.آر 750 ملغ** هي بلون أبيض حتى كريمي، على شكل كبسولة، مع الكتابة '750' على جانب واحد و 'MERCK' على الجانب الآخر.
تحتوي كل عبوة على 20، 28، 30، 50، 56، 60، 84، 90، 100، 112 أو 120 قرصًا بإطلاق ممتد.
أقراص **چلوکوفاج إكس.آر 1000 ملغ** هي بلون أبيض حتى كريمي، على شكل كبسولة، مع الكتابة '1000' على جانب واحد و 'MERCK' على الجانب الآخر.
تحتوي كل عبوة على 20، 28، 30، 50، 56، 60، 84، 90، 100، 112 أو 120 قرصًا بإطلاق ممتد.
قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

• **صاحب التسجيل وعنوانه:** ميرك سيرونو م.ب.ض.، شارع هاكيشون 18، يافنه 81220.

• **اسم المنتج وعنوانه:** ميرك سينتا s.a.s، سموي، فرنسا.

• تم تحريرها في أيار 2025.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

174-24-37479-99 چلوکوفاج إكس.آر 500 ملغ

174-25-37480-99 چلوکوفاج إكس.آر 750 ملغ

174-26-37481-99 چلوکوفاج إكس.آر 1000 ملغ

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.