

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תנשיינים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אימוראן טבליות 25 מ"ג, 50 מ"ג

כל טבליה מכילה: 25 מ"ג או 50 מ"ג אזאתיופריין (Azathioprine).

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 בעלון "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נחשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

פעילות רפואית: דיכוי מערכת החיסון.

פעולה זו חשובה לאחר השתלת איברים, על מנת שהמערכת החיסונית לא תדחה את האיבר המושלל. אימוראן משמש גם לטיפול בבלקת מפרקים שרגונית שאינה מגיבה לטיפולים אחרים - רק על ידי מומחה לראומטולוגיה בבית חולים או במרפאה.

קבוצה תרפויטית: מדכאי מערכת החיסון (אימונוסופרסיבים).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אזאתיופריין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- אתה רגיש (אלרגי) למרקפטופורין (תרופה דומה לאזאתיופריין, החומר הפעיל באימוראן).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול באימוראן, ספר לרופא אם:

- סבלת לאחרונה חיסון או שהנך עומד להתחסן. בזמן הטיפול באימוראן אין להתחסן בחיסונים חיים (כגון שפעת, חצבת, BCG וכדומה) עד שהרופא יאשר שהה טווח עבורך. מכיוון שחלק מהחיסונים עלולים לגרום לזיהומים בזמן הטיפול באימוראן.
- יש לך הפרעה גנטית בשם תסמונת לשינייהאן (Lesch-Nyhan Syndrome). זהו מצב תורשתי נדיר של מחסור בחומר שנקרא HPRT (hypoxanthine phosphoribosyltransferase). אתה סובל מבעיות בכבד או בכליה.
- אתה סובל מתסמונת תורשתית הנקראת חוסר ב-TPMT. זהו מצב שבו הגוף שלך מייצר פחות מדי אנזים הנקרא HPMT (Thiopurine methyltransferase).
- סבלת או אי פעם מאבעבועות רוח או שלבקת חוגרת.
- חלית בעבר בצהבת B (הפטטיס B - דלקת כבד הנגרמת על ידי נגיף).
- אתה עומד לעבור ניתוח, מאחר שחלק מהתרופות, כולל טיבוקוראין או סוקסינילכולין, הניתנות בנייתוחים הרפייטי שרירים, יכולות להשפיע על פעילות אימוראן. יש לעדכן את הרופא המרדים אם אתה נוטל אימוראן לפני הניתוח.

נוק לכבד

הטיפול באימוראן עלול להשפיע על הכבד והרופא שלך יינטר את תפקוד הכבד שלך באופן קבוע. ספר לרופא שלך אם אתה חווה תסמינים של נזק לכבד (ראה סעיף 4 "הנחיות אזהרה").

אם אינך בטוח אם האמור מעלה רלוונטי לגביך, התייעץ עם הרופא שלך, אחות או רוקח לפני נטילת אימוראן.

בתקופת הטיפול באימוראן, הרופא יורה לך לעבור **בדיקות דם שגרתיות** על מנת לעקוב אחרי שינויים במצבך (ראה סעיף 3 **יידיע שתשמש בתרופה?**). בדרך כלל תדירות הבדיקות תרד ככל שתקופת הטיפול תתארך.

אם הנך מקבל טיפול לדיכוי מערכת החיסון, נטילת אימוראן יכולה להגביר את הסיכון שלך ל:

- גידולים, כולל סרטן העור. לכן, במהלך הטיפול באימוראן הימנע מחשיפה ממושכת לאור השמש, לבש ביגוד מגן והשתמש בקרם הגנה עם מקדם הגנה גבוה.
- הפרעות ריבוי תאי הדם הלבנים (lymphoproliferative disorders):

הטיפול באימוראן מגביר את הסיכון לסרטן מסוג מסוים (lymphoproliferative disorder). כאשר הטיפול כולל מספר תרופות המדכאות את מערכת החיסון (כולל תיופוריינים), מצב זה עלול להוביל למוות.

- שלוב של מספר תרופות לדיכוי מערכת החיסון הניתנות יחד, מעלה את הסיכון להפרעות במערכת הלימפה עקב זיהום נגיפי (הפרעות ריבוי לימפוציטים הקשורות בנגיף אפשטיינר-בר [EBV]).

- התפתחות של מצב חמור הנקרא תסמונת שפועל מקרופאג' (Macrophage Activation Syndrome) (הפעלה יתרה של תאי דם לבנים הקשורים בתהליכי דלקת), בדרך כלל מרחשם באנשים הסובלים מסוגים מסוימים של דלקת מפרקים, זיהום חמור באבעבועות רוח או משלבקת חוגרת. במשך כך, במשך הטיפול באימוראן יש להימנע ממוגעת יש שסובל מאבעבועות רוח או שלבקת חוגרת.
- אם חלית בעבר בצהבת B, המחלה עלולה לחזור להיות פעילה.

- זיהומים אחרים כמו דלקת נגיפית של המוח (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, PML). דלקת נגיפית של המוח עלולה להופיע במקרים בהם מערכת החיסון יורדה. אם מופיע סימן לזיהום, יש לפנות לרופא (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

פלארה

שלוח מיד עם הרופא אם יש לך שלשול, פריחה מקומית עם פיגמנטציה (דרמטיטיס - דלקת העור), ירידה בייכרון, ירידה ביכולת הסקת מסקנות או במיומנויות חשיבה אחרות (דמנציה - שטייון) מאחר שתסמינים אלה יכולים לדבוע על מחסור בוויטמין B3 (מחסור בחומצה ניקוטין/פלגרה).

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. זאת מכיוון שאימוראן עלול להשפיע על פעולותיהן של תרופות מסוימות ותרופות אחרות עלולות להשפיע על דרך הפעולה של אימוראן. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח או מתכנן לקחת:

- ריבאבירין (Ribavirin) לטיפול בזיהומים נגיפיים.
- מתוטרקסאט (Methotrexate) משמש בעיקר לטיפול בסרטן.
- אלופורינול (Allopurinol), אוקסיפרינול (Oxipurinol), תיופורינול (Thiopurinol) או מעכבי קסנטין אוקסידז אחרים כמו פבוקסטאט (Febuxostat), המשמשים בעיקר לטיפול במחלת גאוט (שיגדון).
- פניצילאמין (Penicillamine) משמש בעיקר לטיפול בבלקת מפרקים שרגונית.
- מעכבי ACE משמשים בעיקר לטיפול ביתר לחץ דם.
- נוגדי קרישה, כגון ווארפרין (Warfarin) או אצנוקומרול (Acenocoumarol) למניעה של קרישה דם.
- סיטמידין (Cimetidine) לטיפול בכיבים בקיבה ובעיות עיכול.

- אינדומתאצין (Indomethacin) משמש לשיכוך כאבים ונוגד דלקת.
- תרופות ציטוסטטיות, לטיפול בסוגי סרטן שונים.
- אמינוסליצילטים, כגון אולסאלאזין (Olsalazine), מסאלאזין (Mesalazine) או סולפאסאלאזין (Sulfasalazine) המשמשים בעיקר לטיפול במחלות מעיים הנקראות קוליטיס כיבית או מחלת קרוהן.
- קו-טרימוקסאזול (Co-trimoxazole) - אנטיביוטקה לטיפול בזיהומים הנגרמים על ידי זיקיק.

- אינפליקסימאב (Infliximab) משמש בעיקר לטיפול במחלות מעיים הנקראות קוליטיס כיבית או מחלת קרוהן.
- לפני ניתוח יש לעדכן את הרופא המרדים, עם כך שהנך מטופל באזאתיופריין, מאחר ששרפי שרירים הניתנים בהרדמה עלולים להגיב עם אזאתיופריין.

אם אינך בטוח אם האמור מעלה רלוונטי לגביך, התייעץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אימוראן.

חיסון בזמן הטיפול באימוראן

היועץ ברופא או אחות טרם קבלת חיסון. בזמן הטיפול באימוראן אין להתחסן בחיסונים חיים (כגון חיסונים לשפעת, חצבת, BCG וכדומה) עד שרופא יאשר שהה טווח עבורך, מכיוון שחלק מהחיסונים עלולים לגרום לזיהומים בזמן הטיפול באימוראן.

שימוש בתרופה ומזון

אין ליטול אימוראן פחות משעה לפני או פחות משלוש שעות אחרי אוכל או שתיית חלב.

הריון, הנקה ופוריות

אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת הריון, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול באימוראן.

הריון

יש להשתמש באמצעי מניעה מהימנים כדי להימנע מהריון בזמן שאת או בן זוגך נוטלים אימוראן.

אם הינך בהריון הרופא שלך יקח בחירות אם עליך ליטול תרופה זו בהתבסס על הסיכונים והיתרונות של הטיפול.

שוחחי מיד עם הרופא אם יש לך גרד או גירוי חזקים ללא פריחה במהלך ההריון. ייתכן שתחוויו גם בחילות ואובדן תיאבון יחד עם גרד או גירוי, המעביעים על כך שאת נמצאת במצב הנקרא כולסטיים (עימדון מרה) של ההריון (מצב המשפיע על הכבד במהלך ההריון).

הנקה

כמויות קטנות של אימוראן עלולות לעבור לחלב אם. מומלץ לנשים שנטולות אימוראן להימנע מהנקה אלא אם כן הרופא מנחה עולים על הסיכונים האפשריים לילד. היועצי בתרופות הנקה.

פוריות

ההשפעה של אימוראן על הפוריות אינה ידועה.

נהיגה ושימוש במכוונת

אין השפעה ידועה של נטילת טבליות אימוראן על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונת.

אם אתה חווה כל תופעת לוואי כתוצאה מתרופה זו, עליך להיזהר ובמידת הצורך להימנע מנהיגה ומשימוש במכוונת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

הטבליות מכילות לעיתו. אם נאמר לך שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, לקחן. יש לספר על כך לפני תחילת הטיפול באימוראן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

הטיפול ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד לפי חומרת המחלתך, גילך, משקלך ותפקודי הכליה והלבב שלך. ייתכן שקששים או חולים במחלת כליה או כבד יזדקקו ליינונים נמוכים יותר.

יש לקחת את הטבליה עם מעט מים.

חשוב שמטפלים היו מודעים לשימוש בטוח בתרופה. אם אתה מטפל שלך בא במגע עם טבליה שבורה, יש לשטוף את הידיים מיד.

אין לחצות, לשבור או לכתוש את הטבליה.

התכשיר הינו ציטוטוקסי

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

הסימנים המידיים למנת יתר הם: בחילה, הקאות ושלושל, ספירה נמוכה של תאי דם לבנים, זיהום לא מוסבר, כיב בגרון, דימום וחבלה.

אם שכחתי ליטול את התרופה

אם שכחתי ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. אם נותר זמן קצר עד לנטילת המנה הבאה, יש לקחת את המנה הבאה בזמן הרגיל ולהוועץ ברופא. אם לא, קח את הטבליה ברגע שמונחת והושך את הטיפול כנדרש.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

יש להמתיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק או לשנות את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

בדיקות ומעקב

בתקופת הטיפול בתרופה זו ולאחר מכן יש להקפיד על ביצוע בדיקות דם - בשמנות ולשגעות הראשונים לנטילת התרופה יש לבצע בדיקות דם בתדירות שבועית.

אם משתמשים במינון גבוה או שקיימת אי ספיקה כבדית או כלייתית, יש לבצע בדיקות דם בתדירות גבוהה יותר. לאחר מכן, יש לבצע בדיקות דם פעם בחודש או לכל הפחות פעם בשלושה חודשים.

יש לערוך בדיקת תפקודי כבד בחולים עם ליקוי בתפקודי הכבד.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את תוויית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באימוראן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה מבחין בתופעות הלוואי החמורות הבאות, ייתכן שתצטרך טיפול רפואי דחוף:

- תגובות אלרגיות (תופעות לוואי שאינן שכוחות אשר עשויות להופיע ב-עד משתמש אחד מתוך 100), הסימנים עשויים לכלול:
 - עיפיות כללית, סחרחורת, בחילה, הקאות, שלשול או כאב בטן.
 - התנפחות העפעפיים, הפנים או השפתיים.
 - אדמומית של העור, וגעי עור או פריחה בעור (כולל שלפוחיות, גרד והתקלפות העור).
 - כאבי שרירים או מפרקים.
 - הופעה פתאומית של צפצופים בעת נשימה, שיעול או קשיי נשימה.
- במקרים קשים הגוובה יכולה להיות מסכנת חיים (נדיר, עשוי להופיע ב-עד משתמש אחד מתוך 10,000).
- אדמומיות או פריחה בעור, שעלולות להתפתח לגוובה עורית מסכנת חיים הכוללת פריחה מפשטת עם שלפוחיות וקילוף העור, במיוחד באזור הפה, האף, העיניים ואיברי המין (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון), קילוף נרחב של העור (טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס) (אלה תופעות נדירות מאוד אשר עשויות להופיע ב-עד משתמש אחד מתוך 10,000).
- דלקת ריאות הפיכה (גורמת לקוצר נשימה, שיעול (רוחם) תופעת לוואי נדירה מאוד אשר עשויה להופיע ב-עד משתמש אחד מתוך 10,000).
- הפרעות דם ומח עצם, הסימנים יכללו: חולשה, עייפות, חיוורון, הופעת חבלות בקלות, דימום בלתי רגיל או זיהומים (תופעות לוואי שכוחות מאוד - עשויות להופיע ביותר משתמש אחד מתוך 10).

- כאשר אימוראן משמש לטיפול בשילוב עם מדכאי מערכת חיסון נוספים אתה נמצא בסיכון למחלה נגיפית הפוגעת במוח. הסימנים יכולים להיות: כאבי ראש, שינויים בהתנהגות, ליקוי דיבור, ירידה ביכולות קוגניטיביות, כגון זיכרון, ריכוז, וקבלת החלטות (ירידה קוגניטיבית). מצב זה (הנקרא Multifocal Progressive Leukoencephalopathy) עשוי להוביל למוות (תופעת לוואי נדירה מאוד אשר עשויה להופיע ביותר משתמש אחד מתוך 10,000).

יש לפנות מיד לרופא המטפל או לרופא מומחה אם אתה מבחין בתופעות הלוואי החמורות הבאות, ייתכן שתצטרך טיפול רפואי דחוף:

- יש לך חום או כל סימן אחר של זיהום, כמו כאב גרון, כאב בפה, בעיות במערכת השתן, או זיהומים במערכת הנשימה שגורמים לקוצר נשימה ושיעול (תופעות לוואי שכוחות מאוד - עשויות להופיע ביותר ממשתמש אחד מתוך 10).
- בעיות בכבד שלך, הסימנים כוללים חצהבה של העור ושל החלק הלבן של העין (צהבת) (תופעת לוואי שאינה שכוחה - עשויה להופיע ב-עד משתמש אחד מתוך 100).
- סרטן מסוגים שונים, כולל דם, לימפה וסרטן העור (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה") (תופעות לוואי נדירות אשר עשויות להופיע ב-עד משתמש אחד מתוך 1,000).

- תסמונת סוויט (Sweet's syndrome), נקראת גם *Acute febrile neutrophilic dermatosis*. אתה עשוי לפתח פריחה (בולטת אדומה, עם גושים ורודים או סגולים וכואבים למגע), במיוחד באזור הזרועות, הידיים, האצבעות, הצוואר והפנים, העשויה להיות מלווה בחום (תופעת לוואי ששכיחותה אינה ידועה [טרם נקבעה]).

- לימפומה מסוג מסוים (*hepatosplenic T-cell lymphoma*). אתה עשוי לפתח דימום מהאף, עייפות, הזעת לילה ניכרת, ירידה במשקל, וחום גבוה ללא סיבה ברורה (תופעת לוואי ששכיחותה אינה ידועה [טרם נקבעה]).

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה מבחין בתופעות הלוואי שפורטו מעלה.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכוחות מאוד (very common) - מופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך 10

- רמה נמוכה של כמות תאי דם לבנים בבדיקות הדם, שעלולה לגרום לזיהום.

תופעות לוואי שכוחות (common) - מופיעות ב-עד משתמש אחד מתוך 10

- בחילה.

תופעות לוואי שאינן שכוחות (uncommon) - מופיעות ב-עד משתמש אחד מתוך 100

- אנמיה (רמה נמוכה של כדוריות דם אדומות).
- כולסטיזם (עימדון מרה) של ההריון, אשר יכול לגרום לגירוד או גירוי חזקים, במיוחד בידיים וברגליים.
- דלקת בלבב (פנקארטיטיס) עלולה לגרום לכאב חריף בבטן העליונה.

תופעות לוואי נדירות (rare) - מופיעות ב-עד משתמש אחד מתוך 1,000

- אתה עשוי להבחין בנשירת שיער בזמן נטילת אימוראן. לעיתים קרובות השיער יצמח שוב למרות המשך הטיפול בתרופה. אם הנך משיר, היוועץ ברופא.

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) - מופיעות ב-עד משתמש אחד מתוך 10,000

- נזק בבעי שעלול לגרום לשלשול, לכאבי בטן, לעצירות, לבחילות ולהקאות (יכול להעיד על נזק בבעי).

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (טרם נקבעה)

- רגישות לאור השמש וכל אור אחר.
- פלארה (מחסור בוויטמין B3 - ניאצין) הקשור לפריחה עם פיגמנטציה, שלשול או אובדן זיכרון.
- רותה עשוי לפתח פריחה (בולטת אדומה, עם גושים ורודים או סגולים וכואבים למגע), במיוחד באזור הזרועות, הידיים, האצבעות, הצוואר והפנים, העשויה להיות מלווה בחום (תסמונת סוויט [Sweet's syndrome]). נקראת גם Acute febrile neutrophilic dermatosis). השכיחות שבה מופיעות תופעות הלוואי הללו אינה ידועה (לא ניתן להעריך על סמך החומר המזינים).

- נזק תמור לבני העלול להיות מסכן חיים, במיוחד אצל מטופלים שמקבלים טיפול ארוך טווח (כגון פגיעה בכבד, יתר לחץ דם שערי שאינו נובע משתמת [non-cirrhothic non-intension]), לחלת כלי דם פורטוסינוסואידלית [portosinusoidal]). דוחו לרופא אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: חצהבה של העור ושל חלק הלבן של העין (צהבת), הופעת חבורות בקלות, חוסר נוחות בבטן, אובדן תיאבון, עייפות, בחילות או הקאות.

אם היפועיה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המנהל לטוספס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il

בנוסף, ניתן לדווח לחברה באמצעות הכתובת הבאה: <https://sideeffects.health.gov.il> Padagis.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחף להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנע הרוקחה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה והבליסטר. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- יש לאחסן מתחת ל-25°C. יש להגן מפני אור.

- אין להשליך תרופות לאשפה או לצנרת הביתית. שאל את הרוקח כיצד להפטר מהתרופה. אמצעים אלו יעזרו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, maize starch, pregelatinised starch, magnesium stearate, stearic acid.

ציפוי הטבליה של אימוראן 25 מ"ג מכיל:

Opadry Orange 06B230003 (hypromellose, titanium dioxide, macrogol 400, iron oxide yellow, iron oxide red).

ציפוי הטבליה של אימוראן 50 מ"ג מכיל:

Hypromellose, macrogol 400.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות אימוראן 25 מ"ג היא טבליה כתומה, עגולה, קמורה, ללא קו חצייה המסומנת ב-IM 2.

טבליות אימוראן 50 מ"ג היא טבליה צהובה, עגולה, קמורה, עם קו חצייה המסומנת ב-IM 5.

הטבליות מגיעות באריזות בליסטר. כל אריזה מכילה 100 טבליות.

בעל הרישום: פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ, רח"ת רקפת 1, שוהם.

שם היצרן: אספן פרמה טריידינג בע"מ, דבלין, אירלנד.

נערך במאי 2025.

מספר ירשום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אימוראן טבליות 25 מ"ג: 4279.25384

אימוראן טבליות 50 מ"ג: 225384

- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לנשי המינים.