

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אפיקסבן טבע 5 מ"ג טבליות מצופות

הרכב
כל טבליה מצופה מכילה:
אפיקסבן 5 מ"ג Apixaban 5 mg

אפיקסבן טבע 2.5 מ"ג טבליות מצופות

הרכב
כל טבליה מצופה מכילה:
אפיקסבן 2.5 מ"ג Apixaban 2.5 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר אפיקסבן טבע קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ב-**אפיקסבן טבע** ובמהלך הטיפול ב-**אפיקסבן טבע** ולפעול על פיו. הכרטיס מכיל מידע המיועד הן למטופל והן לצוות הרפואי. הוא מספק הדרכה למטופלים כיצד ניתן למזער את הסיכון לדימום, שמקורו בטיפול עם כל אחד מהתכשירים נוגדי הקרישה. כמו כן, הכרטיס מכיל פרטים אישיים של המטופל ומידע לגבי התכשיר **אפיקסבן טבע**. הצג כרטיס זה לכל איש צוות רפואי המעורב בטיפולך. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

אפיקסבן טבע 2.5 מ"ג

למניעת אירועים של פקקת ורידית בחולים מבוגרים לאחר ניתוח יזום להחלפת מפרק הברך או הירך. למניעת שבץ ותסחיפים מערכתיים בחולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים (שמקורו איננו במסתמי הלב) ולפחות גורם סיכון אחד, כמו שבץ או אירוע איסכמי חולף קודם, גיל 75 שנים ומעלה, יתר לחץ דם, סוכרת, אי ספיקת לב סימפטומטית.

לטיפול בקרישי דם בווריד הרגליים (פקקת של ורידי הדם העמוקים) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי), ולמניעת הישנות קרישי דם בכלי דם אלו.

אפיקסבן טבע 5 מ"ג

למניעת שבץ ותסחיפים מערכתיים בחולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים (שמקורו איננו במסתמי הלב) ולפחות גורם סיכון אחד, כמו שבץ או אירוע איסכמי חולף קודם, גיל 75 שנים ומעלה, יתר לחץ דם, סוכרת, אי ספיקת לב סימפטומטית.

לטיפול בקרישי דם בווריד הרגליים (פקקת של ורידי הדם העמוקים) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי).

קבוצה תרפויטית
נוגד קרישה

- אין להשתמש בתרופה אם:**
- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").
 - הינך סובל מדימום משמעותי פעיל.
 - הינך סובל מפגיעה או ממצב רפואי באיבר בגוף המגבירים את הסיכון לדימום חמור (כגון: כיב פעיל או אשר אירע לאחרונה, בקיבה או במעידימום במוח אשר אירע לאחרונה).
 - הינך סובל ממחלת כבד הגורמת לסיכון מוגבר לדימום (hepatic coagulopathy).
 - הינך נוטל תרופות למניעת קרישת דם (כגון: וארפרין, ריברוקסבאן, דביגטרן או הפרין) למעט במקרים של שינוי טיפול נוגד קרישה, כאשר מותקן צנתר תוך-ורידי או תוך-עורקי שעל מנת להשאירו פתוח יש צורך במתן הפרין דרכו, או אם הוחדר צנתר לכלי הדם (אבלציה באמצעות קטטר) לצורך טיפול בקצב לב לא סדיר (הפרעת קצב).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באפיקסבן טבע ספר לרופא אם:

- הינך סובל מסיכון מוגבר לדימום, כגון:
 - הפרעות דימום, כולל מצבים הגורמים לפעילות מופחתת של טסיות דם
 - לחץ דם גבוה מאוד, שאינו נשלט על-ידי טיפול רפואי
 - הינך מעל גיל 75
 - הינך שוקל 60 ק"ג או פחות
 - הינך סובל ממחלת כליות חמורה או שהינך מטופל בדיאליזה.
 - הינך סובל מבעיה בכבד או שיש לך היסטוריה של בעיות בכבד. תרופה זו תינתן בזהירות למטופלים עם סימנים של תפקוד כבד לקוי.
 - הוחדר לך צינור (קטטר) או שקיבלת זריקה לתוך עמוד השדרה (לביצוע הרדמה או לשיכוך כאבים), הרופא ינחה אותך ליטול את התרופה 5 שעות או יותר לאחר הוצאת הקטטר.
 - יש לך מסתם לבבי תותב.
 - הרופא שלך קבע כי לחץ הדם שלך איננו יציב או כי מתוכנן טיפול אחר או הליך ניתוחי להסרת קריש הדם מהריאות.
- יש לנקוט במשנה זהירות עם אפיקסבן טבע**
- אם ידוע לך שהינך סובל ממחלה הנקראת תסמונת אנטי-פוספוליפידית (הפרעה במערכת החיסונית אשר מעלה את הסיכון לקרישי דם). יש לדווח לרופא, אשר יחליט אם יש צורך לשנות את הטיפול.
 - אם הינך אמור לעבור ניתוח או הליך שעלול לגרום לדימום, הרופא עשוי לבקש ממך להפסיק באופן זמני את נטילת התרופה לזמן קצר. אם אינך בטוח אם הליך מסוים עלול לגרום לדימום, יש להיוועץ ברופא.

ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא, לרוקח או לאחות. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות מסוימות עשויות להגביר את ההשפעות של אפיקסבן טבע, ואחרות עשויות להפחית את השפעותיה. הרופא יחליט אם עליך לקבל טיפול באפיקסבן טבע בזמן נטילת תרופות אלו, ובאיזו מידה לעקוב אחריו.

- התרופות הבאות עלולות להגביר את ההשפעה של **אפיקסבן טבע** ולהעלות את הסיכוי לדימום לא רצוי:
 - תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בזיהום פטרייתי (כגון: קטוקונאזול וכולי).
 - תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בתסמונת כשל חיסוני נרכש (HIV/איידס) (כגון: ריטונביר).
 - תרופות נוספות אשר משמשות להפחתת היווצרות קרישי דם (כגון: אנוקספרין וכולי).
 - תרופות נוגדות דלקת או משככות כאבים (כגון: אספירין או נפרוקסן). במיוחד אם הינך מעל גיל 75 ולוקח אספירין, הינך בסיכון מוגבר לדימומים.
 - תרופות המשמשות לטיפול ביתר לחץ דם או בבעיות לב (כגון: דילטיאזם).
 - תרופות נוגדות דיכאון ממשפחת מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין (SSRI) או ממשפחת מעכבים של ספיגה חוזרת של סרוטונין-נוראפינפריין (SNRI).
- התרופות הבאות עלולות להפחית את היכולת של **אפיקסבן טבע** לעזור למנוע היווצרות קרישי דם:
 - תרופות לטיפול באפילפסיה או בפרכוסים (כגון: פניטואין, פנוברביטל וקרמזפין).
 - היפריקום - St. John's Wort (תוסף צמחי המשמש לטיפול בדיכאון).
 - תרופות לטיפול בשחפת או בזיהומים אחרים (כגון: ריפאמפין).

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

היריון והנקה

יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול בכל תרופה, אם הינך בהיריון או מניקה, קיים חשד להיריון או שהינך מתכננת היריון.

ההשפעות של אפיקסבן טבע על ההיריון או על העובר אינן ידועות. אין להשתמש באפיקסבן טבע אם הינך בהיריון. אם נכנסת להיריון במהלך השימוש בתרופה, צרי קשר עם הרופא באופן מיידי. אם הינך מניקה יש להיוועץ ברופא, ברוקח או באחות לפני השימוש באפיקסבן טבע. לא ידוע אם אפיקסבן טבע עוברת לחלב אם.

הצוות הרפואי ימליץ האם להפסיק את ההנקה או להפסיק/לא להתחיל את הטיפול באפיקסבן טבע.

נהיגה ושימוש במכונות

לא נצפה כי אפיקסבן טבע פוגעת ביכולתך לנהוג או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- אפיקסבן טבע מכילה לקטוז (סוג של סוכר). אם נאמר לך על-ידי הרופא שלך שיש לך אי סבילות (רגישות) לסוכרים מסוימים, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל את התרופה הזו.
- תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתון בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתון.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

מינון

- המינון ואופן הטיפול ייקבעו על-ידי הרופא בלבד.
- נסה ליטול את הטבליות בזמנים קבועים בכל יום, על מנת להשיג את ההשפעה המיטבית של הטיפול.
- יש לבלוע את התרופה עם מים.
- אין לחצות את הטבליות בהיעדר קו חצייה.
- אם אתה מתקשה לבלוע את הטבליה בשלמותה, שוחח עם הרופא שלך על דרכי נטילה אפשריות נוספות עבור אפיקסבן טבע. מייד לפני הנטילה, ניתן לכתוש את הטבליה ולערבב עם מים, עם 5% גלוקוז במים, עם מיץ תפוחים או עם מחית תפוחים.

הנחיות לכתישה:

- כתוש את הטבליה בעזרת מכתש ועלי.
- העבר את כל האבקה בזהירות לתוך כלי מתאים וערבב עם מעט נוזל, כ-30 מ"ל (2 כפות) מים או עם אחד מהנוזלים האחרים אשר מוזכרים מעלה.
- בלע את התערובת.
- שטוף את המכתש והעלי, בהם נעזרת בכדי לכתוש את הטבליה, עם מעט מים או עם אחד הנוזלים האחרים (30 מ"ל) לתוך הכלי שהכיל את התערובת ובלע את נוזל השטיפה.
- במידת הצורך הרופא שלך יכול לתת לך אפיקסבן טבע בעזרת צינור אפי-קיבתי.

טיפול לצורך מניעת אירועים של פקתת ורידית בחולים מבוגרים לאחר ניתוח יזום להחלפת מפרק

הברר או הירר:

המינון המומלץ הינו טבליה אחת של אפיקסבן טבע 2.5 מ"ג פעמיים ביום, לדוגמא, טבליה אחת בבוקר וטבליה נוספת בערב. השתדל לקחת את התרופה בזמנים קבועים מדי יום, על מנת לקבל את ההשפעה המיטבית של הטיפול.

יש להתחיל לקחת את התרופה כ-24-12 שעות לאחר הניתוח.

אם עברת ניתוח גדול בירך, בדרך כלל תיטול את הטבליות במשך 32 עד 38 ימים.

אם עברת ניתוח גדול בברך, בדרך כלל תיטול את הטבליות במשך 10 עד 14 ימים.

טיפול למניעת שבץ ותסחיפים מערכתיים בחולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים (שמקורו איננו

במסתימי הלב) ולפחות גורם סיכון אחד, כגון שבץ או אירוע איסכמי חולף קודם. גיל 75 שנים ומעלה.

יתר לחץ דם, סוכרת, אי ספיקת לב סימפטומטית:

המינון המומלץ הינו טבליה אחת של אפיקסבן טבע 5 מ"ג פעמיים ביום.

המינון המומלץ יופחת ל-2.5 מ"ג פעמיים ביום אם:

- הינך סובל מירידה חמורה בתפקוד הכליות.
- לפחות שניים מהקריטריונים הבאים מתקיימים:

- בדיקות הדם מצביעות על תפקוד כליות ירוד [ערך קריאטינין בסרום 1.5 מ"ג/דצ"ל

(133 מיקרומול/ליטר) או יותר].

- גילך הוא 80 שנים או מבוגר יותר.

- משקלך 60 ק"ג או פחות מכך.

המינון המומלץ הינו טבליה אחת פעמיים ביום, לדוגמא, טבליה אחת בבוקר וטבליה נוספת בערב. הרופא יחליט למשך כמה זמן עליך להמשיך בטיפול.

• **טיפול בקרישי דם בוורידים הרגליים ובכלי דם בריאות:**

המינון המומלץ הינו **שתי טבליות של אפיקסבן טבע 5 מ"ג** פעמיים ביום למשך 7 ימים ראשונים, לדוגמא, שתי טבליות בבוקר ושתי טבליות בערב. לאחר 7 ימי טיפול ראשונים, המינון המומלץ הינו **טבליה אחת של אפיקסבן טבע 5 מ"ג** פעמיים ביום, לדוגמא, טבליה אחת בבוקר וטבליה נוספת בערב. השתדל לקחת את התרופה בזמנים קבועים מדי יום, על מנת לקבל את ההשפעה המיטבית של הטיפול.

• **מניעת הישנות קרישי דם לאחר השלמת 6 חודשי טיפול:**

המינון המומלץ הינו טבליה אחת של **אפיקסבן טבע 2.5 מ"ג** פעמיים ביום, לדוגמא, טבליה אחת בבוקר וטבליה נוספת בערב. השתדל לקחת את התרופה בזמנים קבועים מדי יום, על מנת לקבל את ההשפעה המיטבית של הטיפול.

הרופא שלך יחליט למשך כמה זמן עליך להמשיך בטיפול.

אין לעבור על המנה המומלצת.

הרופא שלך עשוי להורות על השינויים הבאים בטיפול נוגד הקרישה שהינך מקבל:

- מעבר מטיפול באפיקסבן טבע לטיפול בתכשירים נוגדי קרישה אחרים: יש להפסיק ליטול **אפיקסבן טבע** ולהתחיל את הטיפול בתכשיר נוגד קרישה אחר (כגון הפרין) בזמן בו היית נוטל את המנה הבאה של **אפיקסבן טבע**.
- מעבר מטיפול בתכשיר נוגד קרישה אחר לטיפול באפיקסבן טבע: יש להפסיק את הטיפול בתכשיר נוגד הקרישה ולהתחיל את הטיפול באפיקסבן טבע בזמן בו היית נוטל את המנה הבאה של התכשיר נוגד הקרישה. לאחר מכן, יש להמשיך בהתאם למינון המומלץ.
- מעבר מטיפול בתכשירים נוגדי ויטמין K (כגון וארפרין) לטיפול באפיקסבן טבע: יש להפסיק את הטיפול בנוגדי ויטמין K. על הרופא לבצע בדיקות דם ולהנחות אותך לגבי מועד תחילת הטיפול באפיקסבן טבע.
- מעבר מטיפול באפיקסבן טבע לטיפול בתכשירים נוגדי ויטמין K (כגון וארפרין): אם הרופא שלך מנחה אותך להתחיל טיפול בתכשירים נוגדי ויטמין K, יש להמשיך ליטול **אפיקסבן טבע** לפחות למשך יומיים נוספים לאחר נטילת המנה הראשונה של נוגד ויטמין K. על הרופא לבצע בדיקות דם ולהנחות אותך לגבי מועד סיום הטיפול באפיקסבן טבע.

מטופלים אשר עוברים היפוך חשמלי

אם יש להחזיר את פעימות הלב הלא סדירות שלך למצב סדיר על-ידי הליך רפואי הנקרא היפוך חשמלי (Cardioversion), קח את **אפיקסבן טבע** בזמנים שבהם הרופא מנחה אותך, כדי למנוע קרישי דם בכלי הדם במוח ובכלי דם אחרים בגופך.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך גם אם לא נותרו טבליות.

אם נטלת יותר מהמנה המומלצת, ייתכן שיהיה לך סיכון מוגבר לדימום. אם מתרחש דימום, ייתכן שיידרש ניתוח, עירוי דם או טיפולים אחרים שעשויים להפוך את פעילות האנטי-פקטור Xa.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול את המנה בהקדם האפשרי באותו היום ולהמשיך את נטילת התרופה פעמיים ביום (ולא יותר). אין להכפיל את המינון כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אם אינך בטוח כיצד לנהוג או אם שכחת יותר ממנה אחת, עליך להתייעץ עם הרופא, הרוקח או האחיות. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או עם הרוקח.

אין להפסיק את השימוש בתרופה זו מבלי להתייעץ תחילה עם הרופא, מכיוון שהפסקת הטיפול מוקדם מדי עלולה להעלות את הסיכון להיווצרות קרישי דם.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא, ברוקח או באחות.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באפיקסבן טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. תופעות הלוואי ושכיחותן יכולות להיות שונות בין ההתוויות השונות והן מפורטות בהמשך עבור כל התוויה. תופעת הלוואי השכיחה ביותר של אפיקסבן טבע היא דימום, אשר עלול להיות מסכן חיים ועל כן דורש פנייה מיידית לרופא.

תופעות לוואי האופייניות למתן אפיקסבן טבע בטיפול למניעת אירועים של פקקת ורידית בחולים מבוגרים לאחר ניתוח יזום להחלפת מפרק הברך או הירך:

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים):

- אנמיה העלולה לגרום לעייפות או לחיוורון
- דימום הכולל חבורות ונפיחות
- בחילה (הרגשת חולי)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע ב- עד 1 מתוך 100 אנשים):

- ירידה במספר הטסיות בדם (עלולה להשפיע על קרישת הדם)
- דימום ובכלל זה: דימום בעקבות ניתוח כולל חבורות ונפיחות, הפרשת דם או נוזלים מהחתך או ממקום ההזרקה; דימום בקיבה, במעי או דם אדום/בהיר בצואה, דם בשתן, דימום מהאף, דימום מהנרתיק
- ירידה בלחץ הדם אשר עלולה לגרום לתחושת עילפון או לדופק מואץ
- שינויים בבדיקות דם שעשויות להראות: תוצאות תפקודי כבד חריגות, עלייה באנזימי כבד, עלייה בבילירובין (תוצר פירוק של תאי דם אדומים המתבטא בהצהבת העור והעיניים)
- גרד

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע ב- עד 1 מתוך 1,000 אנשים):

- תגובה אלרגית (רגישות יתר) אשר עלולה לגרום לנפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון ו/או בגרון ולקשיי נשימה. יש לפנות מייד לרופא אם אתה חווה אחד מתסמינים אלו.
- דימום לתוך השריר, דימום בעין, דימום מהחניכיים ושיעול דמי, דימום מפי הטבעת
- נשירת שיער

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות מהמידע הקיים):

- דימום הכולל: דימום מוחי, דימום בעמוד השדרה, דימום בריאות או בגרון, דימום בפה, דימום בחלל הבטן או דימום לתוך המרווח שמאחורי חלל הבטן, דימום מטחורים, בדיקות בהן נצפה דם בצואה או בשתן
- פריחה בעור אשר עלולה ליצור שלפוחיות ונראית כמו מטרות קטנות (כתם מרכזי כהה המוקף בשטח חיוור, עם טבעת כהה סביב השוליים) (אדמנת רב-צורתית - *erythema multiforme*)
- דלקת בכלי דם (וסקוליטיס) שעלולה לגרום לפריחה בעור או לכתמים מחודדים, שטוחים, אדומים ועגולים מתחת לפני העור או לחבלות
- דימום בכליה, לעיתים עם נוכחות של דם בשתן המוביל לחוסר יכולת של הכליות לפעול כראוי (נפרופתיה הקשורה בנוגדי קרישה)

תופעות לוואי האופייניות למתן אפיקסבן טבע בטיפול למניעת שבץ ותסחיפים מערכתיים בחולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים (שמקורו איננו במסתמי הלב) ולפחות גורם סיכון אחד נוסף:

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 10 אנשים):

- דימום הכולל: דימום בעיניים, דימום בקיבה או במעי, דימום בפי הטבעת, דם בשתן, דימום מהאף, דימום מהחניכיים, חבורות ונפיחות
- אנמיה העלולה לגרום לעייפות או לחיוורון
- לחץ דם נמוך אשר עלול לגרום לתחושת עילפון או לדופק מואץ
- בחילה (הרגשת חולי)
- בדיקות דם שעשויות להראות עלייה בגאמא-גלוטמיל-טרנספראז (GGT)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 100 אנשים):

- דימום ובכלל זה: דימום מוחי, דימום בעמוד השדרה, דימום מהפה או שיעול דמי, דימום לתוך חלל הבטן, דימום מהנרתיק, דם אדום/בהיר בצואה, דימום בעקבות ניתוח כולל חבורות ונפיחות, הפרשת דם או נוזלים מהחתך או ממקום ההזרקה; דימום מטחורים, בדיקות בהן נצפה דם בצואה או בשתן
- ירידה במספר הטסיות בדם (עלולה להשפיע על קרישת הדם)
- שינויים בבדיקות דם שעשויות להראות: תוצאות תפקודי כבד חריגות, עלייה באנזימי כבד, עלייה בבילירובין (תוצר פירוק של תאי דם אדומים המתבטא בהצהבת העור והעיניים)
- פריחה בעור
- גרד
- נשירת שיער

- תגובה אלרגית (רגישות יתר) אשר עלולה לגרום לנפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון ו/או בגרון ולקשיי נשימה. יש לפנות מייד לרופא אם אתה חווה אחד מתסמינים אלו.

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 1,000 אנשים):

- דימום בריאות או בגרון, דימום לתוך המרווח שמאחורי חלל הבטן, דימום לתוך השריר

תופעות לוואי נדירות מאוד (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 10,000 אנשים):

- פריחה בעור אשר עלולה ליצור שלפוחיות ונראית כמו מטרות קטנות (כתם מרכזי כהה המוקף בשטח חיוור, עם טבעת כהה סביב השוליים) (אדמנת רב-צורתית - *erythema multiforme*)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות מהמידע הקיים):

- דלקת בכלי דם (וסקוליטיס) שעלולה לגרום לפריחה בעור או לכתמים מחודדים, שטוחים, אדומים ועגולים מתחת לפני העור או לחבלות
- דימום בכליה, לעיתים עם נוכחות של דם בשתן המוביל לחוסר יכולת של הכליות לפעול כראוי (נפרופתיה הקשורה בנוגדי קרישה)

תופעות הלוואי הבאות הינן ידועות אם הינך נוטל אפיקסבן טבע לטיפול או למניעת הישנות קרישי דם כווריד הרגליים או בכלי הדם בריאות:

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 10 אנשים):

- דימום הכולל: דימום מהאף, דימום מהחניכיים, דם בשתן, חבורות ונפיחות, דימום בבטן, דימום במעי ודימום בפי הטבעת, דימום בפה, דימום מהנרתיק
- אנמיה העלולה לגרום לעייפות או לחיוורון
- ירידה במספר הטסיות בדם (עלולה להשפיע על קרישת הדם)
- בחילה (הרגשת חולי)
- פריחה בעור
- בדיקות דם שעשויות להראות עלייה בגאמא-גלוטמיל-טרנספראז (GGT) או באלנין אמינוטרנספראז (ALT)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 100 אנשים):

- לחץ דם נמוך אשר עלול לגרום לתחושת עילפון או לדופק מואץ
- דימום הכולל: דימום בעיניים, דימום בפה או שיעול דמי, דם אדום/בהיר בצואה, בדיקות בהן נצפה דם בצואה או בשתן, דימום בעקבות ניתוחים כולל חבורות ונפיחות, הפרשת דם או נוזלים מהחתך או ממקום ההזרקה; דימום מטחורים, דימום לתוך השריר
- גרד
- נשירת שיער
- תגובה אלרגית (רגישות יתר) אשר עלולה לגרום לנפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון ו/או בגרון ולקשיי נשימה. יש לפנות לרופא אם אתה חווה אחד מתסמינים אלו.
- שינויים בבדיקות דם שעשויות להראות: תוצאות תפקודי כבד חריגות, עלייה באנזימי כבד, עלייה בבילירובין (תוצר פירוק של תאי דם אדומים המתבטא בהצהבת העור והעיניים)

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע בעד 1 מתוך 1,000 אנשים):

- דימום הכולל: דימום מוחי או דימום בעמוד השדרה, דימום בריאות

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות מהמידע הקיים):

- דימום הכולל: דימום לתוך חלל הבטן או דימום לתוך המרווח שמאחורי חלל הבטן
- פריחה בעור אשר עלולה ליצור שלפוחיות ונראית כמו מטרות קטנות (כתם מרכזי כהה המוקף בשטח חיוור, עם טבעת כהה סביב השוליים) (אדמנת רב-צורתית - *erythema multiforme*)
- דלקת בכלי דם (וסקוליטיס) שעלולה לגרום לפריחה בעור או לכתמים מחודדים, שטוחים, אדומים ועגולים מתחת לפני העור או לחבלות
- דימום בכליה, לעיתים עם נוכחות של דם בשתן המוביל לחוסר יכולת של הכליות לפעול כראוי (נפרופתיה הקשורה בנוגדי קרישה)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose (anhydrous), microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide, lactose monohydrate, sodium lauryl sulfate, polyethylene glycol, triacetin, iron oxide red
2.5 mg - iron oxide yellow.

כיכד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

אפיקסבן טבע 2.5 מ"ג: טבליה עגולה מצופה בצבע צהוב בהיר עם הטבעה "TV" על צידה האחד ו-"G1" על צידה השני של הטבליה.

אפיקסבן טבע 5 מ"ג: טבליה אליפטית מצופה בצבע ורוד בהיר עם הטבעה "TV" על צידה האחד ו-"G2" על צידה השני של הטבליה.
האריזות מכילות 30, 60 או 100 טבליות. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו

טבע ישראל בע"מ,
רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

העלון נערך בספטמבר 2025.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

אפיקסבן טבע 2.5 מ"ג: 164.92.35374

אפיקסבן טבע 5 מ"ג: 164.93.35375

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.