

NOVARTIS

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

يوكرياس يوكرياس يوكرياس 50/500 ملغ 50/850 ملغ 50/1000 ملغ أقراص مطلية أقراص مطلية

التركيب:

كل قرص يحتوي على:

يوكرياس 50/500 ملغ:

vildagliptin 50 mg and metformin hydrochloride 500 mg

فيلداجليبتين 50 ملغ وميتفورمين هيدروكلوريد 500 ملغ.

يوكرياس 50/850 ملغ:

vildagliptin 50 mg and metformin hydrochloride 850 mg

فيلداجليبتين 50 ملغ وميتفورمين هيدروكلوريد 850 ملغ.

يوكرياس 50/1000 ملغ:

vildagliptin 50 mg and metformin hydrochloride 1000 mg

فيلداجليبتين 50 ملغ وميتفورمين هيدروكلوريد 1000 ملغ.

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتعمن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يعتبر كلا المركبين الفعالين أدوية لمعالجة داء السكري للإعطاء عن طريق الفم.

يوكرياس مخصص لمعالجة داء السكري من نوع 2: يوكرياس مخصص لعلاج لكار الذين يتلقون حالياً علاجاً مشتركاً من فيلداجليبتين وميتفورمين هيدروكلوريد بأقرص منفصلة، أو أن السكري لديهم غير متوازن بواسطة ميتفورمين هيدروكلوريد لوحده.

يصف لك الطبيب علاجاً بـ يوكرياس لوحده أو بمشاركة دواء إضافي للسكري كأمر متعلق بحالتك. يوكرياس بمشاركة حمية غذائية ونشاط بدني، مخصص أيضاً بمشاركة الإنسولين أو دواء من مجموعة سولفونيل يوريا، للكبار.

الفصلية العلاجية:

فيلداجليبتين - من مثبطات الإنزيم ثنائي بيتيديل بيتيداز-4 (DPP-4).

ميتفورمين - من البيجوانيدات.

يتطور داء السكري من نوع 2 عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين، أو أن الإنسولين الذي ينتجه الجسم لا يعمل كما ينبغي أو عندما ينتج الجسم أكثر من اللازم من الجلوكاجون.

الإنسولين عبارة عن مادة تساعد على خفض نسبة الجلوكوز في الدم، خاصة بعد وجبات الطعام. جلوكاجون هو مادة تحفز الكبد لإنتاج الجلوكوز ويؤدي إلى إرتفاع نسب الجلوكوز في الدم. كلتا هاتين المادتين تنتجان في البنكرياس. يساعد كلا المركبين الفعالين في المستحضر يوكرياس على موازنة نسبة الجلوكوز في الدم.

يوكرياس يؤدي إلى إنتاج إنسولين بشكل أكثر وجلوكاچون بشكل أقل من قبل البنكرياس (بتأثير فيلداجليبتين) ويساعد الجسم أيضا على الاستفادة بشكل أفضل من الإنسولين الذي تم إفرازه (بتأثير ميتفورمين هيدروكلوريد).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- إذا كنت حساساً (أليرجي) لفيلداجليبتين، لميتفورمين هيدروكلوريد أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية"). إذا كنت تعتقد بأنك قد تكون حساسا لإحدى تلك المركبات، فيجب التحدث مع الطبيب قبل تناول يوكرياس.
- إذا كان السكري لديك غير متوازن ويشمل مثلاً فرط سكر الدم الشديد (إرتفاع نسبة الجلوكوز في الدم)، غثيان، تقيؤ، إسهال، تناقص سريع في الوزن، حمّاض لبني (أنظر "خطورة حدوث حماض لبني" في سياق النشرة) أو تحمضن الدم (حماض كيتوني).
- تحمضن الدم هو حالة تتراكم فيها مواد تسمى الأجسام الكيتونية في الدم ومن شأنها أن تؤدي لحالة تسمى ما قبل السبات السكري. الأعراض تشمل ألم في البطن، تنفس سريع وعميق، نعاس أو تنفس غير عادي برائحة الفواكه.
- إذا حدثت لديك مؤخراً نوبة قلبية أو إذا كنت تعاني من قصور القلب أو من مشاكل خطيرة في الدورة الدموية أو من صعوبات في التنفس التي قد تشكل علامة لمشاكل في القلب.
- إذا كنت تعاني من تراجع شديد في الأداء الوظيفي للكلى.
- إذا كنت تعاني من تلوث خطير أو كنت تعاني من التجفاف بشكل خطير (فقدت الكثير من السوائل من جسمك).
- إذا كنت مقدم على إجراء تصوير بواسطة أشعة X (نوع معين من التصوير يشمل حقن مادة ظليلة تحتوي على اليود) (أنظر فقرة "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الأداء الوظيفي للكبد.
- إذا كنت تشرب الكحول بشكل مبالغ فيه (سواءً كان كل يوم أو من حين لآخر فقط).
- إذا كنت مرضعة (أنظري أيضاً "الحمل، الإرضاع والخصوبة").

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

خطورة لحدوث حماض لبني

من شأن يوكرياس أن يسبب عرضاً جانبياً نادراً جداً لكنه خطير جداً يسمّى الحماض اللبني، خاصة إذا كانت كليتك لا تعملان كما ينبغي. إن خطورة تطوّر حماض لبني تزداد أيضاً في حالات السكري غير المتوازن، التلوثات الخطيرة، الصوم لفترة طويلة أو إستهلاك الكحول، التجفاف (أنظر معلومات إضافية في السياق)، وجود مشاكل في وظائف الكبد وأية حالة طبية يقل فيها تزويد الأكسجين إلى منطقة معينة من الجسم (مثلا مرض قلبي حاد وخطير).

إذا كان واحد أو أكثر من الحالات السابقة ينطبق عليك، تحدث مع الطبيب لتلقي إرشادات إضافية.

يجب التوقف عن تناول يوكرياس لفترة قصيرة إذا كنت تقاسي من حالة تتعلق بالتجفاف (فقدان سوائل الجسم بشكل ملحوظ) مثل تقيؤ شديد، إسهال، سخونة، التعرض للحرّ أو إذا كنت تشرب سوائل أقل من المعتاد. تحدث مع الطبيب لتلقي إرشادات إضافية.

يجب التوقف عن تناول يوكرياس والتوجه حالاً إلى الطبيب أو المستشفى القريب إذا كنت تعاني من بعض أعراض الحماض اللبني، وذلك لأن هذه الحالة قد تؤدي إلى السبات.

أعراض الحماض اللبني تشمل:

- تقيؤ
- ألم في البطن
- تقلصات عضلية
- الشعور بوعكة عامة مع إرهاق شديد

- صعوبات في التنفس

- تناقص درجة حرارة الجسم ونظم القلب

الحماض اللبني هي حالة طبية طارئة ويجب معالجتها في المستشفى.

توجه فوراً إلى الطبيب لتلقي تعليمات إضافية إذا:

- من المعروف أنك تعاني من مرض وراثي جيني يؤثر على الميتوكوندريا (المركبات التي تنتج الطاقة داخل الخلايا) مثل متلازمة MELAS (اعتلال دماغي ميتوكوندريالي، إعتلال عضلي، حماض لبني ونوبات شبيهة بالسكتة الدماغية)، أو داء السكري والصمم الوراثي عند الأم (MIDD).
- إذا كنت تقاسي من أي من الأعراض التالية بعد بدء العلاج بميتفورمين: إختلاجات، تدني بالقدرة الإدراكية، صعوبة في حركات الجسم، أعراض تشير إلى تضرر عصبي (مثلاً ألم أو فتور الحواس)، شقيقة وصمم.

يوكرياس لا يشكل بديلاً للإنسولين. لذلك، لا يجوز تلقي يوكرياس لمعالجة السكري من نوع 1.

قبل العلاج بـ يوكرياس احك لطبيب إذا:

- عانيت في الماضي، أو كنت تعاني من مرض في البنكرياس.
- كنت تتناول دواء لعلاج السكري من مجموعة سولفونيل يوريا. من الجائز أن يرغب طبيبك بخفض المقدار الدوائي للدواء من مجموعة سولفونيل يوريا عندما يُعطى سوية مع يوكرياس بهدف منع إنخفاض نسبة الجلوكوز في الدم (حالة نقص سكر الدم).
- تناولت في الماضي فيلداجليبتين وإضطرت لتوقف بسبب مرض في الكبد؛ لا يجوز تناول هذا الدواء.
- كنت تعاني من تراجع في وظائف الكلى. من الجائز أن يصف لك الطبيب مقداراً دوائياً منخفضاً من يوكرياس، بحسب الأداء الوظيفي لكليتك.

خلال فترة العلاج بـ يوكرياس:

- إن الأوقات الجلدية هي إختلاط شائع لمرض السكري. يوصى بالتقيد بتوصيات الطبيب أو الممرضة وذلك للمحافظة على الجلد وراحتي القدمين. كما أنه، يوصى بالانتباه بالأخص لتشكل حويصلات أو تقرحات جديدة خلال فترة تناول يوكرياس. في حال حدوثها، عليك إستشارة الطبيب فوراً.
- إذا كان من المرغتب أن تجتاز عملية جراحية، فيجب التوقف عن تناول يوكرياس خلال العملية الجراحية ولفترة من الزمن بعدها. يقرر طبيبك متى يتوجب عليك التوقف ومتى يجب إستئناف العلاج بـ يوكرياس.

الأطفال والمراهقون

إن إستعمال يوكرياس غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

الفحوصات والمتابعة

- قبل بدء العلاج بـ يوكرياس، سيتم توجيهك من قبل الطبيب لإجراء فحص ووظائف الكبد. خلال السنة الأولى للعلاج بالدواء، يجب إجراء فحص كل ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يجب إجراء فحوص دورية، وذلك لتشخيص حدوث إرتفاع في نسبة إنزيمات الكبد في مرحلة مبكرة.
- خلال فترة العلاج يقوم الطبيب بمراقبة نسب الجلوكوز في الدم والبول من حين لآخر.
- قبل بدء العلاج وخلال فترة العلاج بـ يوكرياس، يقوم الطبيب بفحص الأداء الوظيفي الكلوي لديك، مرة في السنة على الأقل، وبوتيرة أعلى إذا كنت مسناً و/أو في حال وجود تفاقم في الأداء الوظيفي الكلوي لديك.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذا توجب عليك الخضوع لحقن مادة ظليلة الحاوية على اليود إلى الدورة الدموية، مثلاً خلال تصوير رنتجن أو الإستقصاء، فيجب التوقف عن تناول يوكرياس قبل أو أثناء الحقن. يقرر طبيبك متى يتوجب عليك التوقف ومتى يجب إستئناف العلاج بـ يوكرياس.

إذا كنت تتناول أدوية إضافية، فمن الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوص أكثر تواتراً لنسب الجلوكوز في الدم ووظائف الكلى، أو من الجائز أن يضطر الطبيب لتغيير المقدار الدوائي من يوكرياس بما يلائم.

يجب الإشارة بشكل خاص إذا كنت تتناول الأدوية من المجموعات التالية:

- جلوكوكورتيكويدات التي تستعمل عادة لمعالجة الإلتهاب؛

- مقلدات بيتا-2 (beta-2 agonists) التي تستعمل عادة لمعالجة الإضطرابات التنفسية؛

- أدوية أخرى لمعالجة السكري؛

- الأدوية التي تزيد من إنتاج البول (المدرات البولية)؛

- الأدوية المستعملة لمعالجة الآلام والإلتهاب (الأدوية المضادة للإلتهاب اللاستيروئيدية [NSAIDs] ومثبطات الإنزيم COX-2، مثل إيبوبروفين وسيليكوكسب)؛
- أدوية معينة لمعالجة فرط ضغط الدم (مثبطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين [ACE] ومضادات المستقبل أنجيوتنسين II)؛
- أدوية معينة التي تؤثر على الغدة الدرقية (thyroid)؛
- أدوية معينة التي تؤثر على الجهاز العصبي؛
- أدوية معينة لعلاج الذبحة الصدرية (مثلاً رنولازين)؛
- أدوية معينة لعلاج عدوى HIV (مثلا دولوتجرافير)؛
- أدوية معينة لعلاج نوع معين من سرطان الغدة الدرقية (medullary thyroid cancer) (مثلاً فاندبتانيب)؛
- بعض الأدوية لعلاج الحرقان والقرحة الهضمية (مثلاً سيميتيدين).

إستعمال يوكرياس والطعام

يوصى بتناول الأقرص مع أو حالاً بعد وجبة الطعام. يقلل هذا الأمر من خطورة حدوث إنزعاج في البطن.

إستعمال يوكرياس وإستهلاك الكحول

إمتنع عن إستهلاك الكحول بشكل مبالغ فيه خلال فترة العلاج بـ يوكرياس، وذلك لأن إستهلاك الكحول من شأنه أن يزيد من خطورة حدوث حماض لبني (أنظر فقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحصل

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنك حامل أو تخطين للحمل. يتناقض معك الطبيب حول الخطورة المحتملة من تناول يوكرياس خلال فترة الحمل. لا تتوفر معلومات كافية بخصوص إستعمال يوكرياس في فترة الحمل، ولذلك لا يجوز إستعمال يوكرياس إذا كنت حاملاً.

الإرضاع

لا يجوز إستعمال المستحضر يوكرياس إذا كنت مرضعة (أنظري أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا:").

الخصوبة

لا تتوفر معلومات من الأبحاث السريرية.

السياقة وإستعمال الماكنتا

إذا كنت تتعرق بدوار أثناء تناول يوكرياس، فتجنب سياقة المركبة، أو إستعمال الأجهزة أو الماكنتا.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيحاء من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قِبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو قرص واحد، مرتين في اليوم. في حال عدم سلامة الأداء الوظيفي للكليتك أو كنت تتناول دواء من مجموعة سولفونيل يوريا، فمن الجائز أن يصف لك الطبيب مقدار دوائي منخفض أكثر من يوكرياس.

يمكن أن يُوصف لك الدواء كعلاج منفرد أو كجزء من علاج مشترك مع أدوية إضافية لخفض نسبة الكولوكوز في الدم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا توفر لديك أي سؤال حول فترة العلاج بـ يوكرياس، راجع الطبيب.

لا يجوز المضغ الأقراص مطلية. يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء.

يوصى بتناول الأقراص مع أو حالاً بعد وجبة الطعام. هذا الأمر يقلل من إحتمال حدوث إزعاج في البطن.

يجب تناول قرص واحد في الصباح وقرص واحد في المساء.

خلال فترة العلاج يجب الإستمرار والحرص على التوصيات الغذائية التي أعطيت لك من قبل الطبيب، خاصة إذا كنت تتبع نظام غذائي تمت ملاءمته لمرضى السكري.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر معك عبلة الدواء. من الجائز أن يحتاج الأمر علاجاً طبياً.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة دوائية مع وجبة الطعام القريبة. إذا كان من المفترض أن تتناول جرعة دوائية مع وجبة الطعام القريبة على أية حال، فيجب تفويت الجرعة الدوائية المنسية. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة (قرصين دفعة واحدة) للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب، وذلك لكي يواصل الدواء موازنة نسب الكولوكوز في دمك.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال يوكرياس قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن تناول يوكرياس والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا وجد لديك واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- الحمض اللبني (نادر جداً): أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين (10,000): من شأن يوكرياس أن يسبب عرضاً جانبياً نادراً جداً لكنه خطير جداً يسمى الحمض اللبني (أنظر فقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء"). إذا حصل هذا الأمر، فيجب التوقف عن تناول يوكرياس والتوجه حالاً إلى الطبيب أو المستشفى القريب، وذلك لأن الحمض اللبني يمكن أن يؤدي لسبات.

- وذمة وعائية (نادر): أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين (10,000): الأعراض تشمل إنتفاخ الوجه، اللسان أو الحنجرة، صعوبات في البلع، صعوبات في التنفس، ظهور مفاجئ لطفح أو شرى، التي من شأنها أن تدل على رد فعل يسمى وذمة وعائية.

- مرض كبدى (hepatitis) (غير شائع): أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين (1,000): الأعراض تشمل إصفرار الجلد والعينين، غثيان، قلة الشهية للطعام، بول داكن، التي من شأنها أن تدل على مرض في الكبد (إلتهاب الكبد).

- إلتهاب البنكرياس (pancreatitis) (غير شائع): أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين (1,000): الأعراض تشمل ألم شديد ومتواصل في منطقة البطن الذي قد يمتد إلى الظهر بالإضافة لحدوث غثيان وتقيؤات.

أعراض جانبية إضافية:

لقد قاسى بعض المرضى من الأعراض الجانبية التالية أثناء تناول يوكرياس:

- أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100): ألم في الحنجرة، سيلان الأنف، سخونة، طفح جلدي مع حكة، فرط التعرق، ألم المفاصل، دوار، صداع، إرتجاف خارج عن السيطرة، إسماك، غثيان، تقيؤات، إسهال، تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، حرقان، آلام داخل وحول المعدة (ألم بطني).
- أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000): إرهاق، ضعف، مذاق معدني، إنخفاض نسبة الكولوكوز، فقدان الشهية، إنتفاخ راحتي اليدين، الكاحلين أو القدمين (وذمة)، قشعريرة، إلتهاب في البنكرياس، آلام العضلات.
- أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000): علامات لإرتفاع نسبة حمض اللين في الدم (حالة تسمى حمض لبني) مثل نعاس أو دوار، غثيان شديد أو تقيؤ، ألم في البطن، نظم قلب غير منتظم أو تنفس عميق وسريع؛ إحمراء الجلد، حكة؛ إنخفاض نسبة فيتامين B12 (شحوب، إرهاق، علامات مثل إرتباك أو مشاكل في الذاكرة).

لقد بُلغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية، منذ تسويق المستحضر:

شيوخ غير معروف (ليس بالإمكان تقييمها من المعطيات المتوفرة): تقشر موضعي للجلد أو حويصلات، إلتهاب الأوعية الدموية (إلتهاب وعائي) الذي قد يسبب طفحاً جلدياً أو نقاط بارزة، مسطحة، حمراء مستديرة تحت سطح الجلد أو كدمات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة نوفارتيس بواسطة عنوان البريد الإلكتروني التالي: safetydesk.israel@novartis.com.

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبلة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

- يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية والتخزين في العبلة الأصلية للحماية من الرطوبة.
- لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو لسلة النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

تحتوي أقراص يوكرياس بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على:

Hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E 171), polyethylene glycol 4000, talc, iron oxide yellow (E 172), iron oxide red (E 172) (50/500 mg only).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبلة:

يوكرياس 50/500 ملغ: أقراص مطلية بفيلم ذات لون أصفر فاتح، بيضوية وذات حواف مائلة عليها الكتابة NVR بجانب واحد و- LLO من الجانب الآخر.

حجم العبلة: 60 قرصاً.

يوكرياس 50/850 ملغ: أقراص مطلية بفيلم ذات لون أصفر، بيضوية وذات حواف مائلة عليها الكتابة NVR بجانب واحد و- SEH من الجانب الآخر.

حجم العبلة: 60 قرصاً.

يوكرياس 50/1000 ملغ: أقراص مطلية بفيلم ذات لون أصفر غامق، بيضوية وذات حواف مائلة عليها الكتابة NVR بجانب واحد و- FLO من الجانب الآخر.

حجم العبلة: 60 قرصاً.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 9240، تل أبيب، إسرائيل. تم إعدادها في حزيران 2025.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

يوكرياس 50/500 ملغ: 147 89 33623

يوكرياس 50/850 ملغ: 143 88 32042

يوكرياس 50/1000 ملغ: 147 90 33627

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.