

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصادلة (مستحضرات) – 1986
يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

زيبركسا	زيبركسا	زيبركسا
10 ملغ	7.5 ملغ	5 ملغ
أقراص	أقراص	أقراص
المادة الفعالة:	المادة الفعالة:	المادة الفعالة:
يحتوي كل قرص على:	يحتوي كل قرص على:	يحتوي كل قرص على:
olanzapine 10 mg	olanzapine 7.5 mg	olanzapine 5 mg
أولانزابين 10 ملغ	أولانزابين 7.5 ملغ	أولانزابين 5 ملغ

المواد غير الفعّالة ومسببات الحساسية في المستحضر: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية" والبند "معلومات مهمة عن قسم من مركّبات الدواء" في الفصل 2.
اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه إلى الطبيب أو الصيدليّ.
وُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

تحذير: ارتفاع في خطر الوفاة لدى المسنين الذين يعانون من الذهان المتعلق بالخرف.
يكون المسنون الذين يعانون من الذهان المتعلق بالخرف ويتلقون العلاج بمستحضرات مضادة للذهان أكثر عرضة لخطر الوفاة.
تمت ملاحظة زيادة في خطر الوفاة لدى المرضى الذين عولجوا بالأدوية المضادة للذهان، سواء كانوا يعالجون بأدوية مضادة للذهان التقليدية أو بأدوية مضادة للذهان غير التقليدية.
قد يسبب زيبركسا عرضا جانبيا خطيرا يتضمن ازدياد خطر الوفاة لدى المسنين الذين يعانون من ارتباك، فقدان الذاكرة وفقدان العلاقة بالواقع (الذهان المتعلق بالخرف). زيبركسا ليس مصادقا عليه لعلاج المرضى المسنين الذين يعانون من الذهان المتعلق بالخرف.

1. لم أعد هذا الدواء؟

للعلاج الحاد وعلاج الصيانة في الفصام.
زيبركسا معدّ لعلاج أعراض الاضطرابات الذهانية.
زيبركسا معدّ للعلاج قصير الأمد لنوبات الهوس الحادة المتعلقة باضطراب ثنائي القطب ا.

منع الانتكاس في الاضطراب ثنائي القطب:
لدى المرضى الذين استجابت نوبة الهوس لديهم للعلاج بأولانزابين، فإن زيبركسا معدّ لمنع الانتكاس لدى المرضى الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب.

علاج مدمج لعلاج اضطراب ثنائي القطب ا:
إن الدمج بين زيبركسا والليثيوم أو الغلبروبات معد للعلاج قصير الأمد لعلاج نوبات الهوس الخطيرة المرتبطة
بالاضطراب ثنائي القطب ا.

الفصيلة العلاجية:

أدوية مضادة للذهان غير نمطية.

تشتمل أعراض الفصام على سماع أصوات، رؤية أمور غير حقيقية، اعتقاد بأمور خاطئة، تشكيك وانفصال.
تشتمل أعراض الاضطراب ثنائي القطب من النوع ا بالتناوب على فترات من الاكتئاب والمزاج المرتفع أو العصبية،
ارتفاع النشاط ونقص الراحة، أفكار سريعة، كلام سريع، سلوك اندفاعي، وانخفاض الحاجة إلى النوم.

2. قبل استعمال الدواء:

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (لديك أرجية) لأولانزابين أو لأحد مركبات الدواء الأخرى.
للحصول على معلومات خاصة عن موانع الاستعمال المتعلقة بالليثيوم أو الغلبروبات، عليك مراجعة
بند موانع الاستعمال الخاصة بالنشرات المرفقة بعبوة هذه المستحضرات.

تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدّواء

- يؤدي زيبركسا إلى اضطراب في قدرة الجسم على تقليل درجة الحرارة. يجب الامتناع عن حالات قد يطرأ فيها ارتفاع زائد على درجة حرارة الجسم وجفاف، مثل فرط النشاط الجسماني أو المكوث المتكرر في الأماكن الحارة.
يجب الحرص على شرب السوائل لمنع الجفاف.
- قد يؤدي زيبركسا إلى انخفاض ضغط الدم عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس. تشتمل الأعراض على: دوخة، تسارع نبض القلب أو تباطئه، وحتى الإغماء لدى بعض المرضى. تحدث هذه الظاهرة غالباً في بداية العلاج.
- يمكن أن يؤدي زيبركسا إلى النعاس، انخفاض ضغط الدم عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس وإلى عدم ثبات حركي وحسي، ومن شأن هذه الأعراض أن تؤدي إلى السقوط، ونتيجة لذلك إلى حدوث كسور وإصابات إضافية. يجب الاستعمال بحذر وفحص الخطر/الفائدة لدى المعالجين مع خلفية طبية أو مع أدوية يمكن أن ترفع خطر السقوط.
- شوهد ارتفاع في الوزن لدى المرضى الذين تناولوا زيبركسا. يجب متابعة الوزن بشكل منتظم.
- يجب متابعة مستويات السكر والدهنيات في الدم، لأن زيبركسا قد يؤدي إلى ارتفاع هذه المستويات.
- المعالجون الذين لديهم تاريخ طبي من مستويات منخفضة من خلايا الدم البيضاء، عليهم إجراء فحص تعداد دم بشكل منتظم في الأشهر الأولى من العلاج، بهدف المتابعة. قد يؤدي زيبركسا إلى انخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء. يجب التفكير في إيقاف العلاج بـ زيبركسا عند حدوث العارض الأول لهذه الحالة. يجب على المعالجين الذين يعانون من انخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء أن يخضعوا لمتابعة الحرارة أو الأعراض الأخرى التي تشهد على حدوث عدوى. في حال وجود مثل هذه الأعراض يجب إيقاف العلاج حالاً بـ زيبركسا.
- زيبركسا غير مصادق عليه لعلاج المرضى المسنين الذين يعانون من الخرف بسبب إمكانية حدوث أعراض جانبية خطيرة: سقوط، نعاس، وذمة محيطية، مشي غريب، سلس البول، تعب، ارتفاع الوزن، ضعف، حمى، التهاب الرئتين، جفاف الفم، هلوسة بصرية، سكتة دماغية ووفاة.
- المرضى المصابون بالفصام وياضطراب ثنائي القطب معرضون لخطر عال للقيام بمحاولات انتحارية. لهذا، عند العلاج بزيبركسا يجب إجراء متابعة مكثفة لهؤلاء المرضى.

- يجب توخي الحذر لدى المعالجين الذين عانوا في الماضي أو يعانون الآن من احتباس البول، تضخم غدة البروستات، إمساك أو ماضٍ من انسداد الأمعاء، لأن استعمال زيبركسا لدى هؤلاء المعالجين قد يسبب أعراضاً مثل الإمساك، جفاف الفم، ونبض سريع. في ظل التجربة المتراكمة بعد تسويق الدواء تبين أن هناك خطر التعرض لأعراض جانبية حادة (بما في ذلك حالات الوفاة) قد ازداد عند دمج زيبركسا مع أدوية المضادة للكولين.
- متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (Neuroleptic Malignant Syndrome) - حالة نادرة ولكنها خطيرة جداً قد تصيب المرضى الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان، بما في ذلك زيبركسا. تشمل أعراضها ارتفاعاً في درجة الحرارة، وزيادة التعرق، وتيبساً في العضلات، وإرتباكاً، وتغيرات في التنفس، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.
- متلازمة التفاعل الدوائي المترافق مع فرط الحمضات والأعراض الجهازية (DRESS - Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms). قد تحدث هذه الحالة مع استخدام زيبركسا. قد تشمل هذه الحالة: طفح جلدي، حمى، تورم الغدد، وتأثر أعضاء داخلية أخرى مثل الكبد والكلى والرئتين والقلب.
- خلل الحركة المتأخر (tardive dyskinesia) - حالة تُسبب حركات لا إرادية في الجسم لا يمكنك التحكم بها. عادةً ما تكون الحركات في الوجه واللسان. قد تحدث هذه الحالة لدى المرضى الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان، بما في ذلك زيبركسا.
- صعوبة في البلع، مما قد يؤدي إلى وصول الطعام أو الشراب إلى الرئتين، التي قد يعاني منها المرضى الذين يتناولون مضادات الذهان، بما في ذلك زيبركسا.
- النوبات - أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من نوبة أثناء العلاج بزيبركسا.
- يُسبب زيبركسا ارتفاعاً في مستويات هرمون البرولاكتين، وهي حالة قد تؤدي إلى ضعف قابل للعكس في الخصوبة لدى النساء في سن الإنجاب وفي الرجال.

قبل العلاج بزيبركسا، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- مشاكل في القلب
- سكتة دماغية أو من "سكتة دماغية مصغرة" (نوبة إقفارية عابرة)
- الاختلاجات
- سكري أو من مستويات سكر مرتفعة في الدم (فرط سكر الدم)
- ضغط دم مرتفع أو منخفض
- مستويات عالية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم
- مشاكل في الكبد
- انسداد الأمعاء
- الزهايمر
- سرطان الثدي
- الزرق ضيق الزاوية
- أفكار انتحارية أو إساءة ذاتية
- تضخم غدة البروستات (عند الرجال)
- مشكلة طبية أخرى.

أخبر طبيبك إذا كنت تكثر من النشاط الجسماني أو أنك تمكث في أماكن حارة في أحيان قريبة.

قد تشمل أعراض الاضطراب ثنائي القطب أو الغصام أفكاراً انتحارية أو التفكير بإيذاء نفسك أو الآخرين. في هذه الحالة، يجب عليك التوجه فوراً إلى الطبيب أو قسم الطوارئ.

التدخين:

إذا كنت مدخنًا - عليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

الأطفال والمراهقون

زيبركسا مخصص للبالغين فوق سن 18.

الفحوصات والمتابعة

- يجب متابعة مستويات السكر في الدم عند بدء العلاج وخلالها، لا سيما إذا كنت تعاني من السكري أو من مستويات سكر حدودية (100-126 mg/dL خلال الصوم).
- يجب متابعة مستويات الدهون (الكوليسترول والتریجليسيريدات) في الدم، لا سيما لدى المرضى الذين لديهم اضطرابات في مستويات الدهون في الدم، أو من عوامل خطر لتطوير هذه الاضطرابات. يجب إجراء فحوصات دم لفحص مستويات الدهون في الدم وذلك عند بدء العلاج وخلالها، حتى إذا كنت لا تعاني أيضا من أية أعراض.
- ارتفاع الوزن هو عارض جانبي شائع عند العلاج بـ زيبركسا. يجب أخذ ذلك بالحسبان قبل بدء العلاج، وإجراء فحوصات متابعة روتينية للوزن.
- لدى المعالجين الذين لديهم تاريخ طبي من مستويات منخفضة من خلايا الدم البيضاء، يجب متابعة مستويات خلايا الدم البيضاء في الأشهر الأولى من العلاج. يجب التفكير في إيقاف العلاج بـ زيبركسا عند ظهور أول عارض جوهري، الذي يشير إلى انخفاض خلايا الدم البيضاء.

التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:
- ديازيبام - قد يؤدي الإعطاء المتزامن لزيبركسا وديازيبام إلى انخفاض ضغط الدم عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس (Orthostatic).
 - أدوية تؤثر في إنزيم CYP1A2، مثل: كاربامازيبين، فلوفوكسامين، أوميبرازول، وريفامبيسين - يمكن أن تؤثر في مستويات أولانزيبين في الدم.
 - أدوية تحتوي على الفحم النشط - قد تقلل امتصاص أولانزيبين.
 - أدوية تؤثر في الجهاز العصبي المركزي مثل: الأدوية المهدئة، الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية لمعالجة النوم، والأدوية المضادة للصرع - يجب توخي الحذر من الإعطاء المتزامن لهذه الأدوية وأولانزيبين.
 - أدوية لخفض ضغط الدم - يمكن أن يرفع أولانزيبين من تأثير خفض ضغط الدم عند الإعطاء المدمج مع هذه الأدوية.
 - أدوية تحاكي عمل دويامين (مثل الدواء لعلاج الباركنسون - ليفودوبا وناهضات الدويامين) - يمكن أن يعيق أولانزيبين عمل هذه الأدوية.
 - أدوية المضادة للكولين - قد يزيد دمجها مع زيبركسا خطر حدوث أعراض جانبية حادة في الجهاز الهضمي تكون ناتجة عن انخفاض الحركة في الجهاز الهضمي. يجب توخي الحذر عند الإعطاء المتزامن لهذه الأدوية مع أولانزيبين.

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول زيبركسا مع أو من دون طعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

تجنّب استهلاك الكحول أثناء استعمال زيبركسا. قد يؤدي استهلاك الكحول أثناء تناول زيبركسا إلى أن تشعر بالنعاس أكثر مقارنة بتناول زيبركسا دون استهلاك الكحول.

الحمل، الإرضاع والإخصاب

الحمل

استشيري الطبيب أو الصيدليّ قبل استعمال الدواء. استشيري الطبيب إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. ليس معروفاً إذا كان زيبركسا يلحق ضرراً بالجنين. قد يطور المولودون حديثاً متلازمة الفطام، إذا تناولت الأم الدواء في الثلث الأخير (الأشهر الثلاثة الأخيرة) من الحمل. تشمل متلازمة الفطام على الأعراض التالية: نقص الهدوء، رجفان، تصلب/ضعف العضلات، نعاس، عصبية، مشاكل في التنفس، ومشاكل في الإطعام. إذا طوّر طفلكِ عارضا واحداً أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه اتصلي بالطبيب.

الإرضاع

استشيري طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين أن تُرضعي. ينتقل الدواء إلى حليب الأم. هناك بلاغات عن فرط تهدئة، غضب زائد، صعوبة في الإطعام، رجفة وإضطراب في حركة العضلات لدى الرضع الذين تعرضوا ل أولانزاين. يجب متابعة هذه الأعراض لدى الرضع الذين تعرضوا ل أولانزاين. لا تتوفر معلومات بشأن تأثير أولانزاين على إنتاج الحليب. تحدثي مع الطبيب حول الطريقة الأفضل لإطعام طفلكِ إذا كنت تتاولين زيبركسا.

الإخصاب

قد يسبب العلاج ب زيبركسا ارتفاع مستوى البيرولاكتين في الدم، ما قد يؤدي إلى ضرر في الإخصاب قابل للانعكاس لدى النساء في سن الإخصاب وفي الرجال.

السياقة وتشغيل الماكينات

قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى النعاس، وقد يؤثر في القدرة على اتخاذ القرارات، التفكير الحاد أو رد الفعل السريع، لهذا يجب توخي الحذر أثناء سياقة المركبة، تشغيل الآلات الخطيرة وممارسة أية نشاطات تتطلب اليقظة. تجنّب القيام بأية نشاطات كهذه حتى تعرف كيف يؤثر زيبركسا فيك.

معلومات مهمّة عن قسم من مكونات الدواء

يحتوي زيبركسا على لانتوز. إذا أخبرك الطبيب أن لديك عدم قدرة على تحمّل أنواع معينة من السكر، استشره قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

- يجب استعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء.
- الجرعة وطريقة العلاج يُحددهما الطبيب، فقط. يُحتمل أن يحتاج الطبيب إلى تغيير الجرعة حتى العثور على الجرعة الملائمة لك.
- يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
- زيبركسا مُخصّص للبالغين فوق سن 18.
- يمكن تناول زيبركسا مع أو من دون طعام.
- لا تتوفر معلومات عن المستحضر حين يكون مطحوناً، مشطوراً أو مسحوقاً. لذلك، يُمنع مضغ القرص، شطره أو سحقه! يجب ابتلاع الدواء مع القليل من الماء.
- لا تتوفر معلومات حول استعمال المستحضر عبر أنبوب أنفي معدي.

- إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ فقد تشعر بالنعاس، باضطراب في الكلام، عدوانية أو نقص الهدوء، وتيرة نظم قلب سريعة، رعشة، تشنجات عضلية، اضطراب حركة العضلات وانخفاض مستوى الوعي (يتراوح بين النعاس وحتى الغيبوبة).
- إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً معك عبوة الدواء.
- إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، تناوله فور تذكرك. إذا تذكرت في وقت قريب من موعد تناول الجرعة التالية، تخطّ الجرعة التي نسيتهَا وتناول الجرعة في الوقت الاعتيادي. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.
- عليك المداومة على العلاج تبعاً لتوصية الطبيب.
- حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- لمنع حدوث أعراض جانبية حادة، لا يجوز التوقف عن تناول زيبركسا فجأة. إذا كان يتعين عليك التوقف عن تناول زيبركسا، سوف يرشدك الطبيب كيف عليك القيام بذلك.
- يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال زيبركسا أعراضاً جانبية لدى قسم من المستعملين. لا تغز عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أي منها.

قد يسبب زيبركسا أعراضاً جانبية حادة:

- ارتفاع احتمال حدوث الوفاة لدى المسنين الذين يعانون من ارتباك، فقدان الذاكرة وفقدان العلاقة بالواقع (ذهان متعلق بالخرف). زيبركسا ليس معداً للاستعمال لدى المسنين الذين يعانون من الخرف.
- يمكن أن يحدث ارتفاع مستويات السكر في الدم (Hyperglycemia) لدى معالجين يعانون من السكري وُلدى معالجين لا يعانون من السكري. قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى:
 - حماض كيتوني - ارتفاع مستويات الحموضة في الدم نتيجة تراكم الكيتونات
 - غيبوبة (Coma)
 - وفاة

يجب على الطبيب أن يجري فحوصات دم لمستويات السكر في الدم قبل بدء العلاج بـ زيبركسا وخلالها. لدى المعالجين الذين لا يعانون من السكري، أحياناً، تتلشى مستويات السكر المرتفعة في الدم عند إيقاف العلاج بـ زيبركسا. المعالجون الذين يعانون من السكري وبعض المعالجين الذين لم يعانون من السكري عند بدء العلاج بـ زيبركسا ملزمون بتناول دواء لخفض مستويات السكر في الدم بعد إيقاف العلاج بـ زيبركسا أيضاً. إذا كنت تعاني من السكري، عليك اتباع تعليمات الطبيب حول الوتيرة المطلوبة لفحوصات مستويات السكر في الدم خلال تناول زيبركسا.

عليك التوجه إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أحد أعراض مستويات السكر المرتفعة في الدم:

- عطش متزايد
- ارتفاع وتيرة التبول
- شعور متزايد بالجوع
- شعور بالضعف أو التعب
- شعور بالغثبان
- شعور بالارتباك
- رائحة فاكهة من الفم.

- قد يحدث ارتفاع مستويات الدهون (الكوليسترول والتريجليسيدات) في الدم لدى المعالجين الذين يتلقون زيبركسا. يجب على الطبيب أن يجري فحوصات دم لفحص مستويات الكوليسترول والدهنيات في الدم وذلك قبل بدء العلاج وخلال، حتى إذا كنت لا تعاني أيضا من أية أعراض.
- ارتفاع الوزن شائع جداً لدى المعالجين الذين يتلقون زيبركسا. يطرأ لدى بعض المعالجين ارتفاع الوزن بشكل متطرف لذا يلزم مراقبة الوزن بانتظام. يجب استشارة الطبيب بهدف الحفاظ على الوزن مثل تناول تغذية صحية ومتوازنة وممارسة نشاط جسماني.
- ارتفاع وتيرة حدوث سكتة دماغية أو "سكتة دماغية مصغرة" - نوبة نقص التروية العابرة (TIA) لدى المسنين الذين يعانون من الذهان المرتبط بالخرف (المسنون الذين يعانون من فقدان العلاقة بالواقع نتيجة ارتباك وفقدان الذاكرة). لم تتم المصادقة على زيبركسا لهؤلاء المعالجين.
- متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (Neuroleptic Malignant Syndrome) - حالة نادرة لكنها خطيرة جداً، قد تحدث لدى معالجين يتناولون أدوية مضادة للذهان، بما فيها زيبركسا. يمكن أن تؤدي متلازمة مضادات الذهان الخبيثة إلى الوفاة، وأن تتطلب المكوث في المستشفى. يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا أصبحت مريضا جدا وعانيت من أحد الأعراض التالية:
 - حرارة مرتفعة
 - تعرق مفرط
 - تصلب العضلات
 - ارتباك
 - تغييرات في التنفس، النبض وضغط الدم.
- التفاعل الدوائي المترافق مع فرط الحمضات والأعراض (DRESS - Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms). قد يحصل هذا العارض مع زيبركسا. يمكن أن يشتمل هذا العارض على: طفح، حمى، تضخم الغدد، ومشاركة أعضاء داخلية إضافية أخرى مثل: الكبد، الكلى، الرئتين والقلب. قد يؤدي هذا العارض إلى الوفاة أحيانا، لهذا يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من إحدى هذه العلامات.
- خلل الحركة المتأخر (tardive dyskinesia) - تُسبب هذه الحالة حركات لا إرادية في الجسم، تحصل دون أن تكون لك سيطرة عليها. بالعادة تكون الحركات في الوجه واللسان. يمكن أن تستمر هذه الحالة حتى بعد إيقاف العلاج بـ زيبركسا. يمكن أن تبدأ هذه الحالة أيضا بعد إيقاف العلاج بـ زيبركسا. عليك إبلاغ الطبيب إذا كانت لديك حركات جسم لا إرادية.
- انخفاض ضغط الدم عند تغيير الوضعية الذي يشتمل على أعراض مثل دوام، نبض سريع أو بطيء أو إغماء. تحدث هذه الحالة تحديدا عند بدء تناول الدواء.
- صعوبة في الابتلاع يمكن أن تؤدي إلى وصول الغذاء أو الشراب إلى الرئتين.
- اختلاجات - أخبر الطبيب إذا اختبرت اختلاجا أثناء العلاج بـ زيبركسا.
- مشاكل في ضبط درجة حرارة الجسم - قد تعاني من ارتفاع كبير في حرارة جسمك، مثلا عندما تتدرب كثيراً أو تكون في منطقة حارة جداً. من المهم أن تشرب الماء منعاً لحدوث الجفاف. يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا أصبحت مريضا جدا، وعانيت من أعراض الجفاف:
 - تعرق مفرط أو نقص التعرق
 - جفاف الفم
 - شعرت بالحرارة بدرجة كبيرة
 - بعطش متزايد
 - احتباس البول

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جدا:

ضعف، نقص الطاقة، جفاف في الفم، إمساك، اضطرابات في الهضم، نعاس، دوار، إصابة نتيجة حادثة، أرق، باركنسونية، زيادة الوزن، انخفاض ضغط الدم عند الانتقال من الاستلقاء إلى الجلوس، ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين.

أعراض جانبية شائعة:

حمى، رجفان، ألم في الظهر، ألم في الصدر، آلام في الأطراف، آلام في المفاصل، ارتفاع وتيرة نظم القلب، ضغط دم مرتفع، تقيؤ، عدم هدوء جسدي، فرط الشهية، تغييرات في السلوك، ارتفاع مستويات التريجليسيريدات والكوليسترول في الدم، نزيف تحت الجلد يظهر على شكل بقع على الجلد، وذمة محيطية، مشى غير طبيعي، تصلب العضلات، خلل في اللفظ (الكلام)، نزلة، سعال، كسل العين، التهاب في البلعوم، نعاس، سلس البول، عدوى في المسالك البولية، ارتفاع مستويات الفوسفاتاز القلوي في الدم، إفراز حليب من الثدي، نمو الثدي لدى الرجال، ضرر في الذاكرة، خدران، مزاج مرتفع (Euphoria)، ضيق في التنفس، جلد جاف، حب الشباب، ضرر في الرؤية، آلام أثناء الدورة الشهرية، والتهاب في المهبل لدى النساء، براز صلب أو تبرز في أحيان بعيدة، الاكتئاب، انخفاض عدد أنواع معينة من خلايا الدم البيضاء، العطش، الارتباك، التعرق، انخفاض ضغط الدم، اضطرابات الشخصية، زيادة إفراز اللعاب.

أعراض جانبية غير شائعة:

قشعريرة، وذمة في الوجه، حساسية للضوء، محاولة انتحارية، اللامبالاة بالبيئة المحيطة، تغييم الوعي، سكتة دماغية، توسع الأوعية الدموية، غثيان، تقيؤ، وذمة في اللسان، انخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء، انخفاض مستويات الصفائح الدموية، مستويات مرتفعة من البيليروبين في الدم، مستويات منخفضة من البروتينات في الدم، مشاكل في التئام الجروح، اضطراب في الكلام، انخفاض الرغبة الجنسية، بلادة الإحساس، نزيف من الأنف، تساقط الشعر، جفاف في العينين، تغييرات في القدرة على تركيز النظر (Accommodation)، عجز جنسي، تغييرات في الدورة الشهرية (مثل عدم حدوث دورة شهرية، انخفاض/ارتفاع النزيف أثناء الدورة الشهرية، نزيف غزير أثناء الدورة الشهرية، النزيف بين الدورات الشهرية)، احتباس البول، تواتر والحاح التبول، حجم بول كبير، ألم في الثدي، خلل التوتر العضلي (تشنج عضلات الرقبة، صعوبة في الابتلاع، صعوبة في التنفس، إخراج اللسان)، انتفاخ البطن والوفاة على خلفية السكري.

أعراض جانبية نادرة:

أثر مخلفات السكر (Hangover effect)، انسداد الأمعاء، كبد دهني، هشاشة العظام، غيبوبة، وذمة رئوية، توسع البؤبؤين، موت فجائي، قشعريرة وحمى.

أعراض جانبية وتيرة انتشارها غير معروفة:

رد فعل تحسسي (مثلا: رد فعل تأقي، تورم الوجه أو الحنجرة (Angioedema)، حكة، طفح)، غيبوبة مرتبطة بالسكري، حمض كيتوني سكري، أعراض جانبية قد تظهر عند إيقاف العلاج (غثيان، تقيؤ، وتعرق)، يرقان، التهاب في البنكرياس والكبد، ضرر في الكبد، متلازمة تملل الساقين (restless legs syndrome)، انتصاب مؤلم ومستمر (Priapism)، ضرر في العضلات يسبب آلاما (Rhabdomyolysis)، خثار وريدي، تآتأة، تراكم الأحماض الصفراوية، تسرب البراز والمشى أثناء النوم.

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيُّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبيٍّ لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن إبلاغ وزارة الصحة بأعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية نتيجة العلاج الدوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف تُخزّن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. يُنسب تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذات الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 30°C.

6. معلومات إضافية:

إضافة إلى المادة الفعّالة، تحتوي أقراص زيبركسا أيضاً على:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, crospovidone, color mixture white

YS-1-18027-A, hydroxypropyl cellulose, methyl hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, carnauba wax and edible blue ink.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أقراص زيبركسا 5 ملغ: عبوات ذات 7، 14، 28، 56 قرصاً مستديراً أبيض مطلياً، مكتوب عليها "LILLY" والرمز "4115".

أقراص زيبركسا 7.5 ملغ: عبوات ذات 7، 14، 28، 56 قرصاً مستديراً أبيض مطلياً، مكتوب عليها "LILLY" والرمز "4116".

أقراص زيبركسا 10 ملغ: عبوات ذات 7، 14، 28، 56 قرصاً مستديراً أبيض مطلياً، مكتوب عليها "LILLY" والرمز "4117".

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه:

تسيمل بيو فارما، شارع همجشميم 20، بيتاح تيكفا.

اسم المُنتج وعنوانه: تشيلفارم سويسرا م.ض، بينينغن، سويسرا.

تم تحديثها في تموز 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

زيبركسا 5 ملغ: 104-84-28857-21


زيبركسا 7.5 ملغ: 104-85-28858-21

زيبركسا 10 ملغ: 104-86-28859-21

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

لمعلومات إضافية حول المستحضر وللنشرات المحدثة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، امسحوا الرمز التالي:


For further information about the medicinal product and for updated consumer leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:



زيبركسا 10 ملغ



زيبركسا 7.5 ملغ



زيبركسا 5 ملغ

بالإمكان التوجه لصاحب تسجيل المستحضر بطلب للحصول على نشرة مطبوعة للمستهلك باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info.pharma@tzamal-medical.co.il أو عبر الهاتف رقم 073-7151111.

ZYP_PIL_TZ_072025